

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS X. PARS IV.

LIPSIAE MDCCLXII.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder et P. Mortier iun. Londini apud C. G. Seyffert, Pa-
risiis apud Briasson, Patauii apud I. Manfr , Venetiis in B. Albrizzi et S. Coleti
officinis, Romae apud Venant. Monaldini.



I.

Noua Acta Physico-Medica Academiae Caesar-
 reae Leopoldino-Carolinae Naturae Curioso-
 rum. Tom. II. Acced. Appendix et Tabb.
 aen. XI. Norimbergae impensis Wolfgangi
 Schwarzkopffii. 1761. 4. Alph. 2 pl. 8. Ap-
 pend. alph. 3. pl. $\frac{1}{2}$.



Pergunt Cl. Viri in communicandis ob-
 servationibus, quas in vñum artis sa-
 lutaris et physices instituerunt, ex
 quibus autem praecipua tantum mo-
 menta adducere liceat.

1) *Asthma grauißimum ex irregulari et intercepto* p. 1.
podagrae haereditariae decursu obortum in lethalem tan-
dem transiens hydropem asciten. Auctore Cl. IOSE-
 PHO BENVENUTI. Hic tantum notamus aegro-
 tantem, virum religiosum, ante trigesimum aeta-
 tis annum ex labe quadam haereditaria podagra la-
 borasse, postea autem gonorrhoea correptum va-
 rios persaepe diaetae errores commisisse, ita, vt
 hydropis exorti causa in venerea intus latente labe
 simul quaerenda fuisse videatur. Cadauere dissecto
 O o 2 qua-

quadraginta libras aquae subrubrae turbidae emiserunt, hepar obstructum, septem circiter libras ponderans et atro pingui ac foetido humore turgens inque vesicula fellea ducentos fere calculos reppererunt, qui igni admoti flammam non conceperunt, sed crepitarunt et aquae iniecti fundum petierunt. Reliqua praeter naturam constituta praeterimus.

p. 31. 10) *Epilepsia usu saponis veneti curata.* Auctore Cl. FRANCISCO ANTONIO COHAUSEN. Puellae nimirum, per longum tempus epilepsia cruciatae, saponem venetum exhibuit, ita tamen, ut aliquam eius portionem praeuia coctione leni in lacte dissolui saepiusque per diem cyathum huius lactis haurire iuberet. Quo remedio per aliquot septimanas usurpato aegra tandem a morbo isto liberata plenarie conualuit.

p. 70. 20. 21. 22) Tribus observationibus *usum corticis simarubae in dysenteria, fluxu hepatico chronico et lienteria chronica* probat, hosque morbos dicti corticis decocto feliciter sanatos esse, perhibet Cl. IOAN. WOLFGANG. FRIDR. BOENNEKEN.

p. 83. 23) *De largiori haemorrhagia octauo demum post dentis euulsionem die exorta.* Auctore Cl. IOAN. GUILLIELM. WIDMANN. Haecce haemorrhagia, quae ultra duodecim horas durauit, aceto vini fortissimo, ope linteoli applicato saepiusque reiterato sensim cessauit. Sanguis, qui intra dictum tempus effluxit uncias octodecim pondere superauit.

p. 100. 26) *De lapide malachite.* Auctore Cl. WOLFG. THOM. RAV. Hicce lapis in comitatu Tirolensi occurrens ex succo quodam bituminoso, ex visceribus fodinae cuiusdam stillante breuique in durum lapi-

lapidem abeunte oritur. Lapis in superficie laevigatus, coloris pallide viridis praeini et nouo viridi Saxonico haud absimilis, variegati tamen et striis albicantibus intermixti, intus porosus et figurae irregularis apparet.

28) *Historia sectionis obesi iuuenis ex pinguedine nimia mortui.* Auctore Cl. IOANN. GOTTL. SCHAEFFER. Iuuenis quidam, a prima infantia pleniere corporis habitu donatus, in prouectiori aetate otio et lauta diaeta saginatus, mole corporis magis magisque auctus, in tantum denique volumen excreuit, ut anno aetatis suae trigesimo, vitae tunc ultimo ultra quingentas libras pependisse dicatur. Subito tandem extincti corpus dissecuerunt, incisique abdominis integumentis cultroque profundius adacto nihil praeter pinguedinem in conspectum venit. Membrae adiposae crassities pedis unius triumque uncularum, peritonaei vero sex uncularum et omenti unius unciae fuit. De reliquo nonnullorum viscerum pondus adauctum, aliorum vero imminutum carnemque ubique pinguedine circumfufam reppererunt.

30) *De virgine articulate et distinctim canente, sermonis autem usu destituta.* Auctore Cl. IAC. CHRIST. SCHAEFFER. Virginem quandam Salisburgensem, ad Cl. Auctorem accersitam, carmen sacrum canere iubet: canit ea facillime et distincte. Alloquitur eam, verba desunt, muta est; vult quidem, sed non potest loqui. Nec sic tamen fraus subfuit: omnem enim cum summa anxietate, maximisque totius corporis motibus ad sudorem usque operam dedit, ut verba proferret et responderet; sed vix sonus obscurus, litterisque minime similis, nedum syllaba distincta, audita est. His aliquoties tenta-

tis, sed irritò semper effectu, tandem ex hymno decantato prima duo et tria verba Noster eligit eaque, vt eloqui quouis modo contendat, postulat. Licet id multum negotii facesset, tandem tamen, viribus pene exhaustis sonum aliquem, ab hisce verbis non multum abludentem, in medium profert, iisdemque verbis iterum iterumque et per semihoram indefesso studio repetitis virgo ista tandem pro lubitu prompte et distincte ea enunciare valet. Curauit Noster, vt propriis impensis hoc vitium non nemo corrigere allaboraret. Singulis septimanis tempus quoddam impenditur, virginique isti certa quaedam verba proponuntur et curatur, vt tamdiu eadem enunciet et repetat, donec prompte ea et sine molestia toties, quoties exigantur et ipsa velit, pronunciare valeat. De reliquo nullam fraudem aut dissimulationem hic sublatuisse nec supernaturale quid, sed rem omnem in solo neglecto vsu et exercitio positam esse, Noster persuasum certo habet.

p. 122. 31) *De insectis volitantibus ab infante anniculo per os et aluum redditis.* Auctore Cl. CRAT. GODFR. HENNICKE. Hic tantum notamus, infanti, anni duntaxat vnus, qui duos vermes singulares, eiecit, nihil nisi lac maternum cum pulmento consueto exhibitum fuisse, et insectum, quod tab. 1 fig. 4 repraesentatur, a Cl. Auctore pro notonecta, in scholio vero adiecto pro foemina blattae orientalis LINNAEI, Germanice *Schwaaben* dictae, habitum, passim in aedificiis, in primis pistorum occurrere et pane aliisque cibariis, praecipue dulcibus viuere, atque ea, quae infans excreuit, forsan in infantis ore, a pulmento assumpto vel lacte materno non satis repurgato, quaesiuisset, inque fauces respiratione delata in ventriculum descendisse, arbitratur.

32) *Euporistum contra vitilignes* communicat p.124.

Idem. Consistit hoc in decocto radicis et ligni iuniperi, quo per aliquot menses vsurpato senem septuagenarium plenarie liberatum esse, Noster refert.

36) *De viribus aceti vini egregiis* differit Cl. 10- p.132.

SEPH. BENVENUTI. Aceti naturam disquirens, egregium istud remedium tartareis corpusculis simulque igniculis refertum esse, ita vt in aceto difficilior tartarearum particularum cohaesio pariterque difficilior igniculorum dissipatio quam in vino deprehendatur, argumentis non leuioribus aequae ac experimentis comprobare annititur. Cum itaque acetum, rebus sic se habentibus, ad rareficientiam vergat, istud proinde ad resoluenda coagula aptissimum videtur. Praeterea incidens ei inest vis: ita in illis, qui graui sopore detenti aceto excitantur, arterias validius micare ac pulsus in febribus, praecipue malignis, ampliores fieri, experimur. Inest etiam vis cardiaca, alexipharmaca, egregie discutiens, antiphlogistica, putredini resistens imo adeo antipodagrica virtus, licet non negandum, et podagram interdum alcalicis curari posse. Verum laudatas hasce virtutes merito aceto tribuendas esse, vsus eiusdem in lethargo, sopore, syncope, languore ac vomitu, in conuulsionibus hystericis aut hypochondriacis, ardentibus febribus, variolis ac morbillis docet. Tandem etiam ad arcendum pestis contagium acetum, vario modo vsurpatum, utilissimum esse et pestilentiae auersari, experientia euincit. De egregia itaque aceti virtute Noster certo persuasus et multiplici experientia confirmatus minime tamen negat, contrarios etiam acetum progignere effectus, nisi debitis sub cautionibus praescribatur et moderate vsurpetur. Iure igitur

vsus huius remedii macie confectis aut ad dissolutionem humorum procliuius prohibet. contra vero eis, ubi indicatur, vnciam dimidiam cum aquae libra vna mixtam optimo cum successu exhiberi posse, autumat. Propria sane experientia confirmati Cl. Auctori suffragari non dubitamus cumque eo potius optamus, vt *acetum tot inutilibus pharmacis praeferrent medici.*

P. 143. 38) *De microcosmo, bellua marina omnium vastissima* agit Ill. CARL. AUG. A BERGEN. Licet de immanis huius belluae existentia multum disputatum sit, nec Auctores in ea describenda satis conueniant, operae pretium Noster existimauit, varias Auctorum descriptiones apponere, quo elucescat, quid sub hoc animali intelligant. Cum autem, vt in adiecto scholio asseritur, nullus amplius de existentia huius animalis dubitandi locus supersit, qualitates idcirco vel conditiones istius belluae in vnum collectas apponere, Ill. Auctori placuit. Sunt autem sequentes: 1) Bellua haec omnium marinarum maxima est; 2) nunquam se totam conspiciendum praebet et non nisi brachia et tentacula extra aquam monstrat; 3) superficies dorsi belluae e longinquo similis paruae insulae seu scopulis extra aquam prominentibus dorsumque consutum est algis aliisque vegetabilibus marinis; 4) insignem odorem spirat, quo pisces cuiuscunque generis allicit; 5) bellua est sine dubio pedibus instructa adeoque non ad balaenas pertinet; 6) quotannis semel ventrem replet et deplet; 7) tranquillo mare et aestiuis mensibus ad superficiem maris adscendit, hyeme vero in profundis requiescit, 8) motu, quantum haecenus constat, non alio gaudet, quam vt totum corpus perpendiculari directione in fundum dimittat eademque postmodum ascendat: habet itaque facul.

facultatem, corpus suum leuius reddendi, quod an ope cuiusdam vesicae fiat vt in piscibus, analogia suadet; 9) referenda est inter belluas, quarum propagatio vel multiplicatio prouido naturae consilio parua vel lenta est.

39) *Charakteris Aloidis rectificationem* proponit p.150.

Idem, qui, cum olim foeminam plantam non vidisset et in descriptione illius pro relatiua non habuisset, nunc inuento flore foemina, praeunte Cl. ZINNIO ad diphyllas Aloidem referendam esse adfirmat.

42) *De perseverantia virtutis electricae in corpore* p.158.

electricitatis derivatiuae disserit. Idem. Anno 1756 per aestatem consueta collegii experimentalis physici instituit Noster experimenta et mense iunio experimenta electrica et inter alia etiam experimentum Leidense fecit, quo finito lagenam cum filo argenteo in scrinium reposuit. Sequentibus mensibus idem continuauit collegium, cui exeunte octobri finem imposuit. Ab hoc tempore auditorium raro ingressus est, donec forte fortuna medio februarii 1757 quaesiturus vasculum aliquod idem scrinium aperuit, vbi dicta lagena in oculos Nostri incurrit, quam vna cum dicto argenteo filo remouit, aquam iam forte corruptam effusus; sub extractione autem ex scrinio filum allisit ad asserem eiusdem et audiuit Noster fragorem electricum. Rem ipsam miratus digito tetigit filum et sat notabilem adhuc dolorem persensit, quem, longe debiliorem tamen secunda adhuc vice sensit, tertia demum vice nihil amplius persentire potuit. Itaque electricitatem ad octo integros menses conseruatam esse, liquet.

p.159. 43) *Varias de ganglio obseruationes eiusque citam subitamque curationem duplicem* communicat Cl. RÜDIGER. FRID. OVELGÜN. Ex hac obseruatione notamus, subitam istam curationem, ab AETIO aliquantum iam notatam hicque confirmatam, in eo consistere, vt ganglion sursum, deorsum, sinistrorsum et dextrorsum absque interrupta serie tamdiu fricetur, donec mollescat, molle autem factum manu aut pollicibus prematur atque frictio et pressio alternis vicibus tamdiu continueatur, donec cesset. Methodum hanc duabus obseruationibus Noster confirmat, sicque ea, quae AETIUS commendauit, obliuione vindicare hisque obseruationibus confirmare allaborat. Notari autem vult Cl. Auctor, AETII methodum in eo tantum a memorata differre, quod AETIVS opus peregerit Ammoniaco cum lamina plumbea per aliquot dies, dum ganglion emollitum fuit, imposito, hic autem frictione in breuem quasi summam minimumque tempus contractum sit.

p.168. 44) *De trifolio acetoso, enteroceles remedio, variisque aliis de hac herbula et nonnullis de eius sale essentiali* disserit Idem. Hic tantum notamus, virum quendam, octogenarium fere, multos ante annos enterocele laborantem, trifolio isto, quod aliis trifolium acetosum vulgare BAUHINI et officinis acetosella audit, largiter per tres quatuorue septimanas vsus et ita persanatum esse, vt per multos annos, quotidie equo vectus, nihil amplius mali sentiret.

p.184. 48) *Odontalgiae catarrhalis remedium* communicat Idem. Hunc in finem semina staphisagriae contusa, linteo tenero illigata, hocque paruae quantitati aceti vini immersum, dein inter gingiuam dolen-

dolentem et genam repositum dictum morbum curare, in cariosi vero dentis causa nullum leuamen adferre dicitur.

52) *Ferrariae characterem* exhibet Cl. 10. BUR- p.198.

MANN. Elegantis huius plantae sequentem tradit descriptionem: Calix. *Spathae geminae, carinatae, vaginales, inuolutae, membranaceae, alternatae, singulae suum producentes florem. Harum inferior breuior, obliqua, superiorem oppositam, erectam et longiorem instar vaginae amplectens. Corolla. Petala sex, oblongo-acuminata, tria maiora, tria alterna minora, quorum media pars eleuata et tumida, inferior postica dimidia pars translucens, glabra, dorso medio protuberante: cuncta vero ad ungues coalita et contracta; petalorum limbi reuoluti, undique instar holoserici fimbriati et in dimidia interna parte maculati. Stamina. Filamenta tria supra corollam eleuata, simplicia, breuia; Antherae subrotundae, ciliatae, hirtae, croceae, sub filamentum diuisione. Pistillum. Germen subrotundum, obtusum, triquetrum, glabrum, infra corollam situm. Stilus erectus, simplex. Stigma trifidum, coronatum ac ciliatum, cuius singula pars iterum bifida ac filamentosa. Pericarpium. Capsula oblonga, glabra, inferius coarctata ac teres, superius ventricosa, triquetra, ab una parte conuexa, ab altera gibba, Corolla conuoluta, contracta et decidua, coronata, trilocularis, triualuis, Vagina spathacea persistente penitus inuoluta. Semina numerosa, rotunda, minima, columnae mediae seu axi triquetra undique accreta.*

Duas adducit Cl. Auctor species, quae etiam hic delineatae proponuntur. Altera est *crispa* seu *Ferraria foliis neruosis ensiformibus, vaginantibus; petalis fimbriatis. Radice instruitur bulbosa, foliis longis neruosis, ad oras albicantibus et membranaeis: scapo folioso simplici vel ramoso: floribus in*
thyr-

thyrsis, pedunculis bifloris, communi spatha obvolutis atque singulo flori propria spatha subiecta est. Petalorum limbi fimbriis undulatis crispis inueniuntur, subtus illa virent, superne violaceo colore insigniuntur, atris albisque maculis distincta. Varietates coloris etiam obseruauit nec non crescendi modum nunc celerem et luxuriantem nunc tardio-rem.

Altera species est *fimbriata* *Ferraria foliis lanceolatis, amplexicaulibus, membranaceis, petalis crispis et laceris*. Haec folia fert spathacea circa radicem crassa, curta, caulina alterna, neruosa, lanceolata in apice albicantia: scapum simplicem foliosum, petala lacera et crispa, corona plumacea in centro repleta.

Dicta hoc nomine planta fuit in honorem IOANNIS BAPTISTAE FERRARII Senensis, qui eam in Flora sua descripsit, licet non accurate satis.

p.207. 55) *Naeuus monstrosus in cane ex imaginatione matris* describitur a Cl. IOAN. EBERHARD. DE FISCHER. Canicula minimae speciei grauida, quoties loxia auis, ad fenestram in habitaculo suo pendens, incondite clamauit, toties ira perculsa auem allatrauit. Tandem tres catulos peperit, quorum duo maxillas eodem modo decussatim figuratos habuere vt loxia. Vnus eorum inter rariora naturae Cl. HIMSEL adseruatus tab.IV. fig. 1. delineatus est.

p.215. 59) *Vires simplicium generales* obseruatione comprobant Cl. CRAT. GODOFR. HENNICKE. Tumorem magnitudine oui dorsum manus occupantem esu allii et ceparum quotidie in copia cum cibis ingestarum absque vilo topico remedio discussum esse inque alio stranguriam, omnia eludentem, rob forbi

forbi aliquoties sumto auxilium, exoptatum attulisse, legimus.

64) *De maxilla inferiori retrorsum luxata et singulari quadam methodo restituta* differit. Cl. ZACHAR. VOGEL *).

65) *De cerae flavae usu interno valde proficuo.* Au p.245.
ctore Cl. IOAN. CHRIST. IACOBI. Ut cera ad usum internum apta euadat, duo Noster adhibenda suadet menstrua, aquam nimirum calcis viuae ouique vitellum. His enim ceram ita resolui scribit, ut non solum cum aqua et emulsionibus sed et lacte quocunque coniungi et commisceri sicque remedium parari possit, quod non solum in laesione pulmonum et tussi humida, imprimis conuulsiva, sed et in mictu cruento et dysenteria optimo cum effectu, quem Noster expertus est, adhiberi potest. Sub finem tractationis alius solutionis cerae Cl. Auctor meminit, quam sudoribus hecticorum colliquativis opponere putat. Sumsit nimirum magnesiā vitriariorum eamque cum aequali portione sulphuris communis per aliquot dies et noctes igne reuerberii calcinauit, massam calcinatam aceto destillato fortissimo elixivauit sicque liquorem salinum saporis dulcissimi obtinuit. Cerae flavae posthac quantitatem leni igne fusam, addita liquoris magnesiae descripti debita quantitate, exacte terit portionemque mellis rosarum successive admiscuit, hisque diu exactissime tritis aquam quandam destillatam iunxit sicque medicamen, ad vnciam vnā pro dosi exhibendum, hecticis egregie conueniens, sese obtinuisse, dicit.

66)

*) Vid. Commentar. nostr. Vol. IX. P. I. p. 123.

p. 248. 66) *Tentamina quaedam ad succini solutionem spectantia* communicat Idem. Hic eo imprimis allaboravit Cl. Auctor, ut solutionem succini, aestum sanguini non inducentem totamque eiusdem substantiam in se comprehendentem, in ulceribus internis aequae ac conuulsivis morbis vires egregias exerentem communicaret. Itaque subtilissime praeparatum succinum flavum liquori magnesia vitriariorum, praecedenti observatione descripto, commiscuit et exactissime trituravit. Massa inde exorta, in lingua per salivam prorsus solubilis saporem gratum, amygdalis amaris similem, sed leniorem, excitavit nec viscosa fuit, nec ullus intra dentes stridor perceptus. Alio etiam modo succini solutionem tentavit: soluit nimirum hoc corpus in spiritu vini et praeuia abstractione ad ficcitatem usque omni iterum spiritu priuatum cum tinctura antimonii HOFFMANNI in consistentiam pultis redegit et cum liquore salino magnesia vitriariorum promptissimam, triturationis ope, unionem sicque remedium, suavem succini odorem spirans, obtinuit. Priorem solutionem hypochondriacis, hysteriis et doloribus post partum spuris laborantibus exhibuit, posteriorem vero paralyticis epilepticisque insultibus insigni cum fructu oppositam esse, Noster refert. His expositis alias succini praeparationes communicat Noster, quae vsum anatomicum serviunt, ex quibus autem unam tantum, non adeo molestam nec adeo sumtuosam adducere liceat. Inspergitur nimirum successively succinum alcoholisatam balsamo de Copaiba, igne leniori fuso; facta posthac coctione succinum perfecte solutum formam liquidam spissam pellucidamque induit, cui adhuc calido subiecta varia immitti aerique postea liberiori ad perfectam exsiccationem exponi possunt.

67) *Experimenta quaedam chemica* apponit Idem. p. 135.
Ex his sequentia notamus. 1) Ex scoriis reguli antimonii martialis praeparatur mediante oleo vitrioli vitriolum martis dulcissimum; hoc ad rubedinem calcinatum cum oleo vitrioli ad eminentiam trium digitorum rursus affuso per aliquot horas perpetua ebullitione coquitur et postea successiue additur spiritus vini rectificatissimus ea quantitate, quae ad genesin liquoris anodynus requiritur. Instituta dein per aliquot septimanas digestionem lenissimam obtinetur destillando liquor anodynus mineralis, martem in sinu fouens.

2) Tinctura antimonii acris HOFFMANNI sufficienti quantitate cum amygdalis dulcibus, aqua rosarum in consistentiam pultis contundendo redactis mixta, probe iterum conquassata et postea decenti rosarum vel alius aquae quantitate addita emulsio saponacea obtinetur, quae sapore nauseoso destituta notabili quantitate et longo satis tempore exhiberi potest.

3) Salem ex magnesia vitriariorum, cuius praeparationem Noster Obs. 65. tradidit, in recludendis gummatibus, balsamis natiuis et resinis tantam vim habere, ut solubilia in aqua euadant, hic legimus. Idem iste sal, si per aliquot dies cum mercurio teritur, eum ita immutat, ut tota eius substantia in massam conuertatur pultaceam, nulla amplius globulorum mercurialium vestigia sistentem, quae interne sub forma pilularum cum extractis amaris propinari potest. Remedium hoc laxantem sanguinemque depurantem virtutem sine saluationis metu exserere, Noster perhibet. Praeterea eodem isto sale, ex cinnabari medicamentum resoluens et antispasmodicum obtineri et salis huius accessu metallorum et crecorum metallicorum vitrificationem leuiori negotio absolui, Noster ostendit. Reliqua praeterimus.

p.260. 69) *Examen et vires acidularum Ruhlanae* exhibet Cl. CHRISTP. FRIDER. KÜHN. Ex variis, quae Cl. Auctor cum istis aquis instituit, experimentis colligit, acidulas Ruhlanae constare ex aqua leviori et subtiliori, quae prope ad destillatam et pluviam accedit; 2) e spiritu minerali sulphureo-vitriolico, qui ex vaporibus pyritarum et lithantracum originem ducit; 3) e terra martiali et alcalica, quae vaporibus acido-sulphureis in mineris corroditur et ita attenuatur, ut aqua istam solutam continere possit; 4) e sale alcalinae naturae, quod in aere facile deliquescit et cum partibus sulphureis unitum manet. Inde istas aquas fibrae debili roborandae et viscido incidendo in cachexia, chlorosi incipiente, fluore albo, laevitate intestinorum, vario viscerum infarctu, obstructione mensium et haemorrhoidum, malo hysterico et hypochondriaco, sterilitate, scorbuto, morbis arthriticis, scabie aliisque prodesse posse, arbitratur.

p.264. 70) *Eiusdem potiorum circa Isenacum occurrentium plantarum enumeratio* merum sistit catalogum in montibus, Ruhlani ambientibus, et in monte Insulano (*Inselberg*) Thuringiae atque circa salinas Crucibergenses a Cl. Auctore observatarum plantarum.

p.271. 72) *Singularia quaedam in foemina, manibus pedibusque ex morbo praegresso destituta*, communicat Idem. Foemina ista sine pedibus firmiter incessit, saltavit, iter per aliquot milliaria fecit et sine manibus omnes operas domesticas praestitit, linum et lanam torquendo duxit, varia contexit, filum acui induxit idemque abruptum capere iterum potuit etc. Loco manuum utrisque brachiis eorumque condylis scite usa fuit. Vices pedum tota ossa tibiae reflexa egerunt, genua loco calcanei incessui inservierunt.

runt. Foemina ista perfecta et omnibus membris sana nata, in prima autem infantia, decimo octavo aetatis suae mense febre variolosa correpta, facta ad articulos pedum manuumue metastasi, vlceribus tam rebellibus afflicta fuit, vt pedum manuumue usu priuaretur. Adulta postmodum et nubilis facta, viro cuidam nupta et ita fortunata fuit, vt tempore legitimo filium sanum et omnibus membris perfectum felici partu ederet, perfecte sana maneret et recens nato mammas praeberere posset.

74) *De gemellis, quarum altera hernia umbilicali praegrandi nata, altera salua, mentionem facit Cl. IOANN. SEBAST. ALBRECHT.* Foemina, vel ex auersione, vel ex matris indulgentia, nunquam necem intulit cuius animantium volatiliū. Mutato per matrimonium statu hisce etiam operibus interdum se applicare tenetur. Grauida circa quartum mensem anserem enecat, carotides discindens, cui deplumato proximendis visceribus infimi ventris vulnus infligit, quo ampliato, viscera cum intestinis manu, prehensa, extrahit. His vix visis perterrita anserem proiicit, ipsa vero lipothymia correpta concidit. Legitimo tandem puerperii termino gemellas enititur, quarum altera debilior et minor supra funem vmbilici in regione consueta tumorem seu herniam habuit. Duodecimo post partum die praeterlapso puella vivere desit. Corpore aperto in superiori tumoris parte hepar, ex hypochondrio dextro detrusum, reliquam eius partem in epigastrio ventriculumque mira torsione in eius locum succedentem et praeter ileon, inferiorem tumoris partem occupans, reliqua omnia fere in situ naturali reppererunt.

p.289. 75) *De lue boum non contagiosa, nec proinde epidemica, sed tantum endemica* differit Idem. Luem boum, ex peculiari tantum causa inquilina natam, sub initio endemicam, in mali vero progressu ex negligentiori cura et sepultura cadauerum non satis circumspecta contagiosam fieri posse, Noster autumat. Sententiam hanc occasione luis in ducatus Coburgensis et vicinarum prouinciarum pagis quibusdam experientia confirmatam esse arbitratur. Dissectis nimirum cadaueribus et inuestigato morbo eiusque causa intestinorum tractum inflammatum reperiens morbum inflammatorium habendum esse, pronunciauit. In occasionalem causam Noster inquirens, pascua, post praegressas nebulas malae indolis, a puluisculo adhaerente cinerei coloris vitiata esse,prehendit. Causa cognita, auxilia nunc indicat Noster, quibus malum debellari ac vltior eiusdem progressus calamitosus praecaueri et auerti possit. Ad praecauendam inflammationem emollientia cum potu farinaceo calido, pingua simul, in primis herbas emollientes recentes, pabulo interspersas, folia maluae, atriplicis, lactucae, podagrariae RIVINI, lapathi fol. acut. angulat. mercurialis, semina lini et foenu graeci conquassata, farinacea alia, furfures, lac ebutyratum et oleum lini ingeri, praesentibus autem signis inflammationis nitri vnicam vnam cum camphorae drachma vna in libra vna aquae purae calidae solutam quotidie oesophago infundi iussit, donec periculum euanesceret. Hancce curationem et praeferuatiue adhibendam et saltem interponendam suasit, habita simul cura, vt armenta a pastoribus ab eiusmodi pascuis conspurcatis arceantur, pabulum collectum, siue recens siue exsiccatum prouide examinetur, lotura purgetur, nec tamen nimis humidum subministretur, ad aquam autem hanc impuram non admittantur animalia. Ne
vero

vero ex sepultura demortuorum superficialia, malum successu temporis contagiosum euaderet, Noster ideo foveas profundiores construere et terra, sufficiente calcis viuae quantitate antea iniecta, probe operiri, ipsis autem brutis demortuis cutem non detrahi iussit. Cuncta haec profuisse, omnes, qui consilium hoc commendatum sibi habuerunt, euentu edoctos esse, Noster perhibet.

78) *De Lucensium thermarum sale* disserit Cl. BEN- p.301.
VENUTI *).

81) *Conuulsionis salutaris exemplum* adfert Cl. DE- p.324.
LIUS. Puella, sex annorum, tussi humida ronchoque, catarrhum suffocatiuum minitante, laborans, praesente Cl. Auctore ex improviso et subito rigore corripitur et facies torua redditur, pauloque post in conuulsiones erumpit. Paroxysmo paululum remittente sulphur antimonii auratum Noster exhibet, quo facto pluries viscida materia copiosa per vomitum euacuatur et sensim ita restituitur, ut non solum catarrho suffocatiuo liberetur, sed et a conuulsionum paroxysmis postea immunis maneat. Conuulsionem hanc pro reuolutionis singularis specie et pro nouiter auctis et in salutarem finem susceptis motibus, quibus natura suffocationem minitanti catarrhali materiae obuiam iuit, habendam esse, Noster arbitratur.

82) GEORG. DIONYS. EHRET *de arboribus* p.326.
Sassafras dictis et Londini cultis, earumque floris characterere. Duplicis arboris flores recenset et delineat, quarum altera sine germine flores staminibus tamen glandulis et stylo simplici instructos ferebat, quam

P p 2

mascu-

*) vid. Comment. Nostr. Vol. VIII. P. III. p. 513.

masculinos flores habere adferit, altera, omnibus hisce partibus licet praesentibus, addebat germen, quam foeminam appellat Noster; vtraque folia integra et trilobata ostendebat. Vltiorem vero descriptionem suppeditat Ill. TREWIUS in addito scholio floris non solum exhibens explicationem et delineationem, sed fructus etiam baccati in calyce seu cupula succulenta contenti.

p.330. 83) *Eiusdem de planta Lithospermo affini.* Flore cum Lithospermo conuenit, calyce differt, qui perpetuo augefcit. Caule ornatur hispido, succulento, ramis alternis, foliis petiolatis irregulariter pinnatis, pinna prima angusta, reliquis latioribus profunde dentatis. Calyx est monophyllus, quinquefidus, laciniis incrementibus, corolla primo longitudine calycis, mox eadem minor, monopetala, quinquefida, stamina quinque, stylus vnicus, stigma bifidum, fructus bacca quatuor seminibus foeta. Credit itaque in scholio addito Ill. TREWIUS hanc plantam vocandam esse *Lithospermum foliis pinnatifidis pericarpio carnosio*, vel si, ob singularem fructus rationem nomen novum mereatur, mallet eandem dici *Macrocalyx*, ob calycis magnitudinem vel *Colpophyllos* ob foliorum lacinias.

p.333. 84) *Eiusdem de Iasmino? ramo unifloro, pleno, petalis coriaceis.* Elegantissimae et in flore odoratissimae huius plantae ad Caput Bonae Spei sponte pro-
venientis, cuius flores hic egregie delineantur, quod in flore pleno nec stamina nec fructus accurate stabiliri possint, genus nondum certo definire licet. Calyx est inferius tubulosus, quinquangularis, superius in quinque foliola acuta diuisus, corolla tubulosa, superius in lacinias coriaceas numerosas, quarum viginti numeravit, diuisa, stamina filamentis bre-

breuissimis instructa, tubo accreta, senario numero vix maiora, stylus vnicus, stigma bifidum, germen obscurum. Ill. TREWIUS in scholio iterum addito dubitat, num ad iasminum pertineat, quod nomen etiam dubitans ipsi indidit Cl. EHRETUS. Descriptiones variorum addit idem TREWIUS ex quibus tamen parum certi desumi potest. Iconem proposuit etiam Cl. MILLER in tabulis dictionario hortulanorum adaptatis tab. CLXXX nomine, *Iasmini foliis lanceolatis oppositis, integerrimis calycibus acutis*. Postea Cl. EHRETUS ad Ill. TREWIUM scripsit, hanc plantam, cuius specimen flore simplici, ex quo character demum certus statui possit, possideat Ill. LINNAEUS, ab ELLISIO *Gardeniam* in honorem GARDENII medici in insulae Carolinae vrbe *Charlestown* degentis, fuisse vocatam.

85) *De cardueli viginti duos annos nato per integrum adhuc annum, pennis omnibus amissis viuente, cantante et saltante*, obseruationem inseruit Cl. IOAN. CHRISTP. REINMANN. Hanc auem, quae secundum venatorum obseruationes in syluis quindecim annos viuere solet, in hypocaustis autem, cauea inclusa, raro tamdiu durat, semper in cauea detentam non solum ad uiginti duos annos vixisse, sed pennis etiam in toto corpore a rostro ad pedes usque priuatam per integrum annum vitam protraxisse, cantasse et saltasse eiusque carnem vndique pinguedine obductam fuisse, Noster refert. Anno absoluto pennas iterum crescere coepisse, carduelem vero senio confectum exspirasse, perhibet. Tab. 9 fig. 1. auis ista, pennis priuata repraesentatur. P.339.

94) *Graue capitis vulnus cum notabilis portionis cerebri iactura frustoque diffracti ossis frontis eidem intruso et per 9 dies ibidem haerente absque ullis superuen-* P.364.

nientibus periculosis symptomatibus feliciter sanatum describit Cl. IOANN. CHRIST. HILDEBRAND. Notamus, cerebri fungum applicatione pulveris, ex aristolochiae rotund. ver. recent. et myrrhae elect. aa. scrupulis duobus et salis ammoniaci electi drachma semis parati, non solum illico imminutum, sed usu eiusdem continuato extirpatum prorsus esse. Notatu etiam dignum est, aegrotum iuuenem annos 22 natum, tardum alias in actionibus suis et hebetioris ingenii, vulnere consolidato multo alacriorem et, quoad animi vires, vegetiorem euasisse, ita ut cognati eius, cum forte nimia prius cerebri mole laborasse, hacque imminuta nunc demum sapere, saepius dixerint.

p. 401. 102) *De venenatis prunarum effluuiis* differit Ill. CHRIST. IACOB. TREW. Hacce observatione, qua duarum ancillarum tristis status describitur, quarum altera variis adhibitis auxiliis euasit, altera autem nihilominus succubuit, confirmatum vidimus, prunarum vapores virus suum ita inprimis exserere, ut sanguinem coagulent et systema nervosum stupefiant. In eiusmodi casu Ill. Auctor, ut ex scholio appposito liquet, praemissa venae sectione et vomitorio ex ipecacuanha, posteaque clysmate injecto, mixturam ex lapidibus cancrorum et aceto paratam tentandam esse, suadet.

Accedimus nunc ad eas commentationes, quae in Appendice continentur et sequentes sunt.

p. I. 1) *Classès Conchyliorum*; Auctore Ill. CAROL. AUG. DE BERGEN. *)

2) In

*) Vid. Comment. nostr. Vol. IX P. III. p. 458.

2) *In variolarum inoculationem dissertatio epistolaris*, Auctore Cl. FRANCISC. RONCALLI. *) p.133.

3) *De generatione lapidum praecipue globosorum*, Auctore Cl. IOANN. FRIDER. HOFFMANN. p.173.
 Lithogenesia Cl. Auctori vocatur productio et formatio nouorum lapidum ex coniunctione materiae homogeneae vel heterogeneae secundum determinationem legum et virium naturalium in vnum corpus coalescentis, aere, aqua et igne tam seorsim quam coniunctim obstetricantibus. Materiam ad novos lapides generandos aptam suppeditant terrae, vel fragmenta, ramenta et pulueres lapidum detritorum vel minerae, quorsum et salia et bitumina et sulphura referuntur, vel tandem massae ex dictis corporibus plus minus compositae. Coniunguntur ista corpora mediante aere, vel aqua, vel igne, vel quouis eorum seorsim, vel vno cum altero, vel omnibus coniunctim. Modus coniunctionis, vel in nuda appositione, vel in destructione materiae vnus et appositione alterius, vel in fermentatione, ebullitione et coagulatione particularum, antea non cohaerentium consistit. Appositionem Noster vocat associationem vnus materiae alteri, estque ea vel immediata, id est, quae in simplici associatione consistit, vel mediata, quae mediante glutine quodam v. g. aqua, salibus, bitumine, sulphure aliisque fieri solet. Illa rarissima est, haec vero frequentior. Cum aer saepissime impraegnatus sit particulis salinis, sulphureis et fluidis, et vapores ex moderamine aerae et venti huc illuc impellantur, condensentur, lapidibusque admisceantur, fit inde, vt, particulis istis calore et frigore induratis, lapides vel dilatentur vel condensentur.

P p 4

*) l. c. Vol. VII P. III p. 536.

sentur. Prae reliquis autem aqua ad formandos novos lapides plurimum confert. Varia enim corpora permeat aqua, succos et salia extrahit, vapores excipit, et spolia ista longe lateque circumuehit et huc illuc deponit. Exerit autem operationes suas, vt Noster dicit, vel *ex corpore*, hoc est, destillatione, vt stalagmitae, stalactitae, crysalli etc. oriuntur; vel *ad corpus*, hoc est, incrustatione, vt fontium, lacuum et fluminum iniecta docent; vel *in corpus* seu filtratione, vt lignorum, ossium etc. petrificatio ostendit; vel demum simul *in et ad corpus*, seu coagulatione, quando nimirum aqua, sabulum, puluerem etc. peruadit, succisque lapidescentibus, salinis scil. et sulphureis irrigat et coagulat, ita tamen, vt calore et frigore superueniente massa lapidea oriatur; vel quando aquae, opimis spoliis turgidae, quiete istas particulas deponunt, quae postea ex glutine intermixti succi lapidescentis indurescunt. Tandem et ignis, vel a radiis solaribus, vel ab igne subterraneo proficiscens, lapidibus apponit incrementa, dum accessiones istas, ab aquis et vaporibus prouenientes figit et indurat. Atque haec sunt causae formationis, quae per appositionem fit; non raro tamen omnes memoratae causae concurrunt, ita nimirum, vt aer strato v. g. sabuloso sales et sulphura et pulueres immisceat, aqua istud et aliis salibus et particulis viscosis et oleosis coagulet, et calor tandem idem istud compactum intus et extus induret.

p.186. Alter modus formationis lapidum in effervescentia consistit, quae fit mediante acido terrisque alcalicis, vt lapidibus calcariis, creta, marmore, spato, marga, terra aluminosa, ex parte etiam ardesiis, luto, argilla, quarzo aliisque, ex quibus dein per istum modum noui lapides efformantur, quas species Noster sigillatim nunc recenset. Terra alcalica, ab acido fluido debita proportionem irrigata et in
glebam

glebam quasi liquefactam redacta, per efferuescentiam nunc in nouam massam transformatur nouumque lapidum genus producitur, quod rotundum est, si massa ista mollis citissime, hemisphaericum vero subrotundum ouale et depressum est, si eadem lente et successiue irriguerit. Itaque omnes globulos lapideos efferuescentiae ortum debere, ex Nostri sententia statuendum est. Iidem lapides vel caui sunt vel solidi; caui autem vel inanes vel praegnantes reperiuntur, hique vltimi in cavitae aquam, vel terram, vel lapidem, vel salia, vel bitumina, vel mineras includunt. Cui inanes rarissime reperiuntur, cavitaeque eorum efferuescentiae, repletio vero aliis causis ortum debet. Lapidēs cāui praegnantes vel materiem homogēneam, vel heterogēneam, vel vtramque continent, eorumque formatio a pluribus causis dependet. Ventrem horum lapidum efferuescentia constituit, quae autem in cavitae recondita sunt, vaporibus, exhalationibus, effluuiis, irrigationi, filtrationi et iniectioni aquarum, vterum horum globulorum per poros intrantium, earundemque ibidem stagnationi, fermentationi, praecipitationi et depositioni particularum tenerrimarum harumque demum cohaesioni, massaeque inclusae exsiccationi adscribenda sunt. Sententiam hanc exemplis Noster illustrat et initium capit a globulis lapideis cauis praegnantibus, qui aquam continent.

Lapis eiusmodi *Enhydros* dicitur et rarissime occurrit. Licet autem de eius existentia nonnulli dubitauerint, testimonia tamen Noster adfert, et praeter PLINIUM, ad Acta Hafniensia, ubi achates, aquam includens, describitur, atque etiam ad HENCKELIUM prouocat, qui in cavitae nodulorum lapideorum Ilmenauiensium disculorum aquam interdum repertam fuisse, testatur.

P p 5

Inter

p.192. Inter globulos terris lapidibusque praegnantibus primo loco nominatur *Aetites*. Venter huius lapidis durae substantiae et plerumque ferri compos est, intusque continet vel puluerem vel lapillum, modo mobilem, modo immobilem. Ortus huius lapidis a Nostro ita describitur: stratum arenosum, terra ochracea intermixtum, quale Noster reperit, aquae minerales, vitriolo martis imbutae, permeantes, terramque mineralem ibi deponentes, arenam ochraceo colore imbuunt. Hancce terram mineralem Noster pro reliquiis pyritae ferrei, in intimis terrae resoluti et destructi, habet, adeoque puluerem istum ochraceum ferri compotem esse, putat. Sufficienti demum copia istius pulueris cum arena mixta ex concursu alcalinorum et acidorum gleba huius massae colliquescit, efferuescit, in globulum expanditur et induratur simulque in ferri mineram transformatur. Continuato cursu aquae minerales per poros aetitae interiora subeunt, ibidemque terram mineralem deponunt, ipsae autem per calorem subterraneum euaporant. Actibus his multoties repetitis, venter tandem aetitae tenerrimis terrae mineralis particulis repletur, haeque superuenientibus aliis aquis salinis et sulphureis conglutinantur inque vnum vel plures lapillos rediguntur atque eiusmodi lapillus, embryo quasi aetitae, callimus vocatur. Si callimus iste omnem vteri cavitatem replet, callimus immobilis dicitur, sin vero vtero minor est nec adhaeret, mobilis audit tuncque aetites ipse sonorus vocatur. Diuiduntur autem aetitae in simplices et compositos, hique pluribus, illi vero vno ventre instructi sunt; diuiduntur etiam in veros et spurios, quorum illi efferuescentiae, hi vero aliis causis ortum debent. Factitios non commemoramus.

p.196. Eadem etiam respectu originis de *Geode*, qui nunc consideratur, valent, hicque ab illo tantum ratio-

ratione massae differt, siquidem geodes lutosae et terreae substantiae est, et non nisi in stratis lutosis reperitur.

Ad eandem hanc classem referendus est *globulus* p.198. *crystallinus* seu *venter crystallinus*, qui globulum ut plurimum perfecte rotundum sistit, cuius crusta externa ferri compos, aut achatina aut alius durae substantiae est, et in cavitae vteri crystallos, interiori lateri globuli adhaerentes, continet. Globuli hi effervescentiae, crystalli vero vaporibus subterraneis et sedimentis aquarum, cavitatem penetrantium, ortum debent.

Globuli achatini et chalcedonii eadem ratione p.200. oriuntur, globulusque effervescentiae, contenta vero aquis vel vaporibus mineralibus ortum debent. Licet autem de globulis achatinis et chalcedoniis solidis intus variis zonis lineisque parallelis exornatis colorumque varietate luxuriantibus alia primo intuitu concipienda forte sit opinio, hasce tamen zonas et lineas ex stratis diuersae massae, quae aqua in his globulis hospitans tanquam sedimenta deposuit, originem traxisse, putandum est.

Globulos filiceos crystallifatos eandem originis rationem habere, Noster autumat, imo etiam opacos, licet multi de eorum origine per effervescentiam dubitarint, huic ortum debere putat. p.203.

Silices igniarios seu culinarios rotundos et sphaericos reperiri, adeoque filices, variae et irregularis figurae, in agris occurrentes, pro meris eorundem fragmentis habendas esse, atque rotundos ex concursu liquoris acidi cum materia alcalina per effervescentiam formatos fuisse, Noster censet. Vere autem dari globulos filiceos, in cavitae vteri materia heterogenea repletos exemplis quibusdam Cl. Auctor probat. Ipse enim nuleum quarzofum obscure albidum, vndique minutissimis grumis flauis ochra-

ochraceis variegatum, qui inclusus fuit globulo filiceo, possidet, imo alium globum filiceum reperit, qui malleo disruptus in vtero minutissimas crystallos mirifice exsplendescentes gestavit.

p.208. Et lapidem istum rotundum, *Bezoar mineralem* dictum, ex multis quasi involucris compactum, per efferuescentiam intumuisse, hocque indurato, per poros eius laxiores in cauernam lapidis intrasse aquas, particulis terrenis et lutosiis grauidas, Cl. Auctor ostendit, eandemque rationem *Caluariis mineralibus* KIRCHERI attribuit.

p.210. Quod ad *osteocollam* attinet, ad productionem huius radicem marcidam cuiusdam vegetabilis, materiae margaceae, argillaceae et arenariae, aut tertiae, ex duabus vel tribus his mixtae, infixam requiri, modum autem efformationis, non in nuda cohaesione materiae, radici circumiacentis nec in incrustatione, sed in efferuescentia, acidis radicum salibus per irrigantes aquas elixatis orta, quaerendam esse, Noster arbitratur.

p.213. Missis aliis speciebus globulorum lapideorum terris lapidibusque praegnantium, globulos nunc considerat Noster, qui salia in vtero includunt, aliisque exemplis deficientibus ad pyritas globosos provocat, quorum formationem eadem ratione ac in aetitis et ventribus crystallinis explicandam esse, putat. Terrae enim ferri compoti, per se alcalicae, acido minerali admixto, per efferuescentiam produci globulum ferrugineum, intus cauum, postmodum aquas mineralisatas seu particulis terrestribus sulphureis et salinis grauidas, vel etiam eiusmodi vapores intrare ibidemque massam, in texturam filamentosam, striatam etc. expansam, deponere, hancque globulis pyritaceis, aurae expositis, prius in pulverem redigi, posteaque corticem etiam globuli disrupti, Cl. Auctor ostendit.

Alios

Alios globulos bitumina continere exemplo glo- p.215.
bulorum in fodinis lithantracum Wettinenfibus, in
cauitate sua asphaltum seu bitumen afferuantium,
Noster probat.

Alios denique globulos mineras continere Cl. p.215.
Auctor afferit prouocatque ea propter ad museum
Richterianum, quippe quod quarzum cauernosum,
cui aurum inest, et hemisphaericum crySTALLINUM,
cuius nucleus est cobaltum cum pyrite, ostendit.

His de formatione globulorum cauorum exposi- p.216.
tis, solidi nunc a Nostro exponuntur globuli, intus
cauitate carentes et per integram massam densitate
corporis donati. Hos Noster in duas species diui-
dit, quarum altera ex vna eademque massa consistit,
altera vero corpora peregrina includit. Ita cornua
ammonis striata in globulis solidis et firmis argilla-
ceis, gryphitae in lapidibus caseiformibus inclusi
et globi nigro cinerei reperiuntur, in meditullio
pisces herbasque continentes, certissimò, vt Noster
putat, argumento, quod globuli isti lapidei, cum
peregrina illa corpora ab extra eos intrare non po-
tuerint, fluidi antea et molles et per efferuescen-
tiam orti fuerint. Exinde autem alios quoscunque
nodulos globosos et rotundos lapideos solidos, ham-
mitas, conchritas et meconitos per efferuescentiam
productos et formatos esse concludit.

4) *Observationes medicae circa securitatem et certi-* p.231.
tudinem remediorum in singularibus quibusdam morbis.
Auctore Cl. SCHUSTER. Hic varia in variis mor-
bis a Nostro commendata deprehendimus remedia,
e quibus vero, ne nimis longi simus, pauca tantum
annotare liceat. Liquorem C. C. succinatum, prae-
ter alios nervorum affectus, et spasmo aut rheuma-
tismo, collum occupanti, aut vbi sic dictae destilla-
tiones auditum remorantur vel obauditionem quan-
dam

dam relinquunt, mederi, Noster asserit. In affectibus pectoris qui in tussibus convulsivis et ferinas ex aeris vitio epidemico vel aliis causis sporadicis terminari solent, elixir pectorale WEDELII cum essentia cascarillae mixtum laudat. In asthma simplici et cachectico asam foetidam et squillam commendatas legimus. In restituendo et prouocando fluxu haemorrhoidali tincturam antimonii acrem cum liquore minerali anodyno mixtam commendat. Ad tollendam alui obstructionem flatusque incarceratos dissipandos, praemisso leni laxante, mixturam ex essentia pimpinellae albae et liquore minerali anodyno paratam extollit. Ad omnes inflammationes internas, ad contusiones, coagulationes et congrumationes sanguinis nec non restituenda puerperarum lochia suppressa solutionem lapidum cancrorum, aceti ope factam, praesentissimum remedium esse, Noster experientia confirmatus asserit. In diarrhoeis torminosis, doloribus colicis et passionibus hystericeis tincturam rhabarbari inque vario alui fluxu testas ouorum cum antimonio diaphoretico laudat, hasque purgantibus praefert, quippe quae non semper in diarrhoeis et dysentericiis, ne quidem in initio, proficua censet. De reliquo liquorem mineralem anodynum tanquam medicamentum vere cardiacum; camphoram in affectibus inflammatoriis externis interne sumtum; regulum antimonii medicinale cum terreis propinatum in variolis aliisque lymphae vitiis sedulo a Nostro commendata deprehendimus.

p. 257. 5) *Commentatio de colore aeris* Auctore Cl. EBERHARD. Cum aer medium sit tenue atque diaphanum quo radii luminis refringuntur, Noster ea propter sub colore aeris facultatem quandam, radios quosdam coloratos fortius refringendi intelligendam esse

esse, cupit. Num vero haecce qualitas aeri vere
 insit, disquirendum et ad experientiam primo, quid
 ea doceat, attendendum esse, innuit. Docet ita- p.261.
 que experientia; 1) aerem non mutare colorem cor-
 porum propinquorum; 2) remotorum corporum
 colores, si viuidi admodum fuerint, vti albus co-
 lor vel ruber, vel plane non vel parum tantum mu-
 tari; 3) alia vero corpora, quorum color flauus,
 viridis ac violaceus vel griseus est, semper in distan-
 tia certa, coerulea apparere; 4) coelum sudum fem-
 per coeruleum apparere, huncque colorem eo ma-
 gis coeruleum esse, quo propior vertici est, eo
 magis vero albescere, quo remotior. Phaenomena
 haec duplici modo explicari posse, Noster autu-
 mat. Velenim aerem per se omni colore destitui et
 coeruleum illum colorem ex mixtione lucis cum vm-
 bra cum seu ex reflexione radiorum lucis albae atro
 colore coeli et remotorum obiectorum oriri, vel in
 ipso aere facultatem quandam, radios coeruleos
 obiectorum fortius refringendi assumendam esse, ar-
 bitratur. Prius phaenomenon, colorem nimirum
 aeris coeruleum non oriri e mixtione luminis cum
 umbra putat, idque ex eo deducit, quod color aeris
 semper manet coeruleus, licet in atmosphaera lu-
 minis copia mutetur. Minime etiam coeruleus
 aeris color, ex Nostri sententia, a mixtione lucis,
 cum umbra dependet, quia aeris color per reflexio-
 nem ab aqua, vitro similibusque corporibus, vere
 densioribus, magis viuidus non fit. Superest ita-
 que, aerem leui colore coeruleo tinctum huncque,
 in atmosphaera ortum, constantem et homogeneous
 esse. Phaenomeni huius explicationem ita Noster
 reddit. Prouocat nimirum ad experientiam atque
 ostendit, a lumine albo oriri colores, si nimirum
 radii colorati vel per reflexionem a minimis lamel-
 lis pellucidis corporum vel per refractionem a se
 inui-

innicem separantur, ita, vt is, qui maxime separatur, fortius oculum afficiat et coloris ideam producat. In aere itaque vim quandam, radios coeruleos a reliquis separandi et fortius refringendi adesse debere, hancque vim adhaesionem esse, Noster putat. Monet autem, refractionem eo maiorem esse, quo magis pellucidum corpus cum radio cohaereat, hincque ponit, refractionem radii coerulei, cum aeris minimae particulae cum coeruleo radio magis cohaereant, quam cum reliquis radiis, maiorem esse, hincque colorem coeruleum oriri. Cum autem aer admodum levis sit, cohaesionem eiusdem cum quouis radio non insignem esse posse, neque idcirco refractionem magnam adeoque coeruleum colorem, inde ortum, non insignem esse, hincque phaenomena superius p. 261 recensita, optime explicari posse, Noster arbitratur.

- P.377. 6) *Brevis historia naturalis arboris sassafras dictae lauri species et quaedam de lauri speciebus in genere occasione observationis LXXXII superius insertae conscripta a D. CHRISTOPHORO IACOBO TREW. Academ. Caesar. Natur. curiosor. Directore. Quae-
nam fuerit huius scribendi libelli ratio, ipse iam docet titulus, sed, quum per duo fere secula iam sassafras vsus innotuerit, quicquid notatu dignum ex antiquitate etiam de ea possit repeti arbore, conges-
sit, et pro more suo doctissime exposuit Ill. Auctor. Ex arduo itaque illo labore demum constitit, per sesqui seculum fere stirpis huius historiam parum vel nihil fuisse emendatam et MARCUS CATESBY primo figuram et descriptionem accuratiorem protulit anno huius seculi tricesimo septimo. Corni nomine retento, LINNAEUS vero Lauri generi inferuit. Huius quidem descriptionem secuti sunt multi recentiores, alii vero alias notas adduxerunt, quas*

quas omnes coniunctas studiosissime Cl. Auctor in p.313 historia conferente tradidit, quas tamen hic fusius adducere non possumus. Deinde vero, quo iure ad laurum referatur *fassafras*, inquit, a plerisque autem lauri vulgaris eandemque admodum differentem descriptionem traditam fuisse inuenit, quare flores eius utriusque sexus ex horto aulae principis Brandenburgico-Culmbacensis, et alios ex horto Norimbergico oblatos peruestigauit, singulaque in iis obseruata momenta accurata delineatione atque descriptione declarauit,

Hunc autem characterem formauit lauri vulgaris: p.338.

Flos masculinus. Calyx communis tetraphyllus. folia rotunda erecta, concava, proprius nullus. Corolla monopetala ad fundum usque quadrifida: segmenta ovato acuminata, concava, erecta, arcte ad fundum connexa non decidua. Stamina incerti numeri, 8 plura ad 13, corolla breuiora sine constanti ordine, plerumque tamen in extimo ordine quatuor: filamenta compressa obtusa vel obtuse acuminata: Antherae duae, oblongae, ad marginem externum extenuatae, cum filamentis utroque latere superiori continuatae: Glandulae plerumque duae, globosae, raro geminae, petiolo breuissimo filamentis interioribus, rarissime omnibus, paululum infra antheras affixae. Habet contra characterem flos femineus hunc: Calyx, corolla, ut in masculis stamina quatuor corolla breuiora ad corollae segmentorum hiatus posita: filamenta compressa, acuminata: Antherae duae cum utroque filamentis latere paullo infra eius acumen continuatae, exterius conuexae, interius cylindricae vel planae, omnes fatuae. Nectarium glandulosum nullum. Glandulae filamentorum nullae. Pistillum. Germen ovatum in centro corollae; stylus simplex, paululum inclinatus, longitudine staminum. Stigma bifidum, excauatum. Pericarpium. Drapa ovalis, acuminata, unilocularis. Semen. Nux ovata, nucleus eiusdem formae. Hinc ad hermaphroditas retulit plantas laurum LINNAEUS, differt ergo ab arbore

sassafras, corollae laciniis; flores masculini antherarum et glandularum cum filamentis nexu, feminini, quod glandulis destituuntur. Percurrit vero praeter ea diligentissime Ill. TREWIVS omnes notas lauri species, additis vndique conquisitis synonymis, atque observationibus. Inter has *Lauri Indicae* dictae flores in specie describit, et hoc denuo exemplo auctorum de hac momenta, nisi accurate satis attendantur, non conuenire, egregie docuit. Prout quoque in aliis speciebus, congeffit enim omnes, declarare satagit, forte non omnes ad vnum lauri genus referendas esse, illisque, quibus curatius disquirendi copia datur, eam operam ingenue commendat. Inprimis vero antheras florum femininorum lauri vulgaris considerandas suadet, num semper et in aliis pariter speciebus reperiantur solidae atque inanes. Laurumque ad dioecias referendam plantas adferit. Tandemque nondum certe determinatas, sub lauri nomine propositas, plantas adducit, et quum hic de genere tantum dictum, de usu medico et oeconomico arboris sassafras alic se tempore acturum esse promittit.

P.409. Tandem agmen claudunt elogia, quae Cll. VIRIS ALBERTI *), DEGNERO **), HEBENSTREITIO ***), HEISTERO ****) et EHRENBERGERO dicata sunt.

*) Vid. Comment. nostr. Vol. VI P. II p. 356 seqq.

**) l. c. Vol. VIII P. III p. 554 seqq.

***) l. c. Vol. VI P. IV p. 721 seqq.

****) l. c. Vol. VII P. IV p. 724 seqq.



II.

Essai sur les Affections Vaporeuses de deux Sexes, contenant une nouvelle méthode de traiter ces maladies, fondée sur des observations. Par M. POMME le fils, Docteur en médecine de la faculté de Montpellier. A Paris, chez Desaint et Saillant. 1760. 12. pl. 7 $\frac{1}{2}$.

h. e.

Tentamen super utriusque sexus affectionibus, quae Gallis vaporosae vocantur, continens nouam istis morbis medendi methodum, observationibus nitentem. Auctore Cl. POMME, filio. etc.

Primariis harum affectionum symptomatibus recensitis in causam earundem proximam Noster nunc inquirens nec SYDENHAMO, spirituum ataxiam accusanti, nec HOFFMANNO, motum nervorum spasmodicum, ex uteri vitio in foeminis, motumque nervorum spasmodico flatulentum ab inuerso ac peruerso motu intestinorum peristaltico, in viris agnoscenti, nec demum ex nuperis gallico medico, Cl. RAULIN *), sensibilitatem et irritabilitatem generis nervosi infimique ventris viscera obstructa indicanti, suffragatur, sed spasmus, erethismus vel p. 23. indurationem nervorum causam harum affectionum proximam et immediatam suppeditare, arbitratur. Ne autem sententia haec imaginaria esse videatur, remotas idcirco causas, proximae illi nasciturae occasio-

Q q 2

*) Vid. Comment. nostr. Vol. VIII P. IV p. 698 vbi Cl. huius Auctoris tractatum de iisdem affectionibus conscriptum recensuimus.

caſionem largientes, Noſter examinat, hiſque diſquiſitis fluidum nerueum, lubricationi et flexilitati generis neruoſi inferuiens, et ad funſtiones vitales rite exercendas aptum, ob memoratas cauſas diſſipari, inde neruorum indurationem prouenire et ab hac reliquarum partium funſtiones turbari, oſtendit.

p. 31.

Hiſ itaque praemiſſis ad curationem, ob quam in primis tractatum hunc evulgauit, progreditur eamque in ſolis diluentibus et humectantibus, tanquam remediis ad affectiones iſtas aptiſſimis et neceſſariis, poſitam eſſe, putat. In primis autem balnea domeſtica ſimplicia, compoſita, tepida et frigida, pediluua et clysmata refrigerantia, ex aqua communi frigida, imo pro ſtatuſ temporisue ratione gelida, parata; fomentationes ex herbis emollientibus; ptiſanas refrigerantes; aquam pullorum gallinaceorum; ſerum lactis; iuſcula ex pullis, teſtudine, agno, collo vitulino et ranis parata; potiones oleoſas, demulcentes et mucilaginofas tandemque aquas minerales acidulas uſurpanda, contra vero ab omnibus antihyſtericis et antiſpaſmodicis ita diſtis remediis, vt eſſentia caſtorei, oleo ſuccini, camphora, aſſa foetida aliſque eiſmodi pluribus abſtinendum eſſe, ſuadet. Affectionem hypochondriacam ab hyſterica diſtinguit, hancque, cum paroxyſmis obnoxia ſit, ſingularia ideo remedia exigere, putat. Si itaque paroxyſmus vel ante menſtruorum fluxum vel hiſce fluentibus adeſt, clyſmata, ex aqua communi frigida, ſaepeius iniicienda Noſter curat, imo adeo, ſi morbi ſtatuſ ipſumque tempus id permittunt, huic aquam gelidam, vtpote remedium nunquam effectū ſalutari deſtitutum, praefert. Sic enim calorem viſcerum exceſſiuum exſtingui, rigiditatem imminui ſpaſmumque cedere, cerebrum deobſtrui, circulum humorum liberioſem fieri, ſpiritusque animales naturalem ruruſ ſtatuſ obtinere, putat.

putat. Si suffocatio violenta est, fluxusque menstruus penitus obstructus, pedes ad genua usque in aquam frigidam immergendos esse, suadet; paroxysmo autem ad primum fluxum menstruum reuertente venae sectionem quidem in pede admittit, nunquam tamen eam aut raro repetit, sique ea non sufficit, clysmata frigida, pediluua et balnea usurpat, et praeter haec aquam hordei largiter ingerendam pro potu, iusculaue ex lacte pro victu suadet. Si fluxus menstruus antea suppressus fuerit, istum pediluuiis calidis et extremitatum frictionibus, a BOERHAAVIO olim adeo commendatis, hirudinumque pariter ad vuluam applicatione, quam Cl. MAIAULT *) suadet, reuocari, Noster perhibet. Si paroxysmus hystericus colicis violentis, quas comitatur diarrhoea et vomitus, stipatur, clysmatibus pinguibus, potionibus oleosis, demulcentibus et mucilaginosis, narcoticis iunctis, vtendum est. In clauo hystericco, vaporosum dicit Noster, balnea tepida valent; tussis vero conuulsiva fomentationibus et ptisanis gallinaceis cedit. In syncope clysmata frigida, in cardialgia aqua tepida copiosius hausta et in singultu serum lactis pro potu ordinario et balnea commendantur. Si tandem mammae a causa hystERICA intumescunt, intumescuntiam applicatione linteorum, aqua frigida imbutorum, plerumque dissipari, Noster refert.

Quod ad affectionem hypochondriacam spectat, p. 48. istam eadem vitia neruorum agnoscere ideoque eadem ratione tractandam esse, Cl. Auctor monet. Symptomata in ista rarius quidem tam graua, pertinaciora tamen, apparent; inde ista vix adeo rigorosam, diu tamen continuandam, curationem poscit. Conueniunt pariter balnea domestica; insigni-

Qq 3

ter

*) Vid. Comment. nostr. Vol. IX P. III p. 450.

ter nocet lac: serum vero lactis, ptisana gallinacea, clysmata tepida et frigida, fomenta ex herbis emollientibus parata profunt, hirudinumque applicatio ad haemorrhoides vsum insignem praestat. Animi pathemata eiusdemque perturbatio quantum fieri potest, corrigenda inque id continuo allaborandum est, vt equitatione, uestione, conuentu concentuque musico corrigatur. Aquae minerales optime conueniunt, sed ex Nostri sententia non nisi sub finem curationis vsurpatae profunt. In vniuersum humectantibus, si curationem aggressus fueris, sique quod maximum est, balnea in vsum vocaueris, affectiones istas, quantumuis inueteratas, funditus euerti, contra vero easdem, stomachicis, cardiacis, aperientibus, purgantibus et antispasmodicis si tractaueris, incurabiles reddi, experieris.

P. 54. At vero et cum aliis morbis eadem hae affectiones haud raro complicatae sunt, inde singularis attentio adhibenda est. Ita foeminas puerperas, lochiis vel imminutis, vel suppressis, tot omnino tamque grauium malorum causas suppeditantibus, balneis, vt reuocentur ea, audacter immergendas esse, suadet. In febre miliari, foeminis puerperis tam frequenti saepissimeque a remediis antihystericis producta, ptisanam gallinaceam, clysmata frequentia aliaque eiusmodi remedia, non solum tendinum subsultus, horrorem et tremores vniuersales sedare, sed et eruptionem miliarem praecauere, asserit. In febribus intermittentibus et continuis, tempore grauiditatis superuenientibus, corticis peruiani vsum perniciosum iudicat eique contra humectantia et diluentia praefert, vel, si vrget necessitas, cum his eundem saltem coniungi, iubet. In tympanitide carminatiua et purgantia venenorum vices gerere, venaesectionem vero et humectantia, illico vsurpata, malum tollere, ostendit.

Eadem

Eadem ratione et cum aliis morbis complicatur p. 60.
 malum hypochondriacum similiaque proinde ex-
 poscit. Ita virus venereum, si eiusmodi corpus
 inuadit, balnea domestica, serum lactis, iuscula
 gallinacea, fomentationes et clysternata requirere,
 hacque curandi methodo perturbationem, a speci-
 fico illo remedio antiuenero, hypochondriacis adeo
 contrario, prouenientem praecaueri, Noster asse-
 rit. Si malum scorbuticum associatur, acida pro-
 sunt et vnica salus in diaeta vegetabili et humectante
 quaerenda est. Scrophulae remedia resoluentia
 et incidentia cum humectantibus coniungenda requi-
 runt. Si podagra adest, singulare regimen obser-
 vandum est: in primis autem lac asininum serum
 lactis et abstinentia praesertim a vino conuenit. In
 cachexia tandem saepius associata vel solum serum
 lactis insignem opem ferre sicque plura incommoda
 auerti, Noster monet. Atque haec sunt primaria
 momenta, quae de Cl. Auctoris methodo, dictis
 affectionibus medendi, decerpere licuit. Quod ad
 reliqua huius libelli contenta attinet, ea, quae de
 curatione in genere tradidit Cl. Auctor, nunc expe-
 rientia et singulis obseruationibus, numero octode-
 cim, confirmata deprehendimus.

Prima obseruatio affectionem hysterica[m] descri- p. 67.
 bit, quae praeter alia graua symptomata et hemi-
 plegia et catalepsi stipata fuit. Nocuerunt in tristi
 huius morbi statu et venaesectio et cardiaca, quae
 per octo annos adhibita fueruat; tempore vero isto
 praeterlapso balneis domesticis et ptisanis gallina-
 ceis per longum tempus vsurpatis miseram tandem
 conualuisse, imo adeo post hoc tempus nouo in-
 commodo superueniente, calculo nimirum vesicae,
 ope aquae cuiusdam mineralis injectae liberatam
 fuisse, legimus.

- p. 84. Secunda obseruatio suppressionem vrinae et euacuationis aluinae commemorat, quarum posterior per longum tempus durans vsu balneorum tepidorum, prior autem per aliquot menses durans vsu balneorum frigidorum sublata est.
- p. 91. Obseruatio tertia hystericae foeminae meminit, quae omnia cibus potusque genera vomitu reiecit et pe balnei restituta fuit.
- p. 95. Obseruatio quarta similem fere casum continet, ita tamen, vt cum foemina aegrotans balnei domestici vsum pertinaciter respuat, quacuis autem humectantia ob insignem iam fibrarum ventriculi viscerumue indurationem frustra exhibeantur, morbus proinde, nisi balneum in vsum vocetur, vix unquam curandus pronuncietur.
- p. 97. Obseruatio quinta et sexta suffocationis hystericae mentionem faciunt, vbi in duabus aegris et clysmata frigida et pediluua frigida auxilio fuerunt.
- p. 102. Obseruatio septima foeminae melancholico hypochondriacae historiam tradit, quae per longum tempus colica hysterica motibusque conuulsivis laborauit et vsurpatis balneis frigidis itidemque clysmatibus frigidis ptisanisue refrigerantibus sanitatem recuperauit.
- p. 105. Obseruatio octaua similem fere aegram, haemoptysi nimirum omni mense recurrente laborantem, sistit, quae a malo hoc ope clysmatum frigidorum, ptisanae gallinaceae et balnei domestici liberata fuit.
- p. 110. Obseruatio nona, a qua ad decimam tertiam vsque nonnulli affectus hypochondriaci, potiore sexum flagellantes, describuntur, aegrum commemorat, qui diu dolore capitis cruciatus, postmodum lipothymia correptus, tandem hemiplecticus factus vsurpatis centum et sexaginta balneis domesticis tepidis, totidemque iusculis ex gallinis et testu-

dini-

dinibus paratis copiosisue clysmatibus egelidis pluribusque frigidis sanitatem recuperavit.

Observatio decima aegrotantis meminit, qui p.120.
per duos annos vomitu vexatus ope ptisanæ gallina-
ceae, per integrum mensem vsurpatae, ab eo libera-
tus fuit. Flatus vero ructusue postea relictī vsu
aquarum mineralium d' *Teuset* balneorumque do-
mesticorum cessarunt.

Observatio vndecima similis fere aegrotantis hi- p.122.
storiam tradit, grauiori magisque molesto vomitu
cruciati. Reiecit enim materiem nigram, foetidam,
insignis amaritiei, vereque atrabilariam. Similes
ptisanæ, fomentationes, balnea domestica et clysmata,
frequenter vsurpata, insigne leuamen adtule-
runt; tandem vitæ insuper genere mutato nego-
tiisque sepositis atque vsu dictorum remediorum
continuato aegrotantem perfecte conualuisse, le-
gimus.

Observatio duodecima aëgrum sistit, qui per p.130.
duos annos doloribus in regione lumbari, femori-
bus cruribusue vexatus extremitatum tandem rigi-
ditate ita correptus fuit, vt gressus eiusdem impe-
diretur. Balneis per mensem adhibitis dolores ces-
sarunt vigorque pedum rediit. Iterum iterumque
hisce malis afflictus eadem balnea vsurpauit, iuscu-
lisque tandem gallinaceis seroque lactis destillato
interne sumtis plenarie conualuit.

Decima tertia observatio, quæ nostro non est, p.132.
similem fere statum describit, vbi quis post præ-
gressam choleram et subsequentem febrem rigiditate
extremitatum insigni correptus vsu balneorum do-
mesticorum aliorumque humectantium, per integrum
annum continuato, pristinam sanitatem recuperavit.

Observatio decima quarta ad vltimam vsque af p.136.
fectus complicatos sistit, et primo quidem tympani-
tis spasmodica commemoratur, quæ fomentationi-

bus frigidis, ptisana gallinacea, aqua gelida, fero lactis et clysmatibus oleosis vsurpatis cessauit.

p. 138. In alia aegra, quam obseruatio decima quinta describit, eodem malo affecta, venaelectio in pede instituta minime profuit, clysmata et serum lactis vix iuuamen adtulerunt, frigidae vero fomentationes et balnea flatus expulerunt, lacteque diluto vsurpato diarrhoea supervenit, quae curationem absoluit.

p. 145. Obseruatio decima sexta leucophlegmatiae meminit, quae post praegressam febrem relicta vsu feri lactis lactisque asinini cessauit.

p. 150. Obseruatio decima septima febrem putridam, affectu hysterico complicatam et feliciter curatam sistit. Febre nimirum putrida post diem decimum quartum notabiliter imminuta delirium omniumque membrorum tremor et totius corporis rigiditas accessit; quibus visis Noster de affectu hysterico statim cogitans aegram aquae sub trinis vicibus immerfit, quo facto febris vna cum delirio cessauit, atque aegra perfecte conualuit.

p. 156. Vltima obseruatio aegram puerperam, lochiis ob spasmodicos vasorum vteri motus suppressis laborantem commemorat, quae vsurpatis elixiris spirituosus febre correpta fuit. Balneis ab aegra reiectis, ptisana vero gallinacea frigidisque clysmatibus vsurpatis febris omniaque symptomata cessarunt, et lochia redierunt.

p. 161. In fine tandem libelli regimen diaeteticum et quidquid eiusmodi affectis sedulo obseruandum sit, Noster subnectit. Itaque panem bene fermentatum, carnes simplicissimas, auium v. g. iuniorum et eorum tantum animalium, quae herbis vescuntur, in primis autem olerum vsum commendat, reliqua ciborum genera interdicit: inter potulenta vero nihil nisi aquam frigidam copiose bibendam admittit. De reli-

reliquo corporis exercitium et inprimis equitationem vsurpandam, omnes autem animi affectus, in primis iram compescendam esse, suadet. Tandem etiam ciuitatis strepitus cum ruris solatiis saepe commutare, nec raro amicorum conuentibus concentibusque musicis interesse et obiectorum varietatibus delectari, iubet.

III.

Animaduersiones chemicae ad ictum fulminis in arce regia Vpsaliensi d. XXIV. Aug. MDCCLX.

Chemiska Anmaerkningar, oefver Aoskeslaget pao Kongl. Stottet i Upsala. d. 24 Aug. 1760. Praefide Cl. IOH. GOTTSCHALCK WALLERIO et Resp. Carol. Petr. Wibom. Vpsaliae 1761. 4. pl. 8.

Vehementissimis fulminis istius, quod d. 24 Aug. anno 1760 arcem regiam Vpsaliensem percussit, effectibus descriptis, Noster postea suas adfert annotationes, primoque ad sulphureum principium attendit. Cum nimirum in domo, vbi ignis fulminaris vim suam et effectum ostendit, semper odor sulphureus penetrantissimus interdum cum fumo densissimo interdum cum floribus sulphuris percipiatur, ex odore hocce acido vitriolico vel sulphureo in ictu tonitruali ad praesentiam sulphuris cuiusdam concludendum esse, Cl. Auctor asserit. Vaporem tamen sulphuris vulgarem eundem, qui in tonitruali obseruatur motu, non esse, monet, idque ex effectibus quos exferit fulminare sulphur, ostendere allaborat. Ita enim vapor sulphureus tonitrualis partes inauratas

ratas non solum aggreditur et nigro colore tingit, sed et easdem aliquantulum liquefacit; stannum liquat; cuprum et ferrum interdum fundit nullo apparente scorificationis indicio, interdum colliquatione quadam perterebrata post se relinquit, interdum scorificat; saxa et tegulas murorum non tantum penetrat verum etiam fundit et terebra quasi perforat, lignea corpora transeundo interdum diffringit, interdum non findit, interdum etiam comburit ac post transitum furorem suum aequè vehementer ac ante exserit; ossa animalium salua cute et carne diffringit vel liquida celeriter coagulat; vim suam in instanti exserit nec accedente aqua retardari nec debilitari potest. Ex quibus omnibus acidum et inflammabile sulphuris, fulmen constituentis, ab acido et inflammabili sulphuris vulgaris, tam quoad effectum, quam quoad subtilitatem, diuersum omnino esse, Noster concludit.

p. 36. Vt causa huius ignis fulminaris in effectibus suis exferendis modoque operandi melius explicetur, experimenta quaedam chemica Noster profert, quibus ignem ictumque fulminis illustrare conatur. Ita enim ad aurum fulminans eiusque praeparationem et effectum; ad accensionem nitri flammantis; ad indolem pyrophorum horumque accensionem in aere libero; ad naturam phosphorum eorumque analysin et synthésin; ad flammam ex commixtione acidi nitrosi cum oleis oriundam; ad effectus ex miscella ferri et sulphuris obortos; ad vaporem demum, ex solutione limaturae martis in oleo vitrioli, aqua diluto, prodeuntem inque vesica collectum admota condela fulminis instar accensum sedulo attendendum esse, praecipit.

p. 42 Verum, cum plerique physici vim electricam et fulmen ab vna eademque causa dependere, asserant, plures ea propter effectus Cl. Auctor recenset, quos vis electrica et fulmen pari ratione producant. Ita enim

enim vis electrica aequae ac fulmen magnam et eandem obseruat corporum differentiam, quaedam nimirum transit, quaedam non penetrat; quaedam ictu concutit, quaedam non mouet; quaedam tandem liquat, quaedam non liquefacit. Pari ratione vim suam exercet fulmen: facillime nimirum fulmen corpora vegetabilia transit; lapidea ictu quasi percutit; ad corpora metallica maximam attractionem exferit, eadem interdum colliquatione quasi perforat, interdum omnino fundit; lignea non tantum quasi comburit, verum etiam accendit; vim suam velociter exferit et maxima cum celeritate ab vno in alterum corpus transit, eodemque momento percutit, quo fulminat; homines brutaque animalia sine exteriori quodam damno in momento necat; sapore vitriolico gustus sensum afficit; odorem sulphureum post se relinquit omnesque sensus aequae ac materies electrica afficit. Ex quibus effectibus, in fulmine aequae ac materia electrica, maiori tamen in gradu in illo quam in hac, deprehendendis, fulmen et vim electricam vni eidemque materiae suos debere natales eademque non nisi gradu maiori vel minori intensitatis differre, cum Nostro statuendum est.

Demonstrata fulminis visque electricae similitudine tandem Cl. Auctor disquirat. quatenus illa sit materies, e qua huiusmodi effectus dependent. Cum in omnibus fere aedibus, ubi ignis fulminaris vestigia violentiae suae reliquit, odor sulphureus cum fumo et floribus sulphuris adsit. istam ea propter materiem a materie inflammabili, cum vitriolico acido combinata, deducendam esse, autumat, ita tamen, ut particulae istae acidae et inflammabiles non vulgare, sed subtile principiale sulphur constituent, eaeque in tellure, corporibus terrestribus inque atmosphaera nostra existant et ab exhalationibus

bus ortum trahant. Particulas enim aquosas mediante calore a corporibus telluris ascendere, easdemque cum subtilissima materie inflammabili, in aere reperiundo, combinari sicque acidum primigenium, ad naturam acidi vitriolici accedens, generari, Cl. Auctor ostendit. Iam vero ab hoc acido primigenio, vniuersali, ope materiae luminis, ab inflammabili diuersae, cum subtilissima materia inflammabili combinato sulphur illud principiale oriri hocque miris istis fulminis visque electricae phaenomenis ortum praebere, in nubibus collectum, eas electricas reddere atque, his in motum excitatis, ab eodem motu ac attritu accendi et accensum omnem sibi in sua directione obuiam materiem accendere, ab aere propelli vimque suam exercere, ex Nostri sententia statuendum est. Quod tandem ad velocitatem materiae electricae et fulmineae pertinet, eam a subtilitate, puritate ac leuitate istius materiae, nec non a motu eiusdem impresso, vehementemque istius actionem a velocitate ista, adiuuante insimul aeris actione, dependere, sonitum vero, ictum fulminis comitantem, a concussu particularum aeris elasticarum prouenire, Noster arbitratur.

IV.

Observations on the Changes of the Air and the concomitant epidemical Diseases, in the Island of Barbados. To which is added a Treatise on the putrid bilious Fever commonly called the Yellow Fever and such other diseases as are indigenous or endemial in the West India Islands, or in the Torrid Zone. By WILLIAM HILLARY M. D. London printed for C. Hitch and L. Hawes, 1759. 8vo mai. 1 alph. 1 pl.

h. e.

h. e.

Obferuationes de mutationibus aeris et coniunctis morbis epidemicis in infula Barbados, quibus additur tractatus de febribus putridis biliosis, Yellow Fever dictis aliisque morbis, qui in Infulis indiae occidentalis siue Zona torrida endemii sunt. Auctore GUILLIELMO HILLARY, M. D.

Barbados parua infula est inter Caribaeas Indiae occidentalis, terra alta rupestris et sicca vix riuolo irroratur, aqua fontium rarius proflit, sed ut plurimum effodiendo acquiritur. Incolae diaetae studiosi sani sunt, haud vero ad summam senectatem procedunt: laeduntur maxime et mortem sibi accelerant, qui in calidis his terris vinoso et spirituofo potu abutuntur. Europaei vel incolae Americae septentrionalis in has terras accedentes, ut plurimum efflorescentiis et tumoribus cutaneis afficiuntur, qui saepe tenue flauescens serum fundunt et cuticulae erosionem et desquamationem finiuntur. Aer ut plurimum serenus est excepto tempore pluuioso; calor insignis, ut raro, ne matutino quidem et frigidissimo tempore, sub septuagesimum thermometri Fahrenheitiani gradum descendat mercurius, rarius et die calidissimo, supra octuagesimum sextum ascendat; calor tamen per octo vel nouem menses continuos maxime relaxat solida animalia et humores ad diathesin putridam disponit. His et aliis generalioribus in introductione praemissis, librum ipsum in duas partes distribuit, in quarum prima obferuationes de mutationibus aeris eiusque effectibus declarat, in altera vero de variis morbis ibi regnantibus exponit et medendi rationem addit.

Anno.

p. 15. Annotationes vero de mutationibus aëris omni cura a mense martio 1752 vsque ad mensem maium 1758 factae fuerunt, ita vt in singulis mensibus summum descensus et ascensus thermometri gradum et matutino et vespertino tempore obseruatum simili-que modo barometri statum et tandem pluuiæ copiam indicent, ex his mutationibus morbi epidemice grassantes indicantur et varia medendi methodus additur, nonnullaeque obseruationes insperguntur, quae lectu vtilis sunt inprimis cum Cl Auctor in notis subiectis varias quaestiones circa causas morborum moueat et resoluat. Equidem varia notatu digna ex his repeti possent, cum autem de praecipuis in ipsa morborum declaratione exponi queat, primam hanc partem mittimus et ad recensionem morborum nos conuertimus.

p. 143. Morbum, quem Galli *la maladie de Siam* vel *la fièvre Matelotte*, Hispani ob vomitum nigrum *Vomitopreto*, et Angli ob colorem cutis *Yellow Fever* appellant, optime febris putridae biliosae nomine insigniuit Noster; endemius est in prouincijs zonae torridae ideoque etiam in insula Barbados et vicinis, nihil contagiosi nec pestilentialis habet, sed eos maxime, qui ex frigidioribus prouincijs in has calidiores transeunt, afficit. Aeger primo debilitatur et vertiginosus fit, paulo post horripilationem sentit, quam vehemens calor et febris cum intensis doloribus spinae et capitis excipit. Rubor faciei cum inflammatione et calore oculorum, anxietate praecordiorum signa pathognomonica huius febris exhibent; his interdum accedit vomitus biliosus. Pulsus est celer, mollis, palpitans, nunquam durus, respiratio frequens et difficilis. Sanguis sub initium ductus floridus, ruber et tenuis, quando refrixit cruor vix cohaeret et serum maxime flauum supernatans habet. Haec et alia similia symptomata succedunt.

successive increscunt, et vel tertio vel quarto die primum morbi stadium desinit, in quo tempore putrida resolutio sanguinis semper augetur.

Post tertium diem pulsus quidem nonnunquam p.149. in celeritate persistit, saepius tamen longe remissior et naturali similis fit, vomitus bilis porraceae sequitur, aeger comatosus redditur et per intervalla delirat. Sudores frigidi, facies primum, paulo post totum corpus icteritico colore imbitur, quae bilis effusio ex summa humorum resolutione evenit, et tristem morbi exitum denuntiat. Rarius enim et tunc demum hoc signum criticum est, quando octavo vel nono die morbi, eo nimirum tempore, quo symptomata maligna iam multum remiserunt, accedit. Vt plurimum enim, post flavedinem apparentem, symptomata ita increscunt, ut coma profundum, pulsus vermicularis et intermittens, haemorrhagiae ex variis corporis partibus erumpentes et alia mortis vicinae indicia appareant. Haemorrhagiae in primis in vomitu et defecatione aluina, cum flava et nigra bile remixta, se ostendunt. Cadauera mox post obitum turgent, et maculis nigris et lividis praecipue circa praecordia et hypochondrium dextrum conspicua sunt, et post dissectionem vesicula felle et ductus biliarii putrida et nigra bile distenduntur, quae etiam in hepate et ventriculo se diffundit; gangraenae indicia et celerior putrefactio in toto corpore observantur. Ex qua morbi consideratione cognoscitur, bilem putridam resolutam per totum corpus se diffundere et humoribus summam resolutionem, solidis autem partibus destructionem inducere, quam quidem res Noster porro illustrat, et ad indicationes curatorias progreditur. In principio igitur febris impetum refrenare, paulo post putridam bilem subito, sed blande euacuare,

putridam tandem humorum dispositionem corrigere et gangraenam imminuentem auertere iubet.

p.157. Ad febrim compescendam venaeſectio, et primo quidem die, requiritur, ſanguinis tamen copia ex aegri diſpoſitione, vehementia febris et ſymptomatibus concomitantibus diiudicanda eſt. Si pulſus poſt venaeſectionem plenior eſt, nunquam enim durus fit, ſecunda die denuo venaeſectio inſtituenda eſt, tertio tamen die nunquam cum fructu ſuſcepta fuit; vires enim iam fractae et reſolutio nimia humorum hoc auxilium inutile, immo noxium, reddunt.

p.159. Cum vomitus bilioſus frequentiſſimum ſymptoma fit, nullum emeticum, nec mitiſſimum, quod ſtimulo laedit, exhiberi poteſt, vomitus tamen aqua calida, infuſo theae viridis et pauxillo oxymellis ſimplicis adiuuari poteſt, poſtquam autem materia morboſa aliquoties vomitu reiecta fuit, clyſma, quo cralla inteſtina euacuantur, iniiciendum eſt; tunc temporis anodynum exhibendum eſt, ſcilicet extracti thebaici granum vnum, vel vnum cum ſemiſſe in exigua vehiculi copia, et ita per aliquot horas acquieſcendum, quo hoc medicamentum retineatur et effectum ſuum edat. Antiphlogiſticum porro purgans ex manna et tamarindis bilioſam materiam apte per inferiora ſubducit. Nitrum et inde praeparata, licet antiphlogiſticum ſal ſit, a Noſtro prorsus reſicitur, cum et hunc ſtimulum ferre nequeant aegri.

p.163. In diatheſi putrida humorum corrigenda non aptius eſt remedium cortice peruiano eo: tamen vix vti potuit Noſter, cum vix vnam vel alteram doſin aſſumere et retinere poſſint aegri. Infuſum itaque aquoſum radicis ſerpentariae virginianae et croci cum elixirio vitrioli vt optima hoc in ſtatu danda medicamenta laudat, quae et tertio iam die, ſi febris non decreſcat, exhibenda ſunt,
quo

quo vis vitae sustineatur. Alcalina volatilia vt antiputrida damnat, licet enim per experimenta ostensum sit, carnosas partes post mortem iis a putredine praeferuari, haec tamen medicamenta, viuis humoribus admixta, aestum augent. Coma, delirium, pulsus parvus et refrigerium extremorum vesicatoria indicare videntur, cum vero in hoc morbo symptomata non a lentore atque visciditate humorum, sed a nimia eorundem resolutione pendeant, noxia ea pronunciat, licet a nonnullis in febre depressa adhibeantur. Et in progressu morbi lenia purgantia p.168. antiphlogistica non prorsus intermittenda, sed altero vel tertio die repetenda sunt. Simplicem hunc sed tutam incedendi viam in tam vehementi morbo saepius proficuum fuisse et Noster ostendit et exemplo illustrat.

Decolica sicca, quae pictonum dicitur, postea agit p.182. Cl. Auctor. Perspiratione nimia et sudore emaciati, animi affectibus tristibus agitati, inprimis spirituofo potu abutentes, hoc morbo, qui in insulis Americanis endemius est, afficiuntur. Dolor acutus in ventriculo et intestinis flatibus distentis se extendit, nausea succedit, et interdum parum bilis cum pituita reiicitur. Obstructio aluina pertinax et teneismus intestina ita contracta sistunt, vt manus, abdomini applicata, eas percipiat. Faeces aluinae rarissime excernuntur et tunc sunt durae globosae; dysuria quoque accedit, pulsus est tardior, raro per dolorem acceleratur, vt plurimum enim nulla febris accedit. Si minus apta medendi methodus adhibetur, morbus ad vigesimum et trigesimum diem, raro diutius, protrahitur et tunc per intervalla tantum saeuit, quo in casu saepius anima foetida excrementorum tetrum odorem refert. Dolor intestinorum diutius protractus ad spinam et scapulas extenditur, et extremitates, quae sub initium morbi frigent, tan-

dem paralyfi afficiuntur. Materia morbi subtilis, metaſtaſi ad cerebrum producta, ſtuporem, deliria, conuulſiones et tandem mortem inducit, interdum ileus morbus triſtem vitae finem facit. Hiftoriam morbi ſubiungit Noſter, ex qua cognoscitur, morbi materiam paralyſin manuum effeciſſe, qua per applicata externa medicamenta diſcuſſa, dolor inteſtino-
rum rediit, et hoc iterum ceſſante, manus iterum paralyſi affectae fuerunt.

p. 188. De varia medendi methodo poſtea differit Noſter et noxam ex validioribus purgantibus oriundam declarat; paulo poſt indicationem curatoriam ita diſponit, vt dolor et id, quod neruos irritat, removeatur, et materia morbi per inteſtina, ſine violentia libera reddita, eiiciatur. In ſummis itaque doloribus, qui mox ſub ingreſſum morbi ſe exſerunt, extracti thebaici grana duo vel tria, vel per ſe, vel cum aliquot guttulis baſami peruuiiani, exhibuit Cl. Auſtor, nec exiguam, ſed maiorem, opii doſin neceſſariam eſſe monet, ſi effectus expectationi reſpondere debet. Si medicamentum vomitu reiicitur, eundem tartari vitriolati ſcrupulo ſemis et gutta vna olei cinnamomi in aqua menthae aſſumta compeſci iubet, raro autem plethora et inflammationis metus venaeſectionem exigunt. Aluum poſtea partitis doſibus pulueris ex ſalibus mediis et cremore tartari cum pauxillo olei cinnamomi mixto ſolui iubet, addendo interdum quinque grana pulueris ialappae. Si ventriculus pulueres ſalinos non fert, illos in aqua menthae diſſolui iubet; clyſma praeterea et fomentationes emollientes abdomini applicari ſuadet. In conuulſionibus ſimul obortis grana decem moſchi opio iungit et audacter affirmat, niſi magna hac doſi opii dolores refrenentur et lenioribus medicamentis aluus moueatur, auxilium nullum expectari poſſe, his tamen malum vere cedere experientia con-

convictus afferit. Vti vero victus facilis digestionis in ipso morbo exhibendus est, sic post morbum etiam superatum similem victum admittendum esse monet.

Vti autem varii ventris fluxus in his terris frequenter sunt, sic dysenteria potissimum saepius epidemica grassatur. Post aestum et siccitatem aeris, a mense maio ad augustum vsque durantem, a septembri ad nouembrum vsque copiosae pluviae cadunt, quae eo magis molestae sunt, cum dies sine pluvia intercurrentes calidissimi quoque sint; acres itaque redditae humores in perspiratione suppressa ad intestina feruntur et morbum hunc excitant. Non negandum est, miasma malignum, ex aere haustum, cum salua ad primas vias deferri et morbum augere. Symptomata consueta ideo recensentur et methodus medendi succincte explicatur, in qua declaranda praeter ipecacuanhae vomitorium et rhabarbarum tostum cum opio, non neglecta tamen venae sectione nitri vsum maxime commendat, cum vehementia febris et inflammatio intestinorum aegrum magis, quam ipsae deiectiones, eneruent.

Progredimur ad considerationem tetani, morbi in frigidioribus prouinciis rarius visi, frequentius autem in calidioribus, ita vt in insulis Indiae occidentalis endemius dici possit. Differentia tetani, emprosthotoni et episthotoni a Graecis tradita, a varia corporis distensione desumpta, accidentalis est, in causae disquisitione enim omnes conueniunt. Producitur autem morbus vel ab exiguo vulnere et punctura, isque tardius decimo, vel decimo quarto die et vulnere saepe iam curato motibus conuulsivis corpus inuadit, vel a refrigerio post calorem, vbi citius accedit, vel in infantibus a meconio retento et acri materia in primis viis haerente, vbi citissime ii conuelluntur. Aeger sentit tensiones praecordiorum

rum et maxillae, difficilis deglutitio sine tumore faucium succedit, dolor ad spinam cum spasmo musculorum ibi sitorum tandem obseruatur. Motus conuulsiui, morbo crescente, augentur, et per interualla saepius recurrunt, et per dolores intensos corpus ad varium situm extensionis et flexionis disponitur. Si morbus a punctura oritur, nulla febris simul accedit, in paroxysmo tamen pulsus increscens et difficilis respiratio obseruatur. Vrina vix mutatur, aluus obstructa musculis abdominalibus rigidis introrsum retractis. Sub insigni igitur anxietate semper per interualla accedunt et intenduntur spasmi, donec vehemens paroxysmus miserae vitae finem faciat, sensus tamen vsque ad vltimum vitae momentum persistunt. Morbus vero, prout paroxysmi celerius et tardius increscunt, in nonnullis ad tertium et quartum diem, in aliis ad decimum vel vndecimum producitur.

p.227. Cum tam vehemens spasmus a leuissimis causis oriatur, explicatio effectus ex sua causa difficillima est; nec ad consensum neruorum prouocare sufficit, fatendum potius, nos naturam neruorum et fluidi in illis moti nondum satis cognoscere, ideoque solis phaenomenorum obseruationibus inhaerendum esse.

In curatoria indicatione causa irritans neruum stimulans remouenda et tensio neruorum relaxanda est. Si itaque vulnusculum vel punctura causa est, disquisitio chirurgi requiritur, qui materiam irritantem, quae in vulnere forte adhuc haeret, si etiam ea minutissimum spiculum sit, remoueat, et incisione supra puncturam facta neruum prorsus discindat, vulnere postea, vt decet, curato. Ad spasmos porro sopiendos moschus a granis octo ad duodecim, et extracti thebaici grana duo vel tria, sub varia forma, aliis nonnullis antispasmodicis medicamentis admixta exhibeantur, et sexta vel decima
vel

vel vndecima hora similis dosis, si opus est, propinetur. Quum magna autem sit opii dosis proposita, Cl. Auctor tamen monet, eam in hominibus quoque eius vsui non assuetis nec insignem stuporem, sed tantum duarum vel trium horarum somnum induxisse, licet intra viginti quatuor horas sedecim vel viginti grana extracti thebaici exhibuerit. Inprimis autem hoc observauit, si moschus opio iunctus fuit, ita vt tandem spasms non nihil mitigatis, in maioribus interuallis potentissimum hoc antispasmodicum dari queat. Fomentationibus et linimentis emollientibus quoque regiones praecordiorum, maxillae et colli, nec non spinae dorsi relaxandae sunt. Semicupium alii commendant, sed Noster non consentit, aegrum potius vidit, qui mox post balnei non adeo calidi applicationem obiit. Pulsus languidus et frigus extremorum cardiaca medicamenta blanda exigunt, et aluus, quae obstructa est, clystere emolliatur. Purgantia, venaesectio et alia euacuantia omnino noxia inueniuntur. Methodus medendi in tetano a refrigerio orto ferme similis est, nisi quod chirurgica incisio haud requiratur, in vno tamen et altero casu aeger, post morbum etiam superatum, per aliquot hebdomadas imbecillis est et vires lente recuperat.

Opisthotonus et tetanus infantum ab iis causis p.240.
oritur, a quibus in nostris terris motus epileptici proueniunt, leuiiores tamen saepe causae vehementiores effectus in his terris calidioribus inducunt; difficilis etiam auxilii applicatio est, si enim talem infantem et leuiter tangas, mox in horrendum tetanum coniicitur; morbus itaque praesens vix tolli, sed imminens tantum praecaueri potest, idque clysmatibus protinus iniectis et lenissimis aetati nimirum conuenientibus purgantibus datis. Moschi postea grana tria cum guttis decem spiritus cornu cerui et

R r 4

non-

nonnullis antacidis exhibentur, vel moschi grano vno cum quatuor guttis tincturae thebaicae, syrupo exceptis spasmi coerceantur. Nec mirum videatur teneris infantibus opium exhiberi, cum enim nullum aliud auxilium inueniatur, et infantis mors, hoc neglecto, certo subsequatur, heroicum hoc remedium omnino tentandum est.

p.245. Mittimus alia, quae de rabie canina, de chronicis nonnullis morbis, de nyctalopia, de vena medinensi siue dracunculo, Noster fusius proposuit, ne limites speciminis exhibendi transeamus. Et cum hac ipsa ratione commoti omnia, quae de elephantiasi, lepra arabum, lepra articulorum *) lepra, quam barbaro nomine *Taws* dicunt, quae cum lepra Iudaeorum conuenit, tandem de impetigine proposuit Cl. Auctor, digne satis repetere nequeamus, specimen tamen elephantiasis proponere non incongruum duximus.

p.304. Aeger ad hunc morbum suscipiendum dispositus sine euidenti causa occasionali rigore afficitur, simili modo, vt in accessu febris acutae, accedunt dolores capitis et spinae, ventriculus angitur et haud raro ad vomitum disponitur, eodem tempore glandulae inguinales vnius lateris dolent, aestus febrilis progreditur et grauissimis symptomatibus concurrentibus per viginti, triginta et quadraginta octo horas durat. Glandulae inguinales interea vehementer dolent, rubrae et durae euadunt, raro tamen ad suppurationem ducuntur. Ab his glandulis tumor durus, ruber, pollicis latitudine versus inferiora descendit, pes tumet et inflammatur, paulo post febris sopitur, glandularum et pedis tumor successue decrescunt, et aeger sanitati redditus videtur. Similis accessus febrilis saepius recurrit, periodis qui-

*) vid. Comment. nostr. Vol. IX. part. IV. p. 671.

quidem incertis sed saepe bis, ter vel quater in vno anno, post varios itaque huius febris ingressus pes magis intumescit. et oedematosus fit, licet inflammatio facile discutiatur, membrana cellulosa indurascit et nonnunquam quasi callosa et cartilaginea fit; cutis crassior redditur, finditur, in squamas dehiscit, et in corpore saepius macilento tota extremitas vnus lateris ita mole augetur, vt elephantis pedem vere referat, vnde morbus nomen duxit. Vtrumque pedem nonnunquam ita crassum fieri, quidam asseruerunt, Noster vero morbum non nisi ab vno latere formatum vidit, non negat tamen, hunc decubitus morbosum rarissime ad alias partes deduci. In pede post amputationem disquisito membrana adiposa crassissima, cellulis tamen pinguedine, apparenter pura, sed non nihil viscida, repletis obseruata fuit, tunicae arteriarum et venarum maxime distentae erant, ita vt in amputatione supra genu suscepta duodecim rami arteriae ligatura excipiendi essent; intumuerat quoque in hoc aegroto arteria femoralis, et nervus popliteus paulo crassior inueniebatur, muscoli et tendines de reliquo sani erant, nullumque vitium ossibus inhaerebat. Materia itaque morbi, per febres periodice recurrentis, in cellularem et cutaneam substantiam deposita veram elephantiasin producit. Aegri vero per plures, immo viginti, annos monstrosus hunc pedem circumferunt, nunquam, nisi sub febris accessu, aegrotantes.

Natura et symptomata febris, elephantiasin in p.310. ducentis, ex irregularibus intermittentibus esse ostendunt, licet itaque periodi incertae sint, in cura tamen, quae, materia morbi nondum in crure fixa reddita, suscipi potest, eo respiciendum est. Si post febris accessum tumor rubicundus a glandulis inguinalibus versus pedem descendit, quod patho-

gnomonicum signum est, venaesectio minus recte administratur, naturam enim in critica euacuatione impedit, pulsu tamen pleno et duro in plethoricis existente, ea admitti potest. Vomitus accedens leni vomitorio excipiendus est, praeterea vero libera perspiratio et diaphoresis iuuanda est; si aeger languet, cardiaca medicamenta danda sunt et parti affectae vesicatorium et fomentationes applicandae. Si inflammatio et tumor cessauit, cortex peruianus successe ad duas vncias exhibeatur, et post mensis decursum alia corticis vncia subiungatur, et quo recidua febris auertatur, similis medicina saepius reiteretur et balneum frigidum suadeatur, quae quidem in relaxatis per calorem aeris corporibus maxime profunt. Morbus autem, nisi in primis initiis supprimatur, curari nequit. Amputatio sine fructu suscepta fuit, transiit enim materia ad oppositam partem; dubitat etiam Noster auxilio esse posse, si, quod nonnulli proposuerunt, post amputationem vulnus apertum seruetur, quo morbosae materiae continuus exitus concilietur.

V.

Dissertation sur la Cause, qui corrompt et noircit les Grains de bled dans les Epis; et sur les moyens de prevenir ces accidens. Qui a remporté le prix au jugement de l'Academie Royale de Belles Lettres, Sciences et Arts de Bourdeaux. Par M. TILLET, de Bourdeaux, Directeur de la Monnoye de Troyes et Bourdeaux. chez la Veuve de Pierre Brun, 1755 4. pl. 19.

Suite des experiences et reflexions relatives a la dissertation sur la cause, qui corrompt et noircit

cit les Grains de bled dans les épes, et sur les moyens de prévenir ces accidens. Par M. TILLET a Paris, chez Briasson. 1755. 4. pl. 9.

i. e.

Dissertatio de causâ corrumpente et nigra red-dente grana frumenti in spicis, nec non de modo, eam tollendi; praemio ornata ab academia regia elegantiorum litterarum, scientiarum et artium Burdigalensi. Auctore Cl. TILLET.

Nec non

Relatio vltior experimentorum et obseruationum supra eandem materiam, Auctore eodem TILLET.

Multo sane cum studio atque non minori cum industria susceptus a Cl. Auctore labor ad inuestigandam difficilem causam, quae adeo multas inducere solet noxas, vtique meretur, vt eius etiam, licet serius, hic mentionem iniiciamus. Non enim superficialia, sed saepe repetita, disquisitione veritatem dignoscere et confirmare dedit operam aliorum etiam opiniones rite pensitans atque diiudicans. Quare omnis in duas partes secedit dissertatio, quarum prima ipsam rem, eius naturam et causas percurrit, altera vero experimenta instituta et inde factas consecutiones in quadam quasi serie proponit, quarum etiam aliae, in relatione vberiore, ex nouis enatae tentaminibus adduntur. Prima iterum pars quatuor constat capitibus: differentes admodum variorum auctorum opiniones atque hypotheses de frumenti morbis, remediisque iisdem adhiben-

hibendis in *primo* pertractantur *capite*, quae non raro sibi e diametro quasi sunt oppositae; hae vero sententiae ex factis optime refutantur observationibus, quas in *secundo capite* adducit Noster, atque ad propositas opiniones applicat. Exinde diuersa morborum genera frumenti in *tertio capite* stabilit, alia maiori, minori alia cum damno coniuncta esse docens, de vera tamen eorum causa *quarto* tandem *capite* disputat, suamque mentem explicat. His quasi fundamentis iactis superstruuntur deinde consecraria, veritatis assumptae opinionis testes. Ex notatu itaque dignis illis observationibus momenta hic commemorabimus praecipua.

P. 4. Refert itaque Cl. Auctor primo loco de iis diversis opinionibus, quas in Diario Verdunensi propositas legimus, alii mutationem sementis necessariam adsumserunt, alii nebulas accusarunt, nec praeparationem terrae quidquam valere crediderunt, iterum alii in grana causam coniiciunt, quae in granario humida reddita sunt, vel non satis matura reposita, alii arsenicum terrae admiscent, ad destruendam causam morbi: alii ab oleo aethereo, volatili, viscosoque rem deducunt, quod, granis sese insinuans, eadem in incremento laedat atque corrumpat, hinc remedium non admittat: alii tandem a fimo ouillo recenti, cum terris mixto, corruptionis originem deducunt. Inter antiquiores porro IOANNES BAUHINVS radiis solaribus, ad spicas pluuia humectatas accedentibus, tribuit granorum putredinem, quae pene est sententia THEOPHRASTI. Cl. WOLFIVS incrementi vitio et monstrosae conformationi adscribit, PLUCHE vero guttulis pluuiae tenerioris, quas radii solares in vitra quasi caustica conuertunt. DU HAMEL frumentum corruptum non progerminare adserit, assentitur TULLIE, qui omnem causam corruptionis, ab humiditate

tate terrae repetit, morbum autem lixiuio salis marini cum calcis viuae puluere, seminibus admiscendo tolli posse adfirmat: BONNETUS tandem rorem frigidum accusat, et hinc frumenta in decliuiori loco nascentia magis huic morbo obnoxia esse credit ac quae in montosis occurrunt seu altioribus locis.

His itaque diuersis opinionibus prius sua opponere quam possit argumenta Cl. TILLET, in *capite secundo* obseruationes, tanquam fundamenta diiudicandi praemittit. Sunt autem hae: Spicae nigrae, corruptae, culmis, ex vna radice prodeuntibus, innascentes, omnes nigrae et corruptae sunt: Idem granum integras et corruptas spicas producit, eadem spica semina bona et corrupta, grana bona inter corrupta continentur et contra. Folliculus, cui granum corruptum inest, tria stamina habet, semini adplicata magnitudini seminis aequalia vel minora, rarissime longiora: spicae in vaginis suis iam corruptae quandoque sunt, ipsa vagina viridi adhuc: triticum barbatum aequae ac illud sine barba corrumpitur: fecalis grana nunquam in puluerem nigrum corrupta fatiscunt: triticum, in terra perpetuo humida studiose enutritum, nec vnum granum nigrum aut corruptum ostendit. Ex his autem obseruatis Noster nunc veritatem adductarum sententiarum oppugnat, simulque declarat, causas corruptionis adductas cum illis stare non posse.

Quo vero possit genuina causa eo tutius constitui, de morbis cerealium plantarum *tertio capite* exponit. Plerique hos confundunt morbos, Cl. DUCHAMEL aliquos magis sollicitè distinxit. *Rubigo* est morbus, qui culmos et folia rubicunda obducit massa, ut rubigo in ferro. Hic subtilis puluis facillime sedens digitos inquinat, et absolute affectarum partium incrementum coerces. Nebulae plerumque ficcae, quibus ardentes solis radii superueniunt, pro causa habentur, nec improbabile est, acres his inesse

esse particulas, his autem fieri Noster credit, vt exterior plantarum cuticula arrodatur, atque succi visceri oleosique ex ipsa planta excernantur, et exsiccati in puluerem rubrum conuertantur. Succos autem talis indolis ex plantis excerni docet mannae exemplum; si enim per nebulas plantis applicarentur illae moleculae, intelligi non posset, quare vnus culmus afficiatur, et alter non aequae: quum e contrario dispositio vnus et delicatior habitus rem facilius ex adducta sententia illustret. Alius morbus est, dum spicae pars superior nulla vel infocunda grana producit, *bleds coulés* nominat Cl. DU HAMEL, si spicae in vniuersum tenuia, rugosaeque grana, pauca farina repleta, producant, *bleds echaudés* et *retraits* nominat. Hi tamen morbi non admodum funesti sunt, quum aliquae saepe frumentorum plantulae tantum adficiantur, qui vero totam spicam destruunt, iterum triplicis sunt generis, dum nempe abortiunt, (*bleds avortés*) vbi culmus cum foliis, antea spicam quam euoluunt, iam destruitur, folia contorquentur, liuescunt, grana perduntur, nunquam maturitatem attingunt; dum in carbonem quasi conuertuntur (*bleds charbonnés*) tota enim spica destruitur, granum remanet sicco nigroque puluere plenum, filamentis albis immixtis; dum cariola fiunt grana, (*bleds cariés*) et formam suam retinentia in puluerem viscidum, nigrum conuertuntur, ex sede sua, si sicca reddita fuerint, secedunt, et tempore florendi colore liuido induuntur, folliculi albas maculas ostendunt, granum, solito maius, profunde viridi colore instruitur, stamina ad latus grani adplicata, marcescunt, intusque haerens materia viscida, nigra foetet. Et de hoc potissimum morbo praecipue Nostri sermo est. Inter ea omnes tamen hi distincti morbi aliquando complicati habentur, et accidit, vt inter corrupta spicae
grana

grana vnum alterumque integrum inuenerit Cl. Auditor, vel nascantur culmi corrupti ex eadem radice cum fanis.

Specialem etiam fecalis morbum, clauos nimirum vel fecale cornutum considerat Noster, *Ergot* dicunt Galli. Quum plerumque hunc quoque morbum humiditati aeris adscribere et soli tribuere fecali soleant, vtrumque falsum esse exquisitis declarat experientiis, simulque adserit, puncturis insectorum deberi incrementum hocce corruptum, quae forte succi venenati quidquam immisceant, in farina-cea granorum massa fermentationem excitantis. Hinc clauos illos perniciem et varios hominum morbos producere. Tandem non fecale tantum, vt plerumque putatur, sed alias etiam plantas, vt gramen boliaceum, ab hoc morbo affici, experientia teste, monstrat. P. 41.

Specialiores autem, circa grana cariosa institutae, obseruationes, quae *capite quarto* collectae extant, demonstrarunt occasionem de causa huius morbi, coniecturas formandi, quae eo collimant, vt insectorum ictibus omnes sit res adscribenda. Prima corruptionis rudimenta in culmis, ad vnus pedis altitudinem adscendentibus, demum deprehendebantur, quippe qui tunc incuruati et nodosi quasi erant, foliaque recuruata ostendebant. Grana, in spica ex sua vagina prodeunte, inuenienda, in statu naturali albicantia atque stylis villosis ornata, nunc viridia tantum vno vel pluribus apicibus instructa conspiciebantur. Mense deinde iunio in mutationes granuli inquisiturus Noster, inuenit magnam minorum insectulorum quantitatem, quae studiofiore disquisitione pertinere ipsi videntur ad staphylinos, elytras breues, alas magnas plicatas habebant, duas porro antennis ex variis particulis compositas, duabus scilicet ad sex pro ratione aetatis insectorum, P. 49.
pedes

pedes ipsis erant sex inaequalis magnitudinis, ex duplici articulo constantes, corpus a pectore ad caudam nouem annulos ostendebat, caudae extremum in duos pilos, cornuum ad instar, abibat. Quum autem nondum ex hac obseruatione palam fieret, num haecce infecta sint causa corruptionis et quamnam potissimum illa afficiant partem, florendi tempus expectans Noster, in granis, paullo profundiore viridi nunc colore imbutis, inuenit materiem viscidam nigricantem et foetidam. In granis vero apertis reperit infecta rubra et nigra, illa minora, de reliquo his simillima erant, immo mutationibus

P. 55. perpeffis staphylini euadebant vtraque. Microscopio tandem adiuuante vidit illa infecta non nisi fucum oleosum fugere, qui pistillo, ex polline antherarum adhaeret, simulque ex eo, quod capsulas antherarum ante florendi tempus in corruptis granis marcidas, vacuas, apertasque inuenit, suspicatur, rubra infecta, reliquis viuidiora, pollinem ex hisce antheris ipsum deuorare. Multis autem argumentis vltius comprobare annititur Cl. TILLET, quo modo supra descripti morbi principes frumenti possint ab hisce enasci infectis, vt in teneriori statu forsitan foliorum subtiles tubulos arrodant, et ob fucorum impeditiorem transitum eorum contractionem atque reuolutionem efficiant, quod ob pollinis destructionem semina abortiant, ob inuolucrum tenerum tenelli grani arrosus, in carbonem conuertantur, pulueremque impalpabilem nigrum sistant. Modeste tamen de hac sua iudicat hypothesis Noster, et, quum multa adhuc sint, quae videri possent contraria, vel aliae etiam simul quidquam conferre

P. 66. causae, en elegit terrae spatium 540 pedes longum et 24 latum, in quinque aequales stationes diuisit, primae admiscuit fimum columbinum; secundae ouinum, calidissimum adhuc; tertiae excrementa huma-

humana ; quartae fimum equinum et mulorum ;
 quintae nihil. Singulam porro stationem in sex
 subdivisit partes , quamlibet in quatuor plagas, qua-
 rum singula octodecim pedes longa, quinque lata
 erat, his inspersa sunt grana, vel cum calce viua
 aut cum nitro praeparata, vel pura sine praepara-
 tione, vel cum calce viua et sale marino mixta, vel
 nigra puluere granorum cariosorum adpersa. In
 omni autem re summa cum attentione versatus est,
 et ad finem huius partis supplementi loco ex prae-
 missis conditionibus colligit momenta obseruata,
 quae facile praeterimus, quod multa ex his intelli-
 gantur ex iam dictis. Hoc tamen monemus, Cl.
 Auctorem arbitrari, insecta hyberno tempore sub
 terra latere, ex radicibus succum fugere, et pri- p. 80.
 mam hinc corruptionis notam inducere, quae ve-
 neni ad instar sese per omnem plantam diffundat et
 praecipuum in spica florente effectum edat. Hieme
 enim frumenti plantas perire vidit, quibus radices
 erant affectae, rhachiticas seu corruptas primo mox
 vere distingui ; nondum tamen audet affirmare, quod
 puluis granorum corruptorum quasi germen, cor-
 ruptionem, faciens, sit, vel quod morbus ille nigra
 reddens grana, sit hereditarius.

Nunc ad alteram disputationis partem [deuenia- p. 83.
 mus, quae diuersorum annorum repetita experimenta
 proponit et diiudicat. Recensetur itaque omnis muta-
 tio obseruata in frumento, in diuersas stationes, supra
 adductas fato, quam tamen omnem hic adducere a
 nostro alienum est scopo, vt denuo aliqua tantum
 speciminis loco adnotare possimus. Caries v. c. lolii p. 128.
 ipsum iterum lolium inquinat et in eundem morbum
 grana coniicit sana ; et, licet saepe grana abluantur
 aqua, illa tamen lotionem, qua maiores pulueris
 contagiosi moleculae tolli quidem possunt, maligni-
 tas auferri nequit, quae granis iam impressa est.

- Mirum, tritici cariosum puluerem lolium non ad-
ficere. Effectus autem corrumpentes cariei optime
nitrum et calx viua, terrae admixta aufert. Magis
tamen proficuum est, purissima eligere grana, de
quibus metus non est, vt tantillum admixtum sit
suspecti pulueris, quod autem aegre fieri potest.
- p.136. Ad comprobendam secretam, quae in puluere ca-
rioforum granorum est, malignitatem illud etiam
valet tentamen, quo compertum est, sanissima et
optime matura ceteroquin grana, si diutius in pul-
vere carioso detinentur, veneni malignitatem con-
trahere, quae post varias, cum aqua communi in-
stitutas lotiones, adhuc conspicua euadit. Eam
- p.138. quoque non propagant solum stramina, puluere
eius modi carioso infecta, sed etiam pulueris tenuis
portio, in agrum optime constitutum, eiusque de-
terminatum locum inspersa, quae solam hanc par-
ticulam inquinauerat. Quo euidentius haec confir-
marentur, cistulam Cl. TILLET, in duos diuisit
loculos, alterum pura terra repleuit, et en bonas
sanasque produxit spicas, alterum terra, puluere
nigro imbuta, quae non nisi cariosas tulit spicas.
- p.143. Ex his autem aliisque multis tentaminibus conclu-
ditur, naturam et indolem veram morbi esse adhuc
incognitam, certissimam autem corruptionis caus-
sam in puluere carioso latere, vt granum sanum
contagio veloci et communicatione intima venenum
latens percipiat, illudque ad grana dimittat, inde
iterum prouenientia: vt illa grana semel infecta in
puluerem sese conuertant nigrum et reliquorum
corruptionis causa existant: vt ipsa, quae spicas
produxerant cariosas, stramina pestifera sint granis
vicinis. Praeparationes autem, a Cl. Auctore ad-
hibitae, maxime infecta grana a contagio defende-
runt, idque eo maiori cum fiducia, quoniam grana
sic praeparata, diu adhuc nigrum applicatum pulue-
rem

rem retinuerunt. Postquam deinde variis, huic opinioni opponendis obiectionibus obuiam iuit, de hoc contagio idem valere adserit, quod de lue venerea inter homines: non sponte nasci, sed sola propagari communicatione. p. 145.

Similibus et longe pluribus, in hunc finem susceptis et institutis experienciis referta est *relatio ulterior*, quum nihil vellet praetermittere Cl. Auctor, quod ad morbum declarandum vel auerendum possit suscipi. Et prout in priori tentaminum parte tantum inficiebat grana, quo malignitatem in propagatione intelligeret, ita in hac praecipue ad id attentus fuit, vt nunquam semina infecta et nigro conspurcata puluere adhiberet prius ipsa quam variis praeparationibus applicatis contagiosam granorum indolem delere studuisset. Horum remediorum magna est farrago, quibus usus est Cl. TILLET, quaedam optime successerunt. Nos vero, quum diarium laborum susceptorum describere nequeamus, denuo potiora adducemus momenta. Frigus hybernum corruptas plantulas, quasi debiliores p. 28. facilius destruxit ac sanas. Clavi secalis, *ergot*, nullum contagium exferunt, continent enim vermem p. 30. seu erucam, quae papilionem exhibet, alis, pedibus atque antennis ex albo maculatis, reliquo corpore fuscum. Iterum experimento cognouit, puluerem nigrum ex carioso tritico nil nocere secali, hordeo, sed infecta stramina semper. Si purissima p. 39. grana adhibueris, nunquam cariosae enascuntur plantae, vnico grano intermixto, morbus propagatur. Sementis, cui addebantur lixiuia, infecta licet, nullam corruptam habuit plantam, vt lixiuio cinerum recens crematorum lignorum, vel lixiuio cinerum clauellatorum, sodae, salis marini, nitrique contigit. Idem euentus ex vrina vaccina et humana putrefacta, ex vrina cum calcis viuae

- pulvere, nec non ex spiritus nitri parte vna, nou in
vera aquae fontanae, vel si aliquid calcis viuae huic
p. 44. adderetur. Solutione nitri humectata terra, in-
sperso copioso puluere carioso et superaddito calcis
viuae puluere nulla noxa inueniebatur superistes,
aeque ac ex solutione cinerum clauellorum cum
p. 47. calce viua. Puluis autem saepe iam dictus niger
cariosus, si in sulcos inspergebatur, quibus immit-
tebantur grana, infusa it eadem, magis tamen, si ille
puluis, nouo tentamine, antea gradu caloris sat
p. 49. magno fuerit exsiccatus. Denuo quoque constitit,
puluerem granorum tritici neutiquam affecisse lo-
lium. Quum itaque multis illis et natura sua etiam
differentibus admixtis comprobatum fuerit, pulue-
rem illum nigrum, adeo deuastantem agrorum se-
mentim posse, venenum suumquo minus exferat,
compesci, tandem ea demum commendat sollicitate,
quae parum laboris et minus sumptuum exigunt,
quippe quod oeconomi vtrumque adhibere detre-
ctent, ergo concludit, inter omnia hic adducta re-
media praecipue eminere: lixiuium sodae, cinerum
clauellorum, vrinam putrefactam, lixiuium porro
ex cineribus recenter concrematorum lignorum, cal-
cis viuae admixtione.

Est autem haec potissimum remediorum obser-
uatio oeconomis vtique salutaris futura, eo vero
vlterius phycis enitendum, vt veram contagii il-
lius originem atque naturam perspiciant,



VI.

B. S. ALBINI academiarum annotationum Liber Quintus. Continet anatomica oportunitate necessariae defensionis. Leidae. Apud I. et H. Verbeek 1761. 4 pl. 19 tab. aen. 2.

Quantum quidem intersit erudito, in inquirenda, eruenda, vel stabilienda veritate occupato, sui etiam laboris peracti, si recte fecerit, gloriam aliquam referre, sin minus, emendatione doceri, nullus est, quin in se ipso sentiat. Et quam mirifice afficimur, si aliqua inuentionis rei, nondum satis perspectae, laus in nos redundat? Quam denegatam aegre aliquando tulisse et iure quodam obseruamus eos, qui suo honori quidquam detractum fuisse percipiunt, sed ea propter difficile admodum redditur iudicium, nisi omnes luculenter queant declarari conditiones, quae ad corroborandam veritatem omnibus aequae ac singulis scitu sunt admodum necessariae. Videntur autem haec praemonenda esse, si de Ill. ALBINI hoc in libro exhibita defensione nobis est referendum. Magnus ille et inter dissecutores, subtiliumque rerum, ad corpus nostrum pertinentium, scrutatores excellentissimus ALBINUS, a multis iam abhinc annis, in indagandis corporis nostri penetralibus studiosissime versatus est, multa aliis curatius vidit, auditoribusque suis exposuit, quorum in numero habuit haud paucos, qui in monstrato progredientes tramite vni intenti rei tandem abscondita detexerunt, immo aliis communicantes in lucem produxerunt. Nunc autem, ob tardiores anatomicarum annotationum editionem factum est, vt aliqua proponerentur tanquam noua, prout in suis aduersariis illa adnotauerat Ill. ALBINUS, quae iam ante ab aliis

erant alibi adlata atque demonstrata. De qua re itaque conquestus est inter alios Ill. HALLERUS, cui iam quaedam denuo opposuerat in quarto annotationum libro ALBINUS *) nunc autem quintum huncce librum integrum fere defensionis suae dicasse Ill. ALBINUM notamus, de qua vero cam potissimum a nobis plura iam adduci nequeunt ob rationem, quod, nisi plenissime omnia exponantur argumenta, nemo de eorum pondere possit iudicare verius, id, quod a nostro certe scopo abesse sentimus, Pertinent autem inter alia ad ea, quae de periglottide, de tegumento penis nervoso, de valuula coli, de corporis nostri constructione ex vasis, de tela cellulosa cet. inter hosce Cll. viros controuersa sunt. Amouere a se etiam, quae obiiciuntur, operam dedit Ill. HALLERUS, in nupera elementorum physiologiae tomi quarti editione, illique praemissa praefatione.

Miramur interim, Ill. Auctorem, anatomicis obseruationibus adeo diuitem, huncce libellum illis controuersis solum destinasse et repetitis saepe iisdem lectoris fatigasse patientiam: nihil enim relatum legimus de duabus, libro subiunctis, iconibus, praeter harum tabularum explicationem, quarum itaque rationem reddere adhuc liceat. *Prima* nimirum *tabula* vterum puerperae sistit, per longitudinem dissectum, ex quo varia ad vterum grauidum spectantia possunt intelligi, quae etiam ab illis discrepant momentis, quae in vteri grauidi delineatione olim proposita sunt ab Ill. ALBINO, notandum tamen, non constituisse, quot dierum puerpera fuerit. Omnes enim vteri partes crassiores fere apparent, ac in vtero grauido. *Secunda tabula* os coxae dextrum a parte exteriori exhibet: huius luxatum fuerat

*) Vid. Comment. nostr. Vol. VIII P. II p. 257.

rat caput sursum retrorsumque, acetabulum contractum, ouatum redditum. Supra illud in ilio atque ischio inaequalitas, cui caput femoris inhaerebat, tanquam in acetabulo, caput vero femoris paruum, depressum et inaequale deprehendebatur.

VII.

Florae Danicae iconum fasciculus primus.
Hafniae 1761 fol. Icones. 60. Explicatio tabular. pl. 3.

Primo instituti regii, de edenda Tora Danica capti, consilio *) ita nunc a Cl. OEDERO satisfactum esse laeti significamus, vt primus fasciculus indigenarum plantarum iam prodierit. Nec opus esse arbitramur, vt plura de ipso denuo moneamus opere, quum, quae ad eius elegantiam atque praerogatiuam prae multis aliis pertinent, superiore iam loco indicauerimus. Occurrunt quidem hic plantarum tantum icones, sed quod, ob rationes, alio iam loco explicatas, non potuerunt descriptiones vberiores his addi, quippe quas separato libello exponere animus est, brevis tantum nominum additus est indiculus, qui tum denominationes veterum, in primis CL. VSSII, C. BAUHINI, RAII, aliorumque, qui vel descriptiones vel delineationes earum optimas dederunt, continet, tum et potissimum recentissimorum botanicorum specificas descriptiones, vt LINNAEI et HALLERI, tandemque locum natalem tradit. Sequuntur deinde, sed sine ordine systematico illae, iam alibi dictae, plantae, quum alius in his ordo vel successionis modus eligi non poterit, liberum autem relinquatur cuique, quo pro

S s 4

sua

*) Vid. Comment. nostr. Vol. IX. P. IV. p. 701.

sua voluntate, ad quamcunque voluerit normam, eas disponere valeat. Quinque tandem eius modi fasciculi singulari quodam ornabuntur titulo praefixo, eorum in gratiam, quibus magis placuerit illa folia, in librum colligata, conseruare. Duplex primi fasciculi nobis ad manus est exemplum, nigrum alterum et purum, alterum vero viuus pictum coloribus, de quibus dubitamus, num sculptoris aut pictoris magis artem laudare debeamus, aut in imitanda natura Cl. OEDERI industriam admirari. Pleraque ex his plantis, si fieri potuit, integrae, quoad omnes partes proponuntur, vt radicis formam, foliorum, quae circa radicem, vel in caule et ramis, vel ad flores fructusque sunt, indolem et figuram intueri possimus, nec non florum etiam partes haud raro essentielles exhibentur, ex quibus characteres botanici definiri debent. Aliquando etiam, si ob subtilitatem cerni sufficienter atque distinguere nequeunt, aucta magnitudine apposita, notae euidentiores redduntur.

Constitueramus quidem vnius alteriusue plantae speciem singularem hic adducere, quae ceteris sit anteponenda, sed in tanto pulcherrimarum iconum apparatu difficile utique erat, aliquam instituere electionem. Pedicularis, quae sceptrum carolinum tab. XXVI. magnitudine sua et elegantia insignis, aequae ac subularia aquatica tab. XXXV. paruitate sua sese commendat; iustis etiam censoribus in hoc iam specimine variarum vnius generis specierum, inter se comparandarum, exoptata suppeditatur occasio. Quare consentientes eosdem nos habituros esse confidimus, si in continuando expediendoque hoc opere Cl. Auctori sanitatis, temporisque felicitatem ex animo apprecemur.

VIII.

*Der wunderbare und vielleicht in der Natur noch nie erschienene Eulenzwitzer, nebst der Baumraupe, aus welcher derselbe entstanden, und welche vor einigen Jahren an vielen Orten Sachsens überaus großen Schaden gethan. Beschrieben und mit einigen auf die Natur dieser Rau-
pen sich gründenden Vorschlägen sie am leichtesten zu verringern und am sicher-
sten auszurotten begleitet von IACOB CHRI-
STIAN SCHAEFFER etc. Nebst einer Kupferta-
fel mit ausgemahlten Abbildungen. Re-
genspurg in der Montagischen Buchhand-
lung 1761. 4. 4 Bogen.*

h. e.

Miranda nec a natura forsan vnquam producta
phalaena hermaphroditica, cum descriptione
erucæ, ex qua illa prouenit, quæ in mul-
tis etiam Saxoniae locis variis abhinc an-
nis ingentem noxam produxit. Adduntur
varia, ex natura huius erucæ deducta media
eam imminuendi vel tollendi penitus Aucto-
re IACOBO CHRISTIANO SCHAEFFERO.
Cum icone viuus coloribus picta.

Idem ille, cuius saepe iam scripta laudauimus, Cl.
SCHAEFFERUS, occasione hermaphroditi ab
amico accepti ea, quæ de illa eruca iam olim 1752
in peculiari libello commentatus fuerat, repetit at-
que non nulla emendat. In tres vero tota tractatio

S s 5

diuisa

diuisa est sectiones, quarum *prima* erucam perniciosam, eius formam, qualitates et metamorphoses: *secunda* hermaphroditum: *tertia* media eam imminuendi atque tollendi describit. Studium et curam decentem nec hic desiderari iudicabunt naturae scrutatores, quibus SCHAEFFERORUM assiduitas non est incognita. Adduxerunt iam hancce erucam in suis de similibus insectis commentariis REAUMURIUS p. 6. FRISCHIUS atque ROESELIUS. Est autem illa sedecim pedibus instructa, duodecim anulis, capite grandi, papillis pilosis, a latere lineis luteis, tuberculis decem violaceis et duodecim profunde rubris, in dorso conspicuis. Prouenit ex copiosissimis ouis, quae in vnum aceruum, trecenta ad quingenta continentem, congeruntur, piloso contextu coniunctis. Vescitur omnibus fere vegetabilibus, et maiores noxas adfert, quod post aliquot menses demum ad perfectionem deueniat, quo tamen tempore exuias deponit, vsque dum demum ad metamorphosin subeundam euadat apta. Praeterimus ea, quae de nymphea eiusque motu, si attingitur, hic distincte descripta habentur. Tandem phalaena post mensis vnus spatium prodit, in qua sexus ipse varias notabiles differentias demonstrat. Magnitudine, colorum varietate et forma differt vterque. Femina abdomine prae viro duplo fere maior et crassior est, antennis longioribus, filiformibus, quae in viro breuiores, incuruae et plumosae sunt. Feminae in alis superioribus colorem ostendunt ex albo cinereum, viri fuscum, abdomen in illis luteolum, in his dilute flauum. In feminis alae superiores quinque incuruas latiusculas lineas, et inter secundam et tertiam magnum ex nigro fuscum punctum, nec non in margine similes quatuordecim, et in limbo inferiorum alarum sedecim, habent, quae lineae prorsus a maris delineatione discrepant, quippe

quippe inter quas numero minores nigrae lineae
occurrunt. Haec autem momenta ea propter a
nobis simul erant adnotanda, quo ratio appareat,
quare phalaena illa singularis hermaphroditica sit a
Cl. Auctore dicta, quippe in qua dimidiata corpo- p. 15.
ris pars virum, altera feminam accurate refert.
Partium enim genitalium disquisitio, quum Noster
exsiccatam phalaenam acceperit, erat impossibilis.
Quod tandem ad media erucas illas adeo funestas p. 21.
extinguendas vel imminuendas pertinet; ea in de-
structione ouorum, erucarum, nympharum vel
phalaenarum consistunt.

IX.

Noui Commentarii Academiae Scientiarum Im-
perialis Petropolitanae. Petropoli typis Aca-
demiae scientiarum. 4 Tomus V. ad annum
1754 et 1755. impressus 1760 Alph. 2, pl.
14, tab. aen. 13. Tomus VI ad annum 1756
et 1757 impress. 1761 Alph. 3, pl. 1½, tab.
aen. 16.

Ex egregiis his et erudite conscriptis commenta-
tionibus earum tantum, quae in classe physica
occurrunt, summam cum lectoribus nostris com-
municamus. Occurrit autem,

1) *Alkekengi calyce profunde diuiso fructu sicco*, p. 319.
Auctore Cl. 10. CHRIST. HEBENSTREIT. Cum
in descriptione huius plantae, quam tradidit Cl.
FEUILLEE, Botanicus Parisiensis, nonnulla ma-
xime necessaria desiderentur, Noster ideo operae
pretium esse duxit, si succinctam et plenam omnium
partium commemorationem exhiberet. Describi-
tur

tur autem sequenti ratione: Planta est annua, radice fibroso tuberosa fulta, caulem protrudit erectum, quadrangularem, sulcatum, huic folia adhaerent alterna, oblonga, in vtraque superficie laeuius, in circumferentia irregulariter dentata et sinuata; rami ad angulos acutos exsurgentes, brachiati, quaquauersum disperguntur; pedunculi vniflori paulo altius, ac ramulus et petiolus, ex ipso caule enascuntur; calyx monophyllus, turgidus, profunde sectus, productionibus sagittatis conniuens, segmentis cordato oblongis; corolla monopetala campanulata, extus violacea, intus alba, quinque tamen maculis coerulescentibus insignita; filamenta quinque inferius crassa introrsum flexa et pilosa, corolla breviora; antherae erectae acuminatae bilamellatae; stylus longitudine staminum, stigmate capitato; fructus globosus et siccus quadrilocularis, tenui et fragili cortice tectus, irregulariter dehiscens, semina numerosissima plana compressa, thalamo scabro adhaerentia. His expositis fructificationis partes describit Auctor et accurate exponit, quo pateat, cuinam generi ista planta vere accensenda sit. Cum vero Cel. LINNAEUS plantam hanc Atropae seu Belladonnae adiunxit, vel eam inter Atropam et Physalidem mediam esse, dixerit, Noster ea propter rationem, cur ab Alkekengi eam separauerit LINNAEUS, disquirat, postmodum plantae huius partes cum partibus Alkekengi TOURN. comparat, eandemque demum, quoniam calyce, flore et fructu quam proxime cum Alkekengi conuenit, antiquo ideo istius plantae generi adnumerandam et *Alkekengi calyce profunde diviso, fructu sicco* istam nominandam esse, arbitratur. Tab. 4. plantam delineatam sistit.

P. 330. 2) *Thlaspi siliculis ellipticis foliis lanceolato linearibus integerrimis*, Auctore eodem. Enumeratis variis

riis auctoribus, qui plantam hanc descripserunt, eandem postea Cl. Auctor describit, notasque eiusdem characteristicas exhibet, quibus demonstratur, laudatam plantam, ab omnibus auctoribus ad *Thlaspi* genus relatum, vere etiam ad hocce genus pertinere. Cum itaque ratione generis dubium nullum super sit, maior vero ambiguitas apud scriptores in coordinandis suis speciebus reperiatur, Noster ea propter omnes, vel saltem plurimas species praesentes, quo varietatum accidentales characteres simul patefiant, disquirendas, interea specificum Cl. LINNAEI nomen in hac specie retinendum, siquae alia occurrat species, cum praesente eam conferendam omnesque in utrisque speciebus euidentibus et certas differentias notandas esse, suadet. Tab. 5. planta repraesentatur.

3) *Animalium quorundam quadrupedum descriptio*, P. 338.
Auctore Cl. IO. GEORG. GMELIN. Primum animal *musiela Zibellina* est: forma istud et habitu corporis martem, dentibus mustelam refert. Inferior maxilla dentibus satis longis paululumque incuruis, superior vero dentibus minutissimis donatur. Rictus latera fetis longis obsita apparent. Pedes lati sunt, singulique eorum in quinque digitos, unguliculis albescentibus parum aduncis munitos, diuiduntur. Color in alio, ex Beresowiensibus terris, ex cinereo nigricans, in mento cinereus, circa auriculas lutescens fuit: in alio, ex Tomskiensibus, color ex luteo fuscus, in mento et auriculis aliquantum pallidior fuit. Admodum agilia sunt haec animalia; per noctis plurimam partem inquieta, die saepius, imprimis postpastum, dormiunt, adeo tunc somno sepulti, ut pungi, ex loco in locum proici et quocunque modo tractari possint. Carnibus cuiusvis generis vescuntur. Excrementa pessime olent. Appro-

propinquante vere color pilorum mutatur aliusque inducitur. Tab. 6 animalis iconem exhibet.

P. 339. Alterum animal *vacca grunniens, villosa, cauda equina*, dicitur. Corpus vaccinum cornuaque introrsum torta habet. Totum corpus nigrum est, frons tamen et spina dorsi alba sunt. Collum iubatum totumque corpus, vt hircus, villosum; cauda equina alba, pedes bouini, anteriores nigri, posteriores albi sunt. Non mugit animal, sed suis instar grunnit, quod facit, si vacca domestica, quam aegre fert, in conspectum venit. Animal ferum est. Tab. 7 istud delineatum sistit.

P. 343. Tertium animal, *ouis laticauda* nuncupatur. Duo sunt huius animalis genera; alterum cauda lata longa, alterum cauda lata breui; vltimum hic describitur. Habitu ouem vulgarem refert. Cauda plus $\frac{1}{4}$ pede longa, vnum pedem lata, quadrata fere in duo hemisphaeria, per lineam diuisa ex mera pinguedine constat. Tab. 8. icon huius ouis conspicitur.

P. 344. Quartum animal *sciurus minor virgatus* dicitur. Habitu corporis et cauda sciurum refert. In vtraque maxilla duo dentes praelongi cernuntur, quorum superiores clauso ore super inferiores prominent. Color in toto fere corpore lutescens est. Cauda quinque fere pollices longa, albos, nigros et flavescents pilos habet. Pedes anteriores quatuor, posteriores quinque digitis instructi sunt. Animal per vniuersam Sibiriam occurrit, tab. 9 repraesentatur.

P. 345. Quintum animal *ibex imberbis* audit. Capite ouem, reliquo corporis habitu ceruum refert. Animal ab extremo capite ad pedem extremum tres pedes altum et ab extremo capite ad initium caudae totidem longum est. Aures latiusculae erectae sunt. Mas cornua gerit, foemina, quae minor, nulla. Cauda tenuis, tres pollices longa, color supinae

pinae partis e fusco lutescens. pronae albus est. Cursus eius velocissimus est. Inter cutem et panniculum carnosum in viuis etiam vermes latent $\frac{1}{2}$ pollicem longi, crassi et albi. Caro incolis in escam cedit. Coeunt ista animalia lupulo maturescente, vere parturiunt foetumque vnum vel alterum edunt. Graminibus pascuntur. Autumno pinguescunt. Aestatis tempore ad *Irtisch* fluvium copiose morantur, hyeme montosa loca petunt.

Sextum, animal *caprea campestris gutturosa cornibus nec ramosis nec deciduis* vocatur. p.347. Hocce animal idem esse, Noster dicit, quod PLINIUS sub nomine caprae descripsit. A summo capite ad terram usque tres pedes et vnum pollicem, a supremo dorso ad extremum posteriorum pedum duos pedes et quatuor pollices cum dimidio altum est. Masculus tantum cornua gerit, erecta, ex parte rugosa, ex parte laevis, quibus se a foemina, nulla cornua gerente, distinguit, aequae ac gutture, quod in masculo insigni protuberantia, quinque pollices longa tresve lata, se manifestat. Causam protuberantiae larynx sistit. Caro huius animalis incolis victum, pellis amictum largitur. Cornua apud Sinas magni aestimantur. In omnibus campis Transbai-Kalensibus vastis et apertis occurrit. Tab. 9 ipsum animal et tab. 10 laryngem delineatum sistit.

Septimum animal *cuniculus pumilio saliens*, cauda p.351. longissima dicitur. Animalculum hoc, quod, ut Noster asserit, cum nullo cognitorum animalium quoad notas genericas comparari potest, in campis Tschikoienfibus, Argunensibus et Ononensibus occurrit. Cuniculo minus est et corpus brevius habet. Auriculis leporem, rostro talpam, longitudine caudae murem et more, cuniculos fodiendi, cuniculum refert. Maxilla superior inferiore multum longior et

et obtusa, labiumque superius hiulcum est. Corpus antèrius tenue, posterius amplissimum in caudam longissimam, vix digitum minorem crassam, definit. In cruribus anterioribus breuissimi digiti quinque, in posterioribus longissimis quatuor tantum digiti, omnes tamen unguiculis albentibus vix incuruatis muniti in conspectum veniunt. Pili animalculi molles satisque longi sunt. Supina corporis pedumque externa pars colore lutescente, cinereo permixto, prona vero pedumque interna pars candido colore praedita est. Cauda primo lutescens, post candida, in apice nigerrima est. Longitudo animalis ab extremo rostro ad initium caudae sex pollices, caudae vero octo pollices cum dimidio aequat. Velocissimum est animal, seque ad incensum accingens corpus eleuando, in altum salit, vnoque saltu dimidiam orgyā absoluit. Cuniculos mira agilitate fodit. In futuram hyemem foenum secatur, idque in acervos cogit, beneque siccatum in cuniculos suos gestat. Quod ad internas partes attinet, animalculum hoc, praeter oesophagi in medium ventriculum insertionem nihil cum lepore, nec cum talpa, nec cum mure nec demum cum cuniculo commune habet, ideoque animal anomalum plane esse, Noster monet. Tab. 11 fig. 1. animalculum repraesentatur.

P.357. Octauum animal *cuniculus insigniter caudatus*, coloris leporini, vocatur. Hic cuniculum vulgarem magnitudine paululum superat, caeterum multa cum vulgari communia habet, praeter id, quod cauda notabilior longior sit. Tab. 11 fig. 2, animalculum delineatum est.

P.358. Nonum denique animal *isatis* audit. Hoc, cuius locus natalis ad littus maris glacialis et ad omnes fluuios amnesque, in istud se exonerantes, esse solet, cum vulpe vulgari quidem conuenit, specie tamen

tamen differt. Prolixitate enim et longitudine caudae, magnitudine corporis et reliquo habitu vulpi, facie vero cani magis simile, pilisque mollioribus quam in vulpe, plerumque candidis interdum et cinereis donatum est. Longitudo animalis ab extremo rostro ad initium caudae pollices $22\frac{1}{8}$, caudae vero $12\frac{7}{8}$ aequat. In pedibus anterioribus digiti quatuor antrorsum, quintusque retrorsum, in interna pedis parte, in posterioribus vero quatuor tantum digiti, singuli tamen unguitibus leuiter aduncis, robustis, albentibus, radicem versus nigricantibus instructi conspiciuntur. Mense martio animalia haec coeunt, coituque celebrato, ut canibus accidit, disiungi ab invicem nequeunt. Oestro absoluto cuniculos petunt, quorum extensio secundum glebam congelatam est. Quilibet cuniculus multis exitibus, in vnum tamen centrum, cubile animalis, desinentibus instructus est; hunc a sordibus purgant et collapsum reparant, inque cubili muscum sibi pro molliori cubitu sternunt. Foetus edunt in ipso cuniculo sex, septem, octo, ad viginti quinque vsque. Foetus isatidis albae, quando prodeunt, colore e luteo in rufum aliquantum inclinante, cinerea vero nigricante gaudent. Mure quodam campestri viuit neque tamen anseres anatesue aestate negligit. Hostes ob calliditatem paucos habet, interim e quadrupedibus gulo, e volucris aluco maior ei insidiantur. Raro integrum annum in eodem loco degit, idque forte ob victus rationem, interim regionem, quam deseruit, post tres quatuorue annos repetit.

In Tomo VI reperiuntur,

Observationes botanicae et una iridis multiplicis. p 405.

Auctore Cl. GEOR. BERN. BULFINGER. Prima
observatione fructus proliferi et frondosi commemo-
Tom. X Pars IV. T t ran-

rantur. Describitur nimirum citrei fructus, ex quo eo in loco, ubi stili adhuc vestigium conspicuum fuit, eminuit tantillum paruuli cuiusdam fructus, qui altius in medullam matris penetrauit, forma fructus citrei, eodemque etiam colore insignitus. Positus iste fuit in carne alba maioris, eumque circum circa loculi fere rotundi, figura stelliformi insigniti, sed seminibus vacui, ambierunt. Hi loculi, numero nouem, non cohaeserunt inuicem nec in axi citrei pomi dispositi fuerunt.

p.408. Deinde pira describuntur et prolifera et simul mire frondosa. Quatuor huius rei exempla hic annotantur: vnum Noster Stutgardiae vidit, reliqua tria fuerunt in horto quodam Montisbeligardensi. Ex his tertium tantum pirum Montisbeligardense, vtpote speciosius commemoramus. Hoc ex pedunculo paulatim in fructum, ampullae inuersae similem, elongatum fuit, e cuius summitate tres simul emerferunt foetus, vnus breuissimus piriformis, alter longior, figura matri similis, tertius cylindricus. Foetus hos folia viridia, lanceolata inter ipsos et matrem enata cinxerunt. Vni foliorum foliolum rosae colore et petali structura tenera adpositum, inter tertium vero et secundum foetum folium lanceolatum enatum fuit. Tandem tertius foetus ex posteriori parte non procul ab extremitate foetum, matri nepotem, fudit piriformem, auunculo vix maiorem. Intra nepotem hunc et matrem folium emerfit viride lanceolatum.

p.414. Observatione secunda describitur *malus sativa, fructu striato, punctis rubentibus consperso* TOURN. I. R. H. 635. Bach Aepfel, I. B. Hist. font. Boll. L. IV. Cap. II. pag. 91. *Malum striatum balnei adm. perelegans* Ei. Hist. I. 15. *cum fructu florifero*. E superiori huius pomi parte, et quidem e medio fere calycis, gemma eminuit, frondi a latere adhaerens,
a qua

a qua ramulus resectus fuit, vestigio calloso. Ex gemma duo mali folia prodierunt petiolata et praeterea quinque pedunculi, duabus vncis longiores et in eorum fastigio totidem flores perfectissimi, consueto petalorum, staminum et pistillorum apparatu numeroque instructi, floridissimi. Dissectione instituta interiora pomi sequenti ratione constituta Noster deprehendit. Frons tantum non in mediam usque pomi partem penetrauit et per vnum thalami loculum, semen vnicum effoetum condensum, transiit, ibidemque multis in eius substantiam circumcirca immixtis radiculis sedem fixit, circa frondem vero secundum totam longitudinem, quoad in pomi carne delituit, aliqua cavitatis exstitit, quae et hinc ulterius fronde vacua sub angulo, ad pedunculum, siue productionem eius in carnem, acuto penetrauit et acuto sine terminata est. Fructus hic, inter alios multos eiusdem generis in cella super stramine repositus, Cl. Auctori Stutgardiae oblatu-
tus est.

Tertia observatio *florem rosae proliferum et frondosum* commemorat. Hic tantum notamus, ramo rosae, primo spinoso, postea aliqua ex parte spinis orbo, ea in parte, vbi nudus fuit, rosea petala et folia affixa fuisse, hinc rursus spinosum post breue intervallum folia permulta fuisse. Flos iste aequae ac fructus illi proliferi tab. 12. delineati sunt. p.417.

Observatione quarta *iridis multiplicis* Noster meminit, quam vario tempore observavit. Anno nimirum 1741 iridem quintuplicem, secundariam nimirum et primariam et intra hanc tres zonas rubras, anno deinde 1746 iridem secundariam modo ordinario, primariam vero triplicem et alicubi quadruplicem, annoque 1741 iridem primariam triplicatam observavit. Verum observatas has zonas coloratas non tam irides fuisse, ex maiori reflexio-
num

num numero factas, quam orta ex diuersis bullis, quae ellipticam fortasse figuram tenerent, siue ex alia causa diuersam refractionem producerent, ideoque pro coronarum aut halorum portionibus habendas esse, arbitratur.

X.

Observations on a series of Electrical Experiments. By Dr. HOADLY, and Mr. WILSON, Fellows of the Royal Society. The second Edition. With Alterations and the Addition of some Experiments, Letters and explanatory Notes. By B. WILSON. London: printed for T. Payne, MDCCLIX. 4. pl. II.

h. e.

HOADLY M. D. et B. WILSONI Reg. Soc. Sc. Sodalium, Observationes in seriem experimentorum electricorum. Editio secunda, emendata, et adiectis experimentis, epistolis ac notis aucta a Beni. WILSONO. Londini.

Quo abstrusiores sunt phaenomenorum electricorum rationes, eo maiori cum voluptate scientiae naturalis amatores perlegent hoc opusculum, in quo ex paucis, iisque satis probabilibus, hypothesibus, vna cum quibusdam corporum proprietatibus, per experientiam cognitis, rationes probabiles singularium et maxime admirabilium experimentorum electricorum explicantur, et simul, causam electricitatis fluidum illud esse, quod NEWTONUS aethere dixit, verisimile redditur.

Hypo-

Hypotheses sunt, causam phaenomenorum **P. 3.**
electricorum esse fluidum elasticum tellurem, et po-
ros omnium in ea corporum libere permeans; hu-
ius fluidi, vndiquaque circumfusi, certam quantita-
tem inesse in singulis corporibus naturaliter, et cum
corpus quoddam electricum nobis appareat, quan-
tatem illam vel auctam esse, vel diminutam.

Proprietates corporum, quas tanquam per ex- **p.4. 5.**
perimenta certas assumunt Auctores, ceterisque
phaenomenis explicandis praestruunt, hae sunt:
Omne corpus resistere vi, quae ipsum electricum
reddere, vel electricitate priuare conetur; in aliis
corporibus hunc renisum maiorem, in aliis mino-
rem esse; maximum esse in vitro, sulphure, resi-
nosis corporibus, modo satis crassa sint, item in pi-
lis, et filis bombycinis, satis siccis, paullo mino-
rem in aere puro seu sicco, minimum in aqua, hy-
drargyro, metallis et mineralibus, animalibus et
plantis, ipsaque telluris superficie, hac tamen diffe-
rentia, vt haec postremo dicta corpora magis resi-
stant, si superficies habeant multum extensas, et
valde politas, ipsisque vis, per quam electrica red-
denda sint, in medio applicetur, minus autem, si
superficies ipsorum sint parum extensae, asperiores,
in cuspides terminatae, et vis ad has cuspides ap-
plicetur; fluidum electricum in vnoquoque corpore
non vltra certum limitem augeri, neque diminui
posse; denique nullum corpus, cui semel electrici-
tas impertita sit, sponte redire ad statum sibi natu-
ralem, sed in hunc statum vt redigatur, opus esse
aliqua vi extrinsecus applicata.

Ex his principiis primo colligunt Cl. Auctores, **p. 6.**
quid agendum, et quomodo figuranda et disponenda
sit virga ferrea, vt vel facile acquirat electricitatem,
eamque diu retineat, vel electricitate semel acqui-
sita facili priuetur. Quae sic ratiocinando colligunt,

optime cum experimentis conspirare monent. Neque id adeo mirum est. Nam illa principia, ex quibus ratiocinati sunt, potissimum ex his ipsis experimentis ducta fuerant. Sed hoc specimine ratiocinatorum gustum tantum aliquem suae methodi praebere voluisse videntur.

- p. 10. Pergunt ad explicanda ex iisdem principiis phaenomena, quae occurrunt, vbi virga ferrea vel *positiue* electrica redditur, h. e. plus fluidi electrici recipere cogitur, quam in statu naturali habet, vel *negatiue* electricatur, h. e. aliqua eius quantitate
- p. 16. priuatur. Quod dum agunt, euincunt, circa quodvis corpus, vtravis electricitate impertitum, formari atmosphaeram, ex electrico fluido constantem, quae sese expandere, et in aliud obiectum corpus, quod minus, quam aer, resistat, transire nitatur. Ex consideratione actionis eiusmodi atmosphaerae
- p. 19. ostendunt rationem, cur duo corpora leuia, eodem genere electricitatis praedita, se inuicem in vicinia repellant, et contra se mutuo in vicinia attrahant, si alterum *negatiue*, alterum *positiue* electricum sit. Porro inde colligunt signum, per quod certo co-
- p. 23. gnoscere licet, vtrum corpus quoddam *positiue*, an *negatiue* electricum sit. Nimirum duae sphaerulae ex subere extremitatibus fili alligandae, et ope tubi vitrei ex corpore proposito suspendendae sunt; quo facto hae sphaerulae se mutuo repellent: sed nunc tubus vitreus frictus, seu electricatus, his sphaerulis admotus indicabit, eas, et ergo ipsum corpori propositum, *negatiuam* electricitatem habere, si adhuc magis quidem se mutuo repellant, sed mox ad se inuicem accedant, contra autem *positiue* fuisse electricatas, si minus quidem se inuicem repellant, seu ad se mutuo accedant, simulac tubus adiouetur, sed mox fortius altera alteram propellat tubo remoto.

Ex

Ex hoc experimento deducunt hoc paradoxon: p. 24.
 si tubus vitreus frictus ad corpus quoddam admo-
 veatur paullatim, primo in certa distantia tubi ele-
 ctrificari illud corpus, deinde propius accedente
 tubo, electricitatem corporis destrui, denique ad-
 huc propius admoto tubo, illud iterum electri-
 cum reddi. Vtuntur etiam sphaerulis illis, ex
 subere factis, ad demonstrandum, vim tubi vitrei p. 25.
 electrici, seu machinae electricae, esse limitatam,
 i. e. corpori cuidam ab eo tubo, eaque machina,
 non nisi determinatum gradum electricitatis in de-
 terminata distantia communicari posse.

Hinc porro explicant phaenomena in noto illo p. 26.
 experimento obuia, in quo in interiori cauitate tubi
 vitrei, ex qua aer est exhaustus, flumen lucis ap-
 paret, si alterum eius extremum, cupreo manubrio
 insertum, manu tenetur, alterum, hermetice sigil-
 latum, ad tubum vitreum electricum, vel machi- p. 32.
 nam electricam, admouetur. Ex quo experimento
 simul euincunt, fluidum electricum non posse per
 totam massam vitri ab vna superficie eius ad oppo-
 sitam penetrare.

Progrediuntur ad explicationem experimenti
Lugdunensis, inter omnia experimenta electrica ce-
 lebratissimi. In qua dum occupantur, docent pri-
 mo, quomodo vitrum sine frictione electricum reddi p. 35.
 possit per communicationem; deinde ostendunt, in p. 39.
 hoc experimento semper tantum fluidi electrici ex p. 48.
 vna vitri superficie expelli, quantum in alteram,
 oppositam illi, ingrediatur; et quomodo hoc fieri
 possit, licet vitri massam totam hoc fluidum perua-
 dere nequeat, ex ratione renisus vtriusque super- p. 44.
 ficiei, subtiliter explicant, simulque demonstrant,
 in hoc experimento alteram vitri superficiem nega-

- tiue, alteram positue electricam esse. Denique ad
 p. 46. illustrandam magisque confirmandam explicationem
 huius experimenti, instituunt comparationem inter
 hoc experimentum, illudque paullo ante memora-
 tum, quod in tubo aeris vacuo capitur, quae duo
 experimenta sibi inuicem prorsus similia ostendun-
 P. 49. tur; nonnulla etiam experimenta addunt, quae ex-
 plicationi experimenti Lugdunensis, ab ipsis exhibi-
 tae, lucem ac robur praebent. Interim, quod nobis
 non est dissimulandum, difficultatem aliquam, eam-
 que haud exiguam, in sua huius experimenti expli-
 catione reliquerunt Cl. Auctores, hanc nempe: quod,
 si vera ea sit, in vna parte massae vitreae, sic electri-
 ficatae, lateat fluidum electricum condensatum, et
 in reliqua parte, proxime adiacente, fluidum ele-
 ctricum rarefactum; quae duae portiones fluidi ele-
 ctrici quomodo in hoc statu, cum fluidum illud ela-
 sticum esse sumatur, tam diu iuxta se inuicem per-
 manere queant, admodum difficile explicatu esse
 videtur.

- Cum experientia duce sumfissent Auctores omne
 corpus electrificationi resistere: restabant soluendae
 hae quaestiones, vbi renisus ille exerceatur, et vnde
 vis illa resistendi proueniat. Quas quaestiones nunc
 attingunt. Et ad primam quidem respondent, re-
 P. 54. nisum illum exerceri in superficie corporis, vel po-
 tius proxime ante eam, vbi etiam radii luminis re-
 p. 58. flectuntur; ad secundam vero, vim illam, qua cor-
 pus augmento vel diminutioni fluidi sui electrici re-
 sistat, elasticitatem esse atmosphaerae, e fluido ela-
 stico eodem, quod et electricum vocamus, et cui
 etiam nonnunquam particulae subtilissimae materiae
 propriae corporis admistae sint, circa vnum quodque
 corpus formatae, siue illud electricum sit, siue
 minus.

His

His quaestionibus enodatis, singulari experimento docent, fluidum electricum, ex vno corpore in aliud transgessurum, non breuissimam ire viam, sed eam, qua paucissimae superficies ipsi traiciendae sunt. Quo ipso bene monent, multum confirmari, quod supra dictum est, vim, qua corpus fluidi electrici ingressui vel egressui resistit, proxime superficies eius exerceri. p. 62.

Tandem rationem, cur leuia corpuscula a tubo electrico attrahantur, et repellantur per vices, reddunt ex praedictis atmosphaeris. Quia enim, inquit, atmosphaera, circa tubum formata, proxime eius superficiem rarissima est, et inde gradatim densior fit, donec in ea distantia, ad quam virtus tubi electrica extenditur, densitatem fluido electrico naturalem recuperet: necesse est vt corpusculum quoddam, in hac atmosphaera positum, e parte eius densiori in rariorem emergat, et sic a tubo attrahi videatur. Et quoniam interea circa ipsum hoc corpusculum atmosphaera electrica formatur, ex hac intelligitur, cur ipsum mox repellatur, eodem modo, quo duarum sphaerularum ex subere electricarum mutuus repulsus explicatus est. Dissipata deinde hac corpusculi atmosphaera per contactum corporis non electrici, ipsum illud corpusculum denuo a tubo attractum iri, vt antea patet. p. 66.

Sic explicatis maxime notabilibus phaenomenis electricitatis. concludunt, fluidum electricum non esse diuersum ab eo, quod NEWTONVS aetherem dixit, et quod ex eius mente est fluidum subtilissimum, maxime elasticum, per omne vniuersi spatium diffusum, omnia corpora penetrans, et in corporibus crassis multo minorem densitatem, quam in spatio reliquo habens. Ignem haud commode vocari hoc fluidum arbitrantur, propterea quod ignis non sit substantia, sed se habeat ad aetherem, p. 67.

particulis corporum inflammabilium mistum, ut sonus ad aerem.

Cum primum ederetur hoc opusculum, Cl. WILSONUS pleraque argumenta HOADLYO suppeditauerat, qui illa in ordinem redacta stilo suo proposuerat. In hac altera editione, post obitum HOADLYI facta, WILSONUS aliquot libri loca emendauit, et rationes emendationum in notis textui subiectis indicauit, nonnulla etiam noua addidit, nempe epistolam ad HOADLYUM datam d. 30 Novemb. 1755, in qua exponit, quomodo in rationes phaenomenorum electricorum inquisiuerit, et ad hoc systema, modo expositum, meditando atque experiundo peruenerit, et partes duarum epistolarum ad V. Cl. FLICOT et SMEATON, iam anno 1746 scriptarum, in quibus affirmat, effluuia electrica globi e manu, vel puluillo, cui affricatur, non autem e vitro, prodire, et accumulationem fluidi electrici in lagena *Lugdunensi* proportionalem semper esse tenuitati vitri, superficiei eiusdem, et superficiei corporis non electrici, quo vtraque lagenae superficies tegitur.

XI.

HERMANNI BOERHAAVE, Philosoph. et Med. Doct. Institut. Colleg. Pract. Botan. et Chem. in Academia Lugd. Bat. Profess. Colleg. Chirurg. in eadem vrbe Praesid. Societ. Reg. Scientiarum. Londin. et Academ. Reg. Scientiar. Parisiens. Membr. Praelectiones academicae de morbis neruorum; quas ex auditorum manuscriptis collectas edi curauit IACOBUS VAN EMS, Medicus Leidenfis. Tom. I. Lugduni Batauorum, apud Petr. van der Eyk
et

et Cornel. de Pecker, 1761. 8. 1 Alph. 1½ pl.
Tom. II. ib. eod. 1 Alph. 12¼ pl.

Quum vix non omnia olim a tanto viro, qualis fuit HERMANNUS BOERHAAVE, scripta, vel modo dicta, summam doctorum virorum attentionem atque applausum excitauerint meruerintque, iam diu quoque praestantissimum eius opus de morbis neruorum, quod manu scriptum in non nullorum manibus versari notum erat, quam auidissime haectenus expectatum fuit. Ab Ill. in primis KRUSE, Medico Petropolitano Clarissimo, in cuius quippe manus cuncta ab immortali viro relictæ opera et inter ea etiam hoc, vti iam ante aliquot annos percipimus, de neruis, peruenisse constat, eo magis vel hoc quoque posthumum opus editum iri sperabant omnes, quo magis illa spes edendorum omnium illorum operum ipsius Viri Cl. auctoritate publice data fide confirmata fuerat *). Interim, quum aliorum laborum multitudine adhuc dum, quo minus datam fidem solueret, impeditus ille fuerit, orbem eruditum sibi obstrictum reddidit Cl. VAN EMS, de praesentis operis editione absque dubio egregie promeritus. Is enim ipse ante triginta annos et quod excurrit, Boerhaauianis interfuit praelectionibus academicis, tumque temporis, quae praeceptor de neruorum morbis proposuerat auditoribus, calamo excepit. Accidit deinde, vt aliud exemplum, IACOBI HOVII, medici nunc Amstelodamensis, viri doctissimi, manu conscriptum, tandemque tertium, ex iisdem praelectionibus in suos vsus a perillustri GERARDI VAN SWIETEN contractum, acciperet, ex quibus exemplis tribus hunc, quem indicamus, librum ita *Noster* composuit,

*) conf. Comment. nostr. Vol. IX. P. I. p. 171.

fuit, vt, quantum fieri potuit, retentis b. auctoris verbis, doctrinam ipsius de hoc argumento omni fide et, quod cuilibet legenti facile clarum erit, multo studio subactoque iudicio in ordinem redigeret conficeretque, additis aliorum auctorum locis, a praeceptore olim citatis, quae insigni diligentia ex illorum operibus collegit atque examinavit. Vt lectorum insuper commodo magis magisque consuleret, summa non solum rerum capita ad singulorum paginarum margines indicemque illarum vberissimum riteque contextum sub finem libri adiecit, sed toti quoque operi conspectum ipsius praefixit, quem ita exaratum deprehendimus, vt, quem meliorem breuioremque lectoribus nostris tradere possemus, vix ac ne vix quidem intelligamus. Quam ob rem tum a Cl. Editore, cum ab ipsis nostris lectoribus veniam facile nos impetraturos esse confidimus, si praeter morem, a nobis huc vsque receptum illum hic loci iisdem verbis repetamus, quo vno quasi intuitu appareat, quam vastum et subtiliter disputatae, et solide atque utiliter expositae, doctrinae campum in hoc opere emensus fuerit b.

BOERHAAVE.

Totum hoc opus diuisum est in duas partes, quarum prima agit de morbis, qui proprie dictis neruis, eorumque membranis accidunt; altera de illis affectibus, qui totum systema encephali, ex quo nerui oriuntur, et a cuius bona constitutione humanitas dependet, turbant, labefaciunt, destruunt.

p. 2. In ipso primae partis initio exhibetur etymologia et definitio nerui: deinde quid proprie neruus sit, et unde originem habeat, disquiritur, et quoniam nerui ex cranio egrediuntur, hinc in genere de cranio disseritur, quatenus sit propugnaculum encephali, quod neruis originem praebet, tam in embryonibus, quam in adultioribus; addunturque

non-

nonnulla de eius figura, quatenus ob neruorum causam talis esse debuit: et ob eandem rationem theca vertebrarum in genere consideratur.

Nerui non decurrunt nudi per corpus, sed vaginas, quibus defenduntur, mutuuntur ab encephalo: hinc membranae cerebri etiam describendae erant. Exterior earum est dura mater, cuius definitio datur; cohaesio, appendices et fabrica describuntur; et hac occasione nonnulla adduntur de fabrica membranarum in genere, vt ea, quae postea de membranis cerebri dicenda sunt, eo melius intelligi possent. p. 9.

Dura mater illud cum omnibus corporis membranis habet commune, quod gaudeat vasis arteriosis; easque accipit ex carotidibus et vertebralibus illaeque abeunt in venas; adduntur nonnulla, quae his vasis propriae sunt. Patet ergo, quod dura mater ratione vasorum pati possit varios morbos, qui falso neruis adscribuntur, nempe inflammationem, suppurationem, gangraenam, scirrhum, vulnera, contusiones, dolores a plethora; hinc proprie dictam cephalalgiam, separationem durae matris a cranio: et ab his causis potest fieri apoplexia: adduntur quaedam, ex quibus patet, morbos posse fieri in systemate vasorum durae matris, qui, licet neruis adscribantur, proprie tamen ad vasa pertinent. p. 15.

Dura mater habet etiam neruos sibi proprios, hinc potest esse sedes doloris ab eorum rosione et tensione. Maxime autem quaeritur, an veram conuulsionem pati queat: clari enim viri affirmarunt, duram matrem esse musculum, quorum sententia refutatur; licet tamen concedatur, in nonnullis durae matris locis adesse fibras, sed eae longe alii vsui inserviunt, et in sinibus maioribus imprimis necessariae sunt, vt nimiam eorum expansionem impendant. Sinus illi habent ampullas, vinctuoso humore, attritum p. 28.

p. 49.

- p. 55. tum prohibente, plenas, in quibus ergo varium tumorum genus obtinere potest; potest etiam in fibris eorundem sinuum nasci induratio, et hinc oriri morbi, nervis falso adscripti. Dura mater per varia foramina exit ex cranio et spina dorsi, nervis vaginam exteriorem largitura; ergo cum iis protenditur per totum corpus, iisque duritiem conciliat; deserit vero eos, ubi in viscera, vel motuum sensuumque organa ingrediuntur. Haec vero durae matris vagina gaudet arteriis, venis et nervis; ergo pati poterit morbos, vasis et nervis proprios, illaesa tamen pulpa interiori: potest hic itaque nasci omne tumorum genus, per quos comprimitur pulpa nervorum interior; vel humores, in vasis vaginae contenti, possunt fieri acres et sensim corrodere nervum, idemque poterit obtinere in gangliis.
- p. 66. Nerui etiam variis morbis obnoxii sunt ab acrimonia humorum, qui continentur in vasis vaginae, ut patet in scorbuto, lue venerea, arthritide, rheumatismo et odontalgia, quae omnia dein variis exemplis ex probatis auctoribus confirmantur. Encephalon ambitur variis distinctis membranis, quae liquore intermedio concrecere prohibentur, qui liquor praeternaturaliter potest augeri in cranio, in theca vertebrarum, in vaginis nervorum ipsis; unde compressa pulpa interiori functiones nervorum ipsae delentur; qui morbi, quo modo cognoscantur et curentur, docetur; et tales morbos reuera dari ex analogia illustratur.
- p. 87. Sequitur nunc consideratio secundae cerebri membranae, nempe arachnoidaeae, cuius traditur inventio, nexus, fabrica, dein morbosa constitutio, siccitas, concretio, quae per observationes confirmatur, nimia humiditas, pinguedo; unde morbi nascuntur in toto genere nervoso, illaesa tamen medulla.

Porro

Porro describitur tertia cerebri membrana, nem- p.91.
pe pia vel tenuis, et in ea notantur amplitudo, sin-
gularis constitutio, nexus; arteriae, quae mira ratione
propagantur, decurrunt supra medullam, insinuant se
corticem: docetur dein distinctius, quomodo se
habeat in cerebro; quam innumerabilia sint eius
vasa, ita, ut tota fere sit vasculosa; consideratur eius
superficies exterior, interior nexus per vasa arteriosa et
venosa, insinuatio in anfractus cerebri, applicatio ad
medullam, appendix constituens plexus choroideos.
Ut porro ostendatur, quomodo pia mater se habeat
in cerebello, traditur eius generalis descriptio; no-
tantur arteriae; et sic acquiritur idea piae matris,
cerebellum eiusque processus vermiformes inue-
stientis. Eadem ratione paucis tantum verbis agi-
tur de medulla spinali et pia matre ipsi propria.
Pia mater, morbosa facta, functiones nervorum etiam p.122.
laedit, quod nunc porro demonstratur: scilicet ar-
teriae eius possunt fieri nimis amplae, siue illa am-
plitudo communis sit toti corpori, vel huic parti
propria; vel nimis vel arctae, nimis rigidae; vel nimis
exiles.

Plethora in toto corpore nata, replet etiam vasa p.131.
piae matris, quae ergo comprimunt corticem, vel
medullam in cerebro potius quam cerebello; vtra-
que vero ratione functiones nervorum laedi possunt,
sed datur etiam plethora piae matri propria, in pri-
mis in obesibus, qui propterea variis nervorum morbis
sunt obnoxii; haec vero etiam oritur ab arteriis, in
aliis corporis locis impeditis; ab obstructis arteriis
coeliacis et mesentericis; ab impedito sanguinis ex
cerebri sinibus exitu; a compressis venis iugulari-
bus; a respiratione compressa; per nonnullos animi
affectus, et ab impeditis euacuationibus consuetis;
quae plethora, natiq[ue] inde morbi, quomodo co-
gnoscantur et curentur, ostenduntur.

Con-

p. 148. Consideratur nunc vitium plane contrarium, nempe defectus sanguinis rubri in vasis piaë matris, et hac occasione refutatur sententia illorum, qui putabant, hominem eo esse saniores, quo sanguis eius esset tenuior; etenim a tali sanguine fit lentor et leucophlegmatia hinc etiam hydrops inter membranas cerebri; et impotentia ad motum, cui autem malo inprimis obnoxia sunt corpora tenella et visce-

p. 158. rum debilitate laborantia. Quoniam vero tale corpus virginibus proprium est, hinc illae frequenter incidunt in peculiare morbi genus, quem chlorosin vocant. Hanc multi medici falso adscripserunt deficientibus mensibus, quum tamen reuera oriatur a defectu sanguinis rubri; quod eo clarius patet, quia virgines non tantum, sed et omnes alii, a nimis hæmorrhagiis in similem morbum incidunt: huius diagnosis et curatio traditur. Haec cura consistit procul dubio in restitutione sanguinis rubri, quae obtinebitur restitutione chylopoiesios per cibos siccos et concoctus faciles, potus generosos, sed non inebriantes, condimenta appetitum acuentia, medicamenta stomachica amara exterius et interius adhibita, simplicia magis, quam composita et purgantia blanda, bili aemula. Iisdem remediis restituitur hæmatopoiesis; nam ex chylo fit lac, ex lacte sanguis; hinc si chylus rite conficitur, tunc etiam restituitur sanguis. Huc vero maxime facit exercitatio corporis et ferri usus internus, quod, qua ratione exhiberi debeat, quaenam cautela in eius usu observandae, et quid post eius usum agendum sit, docetur. Iisdem etiam remediis restituitur pneumatopoiesis.

p. 188. Sanguis, in vasis piaë matris haerens, non tantum potest peccare quantitate, sed etiam acrimonia; hinc pertractata plethora et inanitione, iam etiam consideratur, quamnam noxam nervis pariat talis acri-

acrimonia. Quaeritur ergo primo, an acria huc vsque peruenire queant, et si vlla, affirmatur hoc inprimis de spiritibus stillatitiis fermentatis, quorum effectus in cerebrum recensentur; qua occasione agitur de ebrietate; curaque morborum, qui ab hac causa pendent, paucis traditur. Sed dantur etiam alii spiritus, siue effluuia ex quibusdam vegetabilibus exeuntia, quae etiam paucis memorantur et de horum et spirituum stillatitiorum effectibus nonnulla adduntur.

Quoniam nunc de spiritibus sermo est, disquiri- p.201.
tur, quid proprie per spiritum intelligi debeat, cuius proprietates recensentur et vbi inueniatur, dicitur. Primo nunc consideratur ille spiritus, qui in animalibus per solam vitam paratus, effluuiorum modo ex illorum corpore exit, recensentur eius varii effectus in varias corporis animalis partes, vis eius in latum se diffundens, vni tamen animalium generi tantum nocens, quae vis incredibili plane subtilitate pollet et tamen ita figi potest, vt per longum tempus effectus suos praestet; vis illa vario modo communicari potest, ita tamen, vt inprimis agat in nervos dissectos, hinc forte directe spiritus nervosos afficiat, quod ex modo communicationis demonstratur; et tandem quaedam adduntur, quae diagnosin, prognosin et curationem veneni recepti spectant. Sequuntur secundo illi spiritus, qui pro- p.223
ducuntur per putrefactionem, quae valde promouetur per calorem et corpora ita resoluit, vt fiant volatilia: morbi inde nati et methodus eos curandi recensentur. Agitur tertio de spiritibus ex animalibus exhalantibus et de eorum effectu in corpus, quod illos spiritus recipit. Ordo rerum nunc ducit ad spiritus, qui exeunt ex vegetantibus, per exhalationem, olfactus organa afficientem, vel per destillationem, vel per contusionem. Quaeritur, an

- vis medicata vegetabilium ab his spiritibus pendeat; summaque horum subtilitas demonstratur, quia nullo sensu dignosci, sed suis tantum effectibus manifestari possunt, illi spiritus in singulis vegetantibus
- p.243. singulares sunt. Pergitur nunc ad regnum fossile, quod etiam spiritus suppeditat, qui in nonnullis fo-
- p.247. dinis naturales sunt et singularibus effectibus se manifestant. Nonnulli etiam memorantur foetores, corpori humano valde perniciosi. Ignis etiam mirros et noxios extricat spiritus, qui inprimis lethales sunt ab igne suffocato, quod miris exemplis confirmatur. Hac occasione alii quidam noxii spiritus,
- p.257. per calorem extricati memorantur. Sequuntur nunc spiritus per miscelam parati, quorum exemplum habetur in vitriolo, qui etiam in nervos agunt.
- p.260. Pertractatis morbis, qui oriuntur a corporibus alienis, in nervos eorumque liquores agentibus, consideratur nunc nervus integer et examinantur morbi, qui toti eorum substantiae accidunt; hunc in finem paucis agitur de nervo in genere; dein de tendine, quoniam ille ex nervis oritur: nervi et tendines per solum senium exsiccantur, possunt pati inflammationem, per quam constituentes eorum partes inter se concresecunt, per suppurationem nudari suo inuolucro et ab externis iniuriis pessime affici: hac occasione nonnulla adduntur de futura tendinis.
- p.270. Quoniam vero nervi nudi per dentes decurrunt, hinc porro agitur de odontalgia, quae utplurimum oritur ab exesa vitrea dentis crusta, nervoque nudo aeri exposito, nec nisi illo nervo destructo curari potest, quod quibus modis fiat, docetur. Agitur etiam de aliis odontalgiis ab inflammatione gingivarum, ab earum colliquescentia per scorbutum, a perforatione alveolorum, quae species ex consideratione dentium amplius exponitur et medendi methodus traditur: haec odontalgia frequenter oritur ab acidis,

dis, dentem corrumpentibus et per eius euulsionem vel per antiseptica debet curari. Alia eius species fit per dentem molarem, antrum HIGHMORI perforantem: quia vero catarrhi in hoc malo frequenter accusantur, hinc nonnulla de iis adduntur.

Pergitur nunc ad paronychiam, quae etiam a p.287. neruo, circa phalanges digitorum denudato, ortum habet: describuntur huius mali symptomata, sedes: affectae partis fabrica exponitur: recensentur variae huius morbi species; prima ab accumulata articulorum mucilagine: altera ab inflammato ligamento, quod capsulam articulare constituit: tertia a male affecta membrana cellulosa in articulis: quarta a laeso periosteo in phalangibus digitorum: quinta a vitio tendinum, qui in prima phalange digitorum finem habent: sexta ab inflammata vagina, quae his tendinibus circumponitur. Hac occasione nonnulla notantur de scuto cartilagineo, sub quo illi tendines transeunt: septima denique a laeso harum cartilaginum perichondrio. Sequitur iam consideratio physiologica vnguium, dein eorum pathologia; inprimis exponitur, quam dolorifica mala ab ariditate epidermidis cum illis cohaerente et ab ipsa eorum arescentia sequi possint.

Porro explicatur callus, qui fit a degeneratione p.325. neruorum per eorum compressionem nata, et hac occasione agitur etiam de coecitate et surditate fenili, quae ab occallescentia neruorum opticorum et acousticorum producantur. Agitur dein de verrucis, quae sunt papillarum neruearum degenerascentium species: et diuersae earum sedes notantur. Porro tractantur clauis, cornubus animalium similes, suntque illi papillarum neruearum, ex cute assurgentium compressiones et indurationes. Tandem capitulum de papillis in superficie corporis degenerascentibus primum huius opusculi tomum claudit.

- p.343. Pars secunda agit de morbis, qui totum systema encephali afficiunt; et quoniam ab eo humanitas pendet, hinc post breuem praefationem agitur de mente humana, quae in genere describitur et ex ipsa eius consideratione deducitur cognitio adorabilis Dei, qui omnibus rebus mentique humanae primam
- p.354. dedit originem. Agitur dein de modo, quo mens humana ideas acquirit, ostenditurque hanc rem vix melius posse explicari, quam si ille modus compareretur cum ingressu luminis in oculum. Consideratur porro potestas mentis humanae quae apta est cogitare infinita, praeterita sibi sistit praesentia, adhibitis etiam quibusdam notis corporeis, vel sine illis, dum tamen in utroque casu perfecte eadem manet.
- p.365. Pergitur iam ad ratiocinium, ostenditurque, hanc actionem esse simplicissimam, et quasi momentaneam, moram vero eius successiuam pendere a notis, quibus nobis opus est; unde concluditur, esse in mente perfectionem latentem, qua per se cogitat. Sequitur alia mentis facultas, nempe voluntas, quae se extendit ad infinita habetque in se fundamentum virtutis et vitii: huius proprietates recensentur et nonnulla
- p.386. adduntur de summo bono. Considerantur porro animi affectus, qui in genere referuntur ad amorem et odium, quorum bonum vel malum regimen felicitatem hominis promouet vel turbat; recensentur horum diuersitates et ostenduntur varii effectus in corpus humanum, unde deducitur regimen mentis, quod medicorum est. Porro describitur imaginatio, quae facultas mentis homini inprimis propria est: recensentur miri eius effectus, notantur varii gradus et docetur eius regimen. Haec vero si nimis valida sit, oritur insania, quae porro describitur methodusque curandi traditur.

Pertractatis morbis, qui sedem habent in ipso sensorii communis loco, iam agitur de iis, qui sedem

dem habent in alio loco, vnde sensorium commune
 aequè afficiunt, ac si in eo ipso haerèrent. Inpri-
 mis hic accusari merentur praecordia, mesenterium,
 herniae aliaeque causae, quae in nervos abdomina-
 les agunt; nec minus hic peccant vterus et vesica:
 methodus curandi morbos, ab hac causa ortos, tra-
 ditur. Sensorium commune saepe etiam afficitur a p.432.
 sordibus, in primis viis haerentibus, quae saepe ma-
 lignam indolem habent: morbi inde nati describun-
 tur. Dein agitur de bile atra, in iisdem his locis p.447
 haerente, et morbos nervorum producente. Ve-
 nena varia in ventriculo haerentia, totum sensorium
 commune etiam turbant. Haec consideratio ducit
 ad explicandam nervorum ventriculi et primarum
 viarum actionem in sensorium commune, cuius rei
 illustre exemplum habetur in colica Pictorum, ad-
 duntur quaedam de noxis ab affectis nervis remo-
 tionibus et pauca alia, quae curationem horum affe-
 ctuum spectant. Sequitur capitulum, vbi ampliori
 sermone ostenditur, nervos, per totum corpus di-
 spersos, in proprio suo loco agitados, producere ca-
 pitis et generis nervosi morbos.

Haecenus sensorium commune consideratum est, p 468.
 quatenus est pars corporis solida, vel fluida, vel ex
 vtrisque composita; iam vero sequitur subtilior in-
 dagatio principii illius, quod HIPPOCRATES vo-
 cauit *impetum faciens*, a quo omnes motus originem
 ducunt, et in quod omnes sensus terminantur. Vt
 vero constitutio eius morbosa melius intelligatur, ac-
 curatius dein inquiritur ortus idearum, animi affe-
 ctuum, vnde iterum fiunt motus corporei, excre-
 tiones perturbatae, omniumque fere functionum
 mutatio. Recensentur porro miri effectus huius
 principii impetum facientis respectu motus corporei,
 quos tamen minime percipimus. Definitur nunc p.487.
 accuratius, quid sit sensorium commune, quod vt

agat requiruntur nerui, qui distincti sunt in ortu et fine: determinatur porro, cuinam corporis loco sensorium commune assignari queat, nempe ipsi nervorum origini, in qua nulla adest confusio, ita ut tam origo quam functio cuiuscunque nervi sit distinctissima, quae distinctio tam accurata est, ut homo respectu humanitatis reuera sit duplex. Obiici tamen posset, quod partes cerebri se mutuo decussent, hinc illa res accuratius inquiritur, nec tamen apodictice determinatur, quid statuendum sit.

p. 510. Sequitur caput de sympathia, in qua explicatur, quid nervi patiantur ab externa causa et qua ratione unus homo agat in alterum et patiatur ab altero: praemittuntur quaedam, quae hanc rem in genere spectant; docetur deinde, quomodo unus homo possit excitare affectus alterius; illustrantur haec exemplo ex arte musica desumpto; enarrantur miri potentiae nostrae effectus, quorum nescimus causam, modum et instrumenta, qui non semper pendent a nostra voluntate, sed quasi unico actu fiunt, diu durant, corpus nostrum mutant tam ad salutem, quam ad mortem, extendunt se in longinquum et ad alia corpora, nec domari possunt nisi per remedia, quae corpus humanum debilitant et ad mortem ducunt. Adduntur deinde alia de principio, hos effectus excitante, quod plane invisibile est, et tamen tantum habet imperium in corpus, ut ab eo, in animi affectibus exorbitante, omnis generis morbi excitentur, imo mors ipsa et quidem subitanea secuta fuerit.

Supereſt nunc diſquiſitio, quemnam effectum praestet imaginatio humana in alienum corpus, id est, agitur peculiari capitulo de vi imaginationis
p. 555. mulieris grauidae in proprium foetum: haec primo exemplis demonstratur, dein adducuntur variorum auctorum de causa huius euentus sententiae, quas tamen non admittendas esse demonstratur, concluditurque,

que causam huius phaenomeni esse incognitam et ad mirabilia referendam, quod in toto opere generationis etiam locum habet, vti etiam in aliis casibus, in quibus ignorantiam nostram fateri cogimur.

Absolutum iam esset pensum, nisi opportunum foret aliquot exemplis ostendere, qua ratione morbi, proprie cēphalici dicti, pertractari debeant: et quia vertigo horum est leuissimus, hinc primo eius p.576. historia traditur: dein sequitur caput de apoplexia, p.640. quae inter morbos cerebri est periculosissima: huius minores gradus sunt parapoplexia, paresis, lethargus, cataphora, carus, coma, paralyxis, de qua amplior sermo est. Tandem caput de epilepsia p.770. hisce praelectionibus de morbis neruorum imponit finem.

En ipsius libri conspectus. Vel nobis quoque non monentibus, quilibet facile, et id quidem recte, suspicabitur, licet vltimam manum huic ipsi perficiendo operi non adhibuerit b. Auctor, illud tamen ita exaratum esse, ne tanto viro sit indignum. Qui reliquos enim ab ipso editos libros perlegerit: quis autem medicorum erit, quin eos legerit relegeritque? haud difficulter et in hoc inueniet BOERHAAVI doctrinam, ingenium acre, cogitandi modum, licet acutum et subtilem, tamen facilem, ordinemque egregium, amplissimam lectionem, planamque et, quae suam quandam maturitatem habet, orationem. Quodsi quis etiam vel vnam alteramque sententiam de neruis ipsis, vel ob fabricae similitudinem dictis neruosis partibus, earumque virtutibus, aliisue potissimum physiologiae capitibus in recentiorum auctorum libris aliam inuenerit, is perpendat, naturae limites forte numquam attingi, ideoque eius cognitionem denuo institutis experimentis semper ampliorem reddi posse, sique tantus vir forte erraue-

rit, vti recte monet Cl. Editor, eum tamen non nisi gravissima ratione a recto tramite fuisse deflexum.

- Aliqua nunc adhuc pauca, quae cum lectoribus nostris communicamus, ex ipso libro eligamus.
- p. 11.** Membranae, si in genere de iis loqui velis, in duas classes videntur posse diuidi, quarum una est ad sensus nostros vasculosa, altera vero sensibus nostris nulla vasa exhibet, licet vel hoc quoque membranarum genus vasis non carere phaenomena multa doceant. Illius exemplum dat mesenterium aliaeque similes membranarum plures; huius autem chorion, amnion, aliaeque. Ad priorem classem pertinet etiam dura mater, quae, vti reliquae membranae vasculosae omnes, in duas lamellas separari potest, quae in sua duplicatura vasa conspicua continent. Illud igitur omne, quod nonnulli auctores fibras in ipsa occurrentes, musculosas esse putauerunt, vere vasculosum est.
- p. 48.** Musculosae enim fibrae in membrana illa deprehenduntur prorsus nullae, et quae huius generis apparere creduntur videnturque, nihil aliud sunt, quam ligamenta quaedam duram matrem cranio affigentia, illis potissimum in locis, vbi sanguis ex encephalo rediens effluit in sinus, qui vero, nisi adessent retinacula talia, multis omnino sub occasionibus, nimium expanderentur, neque sanguinem satis continerent. Convulsionem itaque veram pati numquam poterit dura mater, quum sine muscoli praesentia nullus dari queat spasmus.
- p. 34.** Separatio autem illius a cranio interdum obseruata, non a vi quadam musculari, sed ab humorum quadam facta effusione, iisque, nisi resorpti fuerint, a calore rarefactis et distentis, duram matrem eo usque a cranio separantibus, orta
- p. 67.** fuisse videtur. De arthritide et podagra hanc quoque legimus coniecturam, quod morbus iste duplicis generis esse videatur, vnum, sed rarius, in de-
- gene-

generatione spirituum animalium consistens, sine
 ullo calore aut tumore, quam maxime tamen dolo-
 rosum nervosque consumens; alterum, ipsos quidem
 etiam afficiens nervos, tamen in eorum integumentis
 haerens, tumoremque et inflammationem efficiens.
 Alterius tunicae cerebri inuentae laus ad quatuor p. 81.
 medicos Amstelodamenses, BLASIUM scilicet, SLA-
 DUM, KINAM, et SWAMMERDAMMUM, pertinet,
 quippe qui viri anno superioris seculi sexagesimo quin-
 to eum in finem abierant quandam in societatem,
 vt in qualibet hebdomade conuenirent eorumque
 vnusquisque quandam corporis partem examinaret.
 Nihilo tamen minus suum illa nomen, vti constat,
 a RUYSCHIO accepit. Praeter plethoram vniuer p. 135.
 salem, et cerebro quoque suo tempore nociuam, da-
 tur etiam eius aliquod genus particulare, soli capiti
 et in primis piaae matri proprium, cuius quidem
 variae, supra iam enarratae, caussae recensentur,
 quarum tamen prima dicitur obesitas. Quando
 enim oleum in contextu corporis celluloso sepositum
 abundat, tunc vasa, quia cutis vltiorem corporis
 expansionem coercet, nimis comprimuntur, angu-
 stantur, et sanguinis pars rubra in illis imminuitur.
 In capite autem pinguedo, si qua talis ibi, v. c.
 ex obseruatione RUYSCHII, sub tunica arachnoi-
 dea inueniatur, vix vnquam augeri deprehenditur,
 hinc in vasa piaae matris non compressa, maior san-
 guinis copia irruere, et vertiginem, vacillationem
 tandemque apoplexiam efficere potest. In verte-
 brarum autem theca, quae non adeo plena est, quam
 cranii cauitas, ros quidam semper adesse debet ad
 auertendam siccitatem; satis igitur copiosa ibi sae-
 pius deprehenditur pinguedo; qua de caussa non
 facilis a plethora ibi oriunda compressio debet me-
 tui; et hi quoque nerui ad inferiores partes delati
 hinc forte omnium vltimo afficiuntur. Quem ad p. 148.

modum vero ista mala a vasis piae matris sanguine nimium refertis oriuntur, sic etiam e contrario similia suam capere possunt originem ex defectu sanguinis rubri in vasis piae matris obuiio. Inde lentor et quies humorum, caloris naturalis omniumque functionum imminutio, tandemque reliqui morbi omnes intermedii a vertigine ad apoplexiam vsque. En diuersa morborum similium causa, diuersaque eos curandi ratio. Quare illos quoque medicos, qui sanguinem arteriosum, quo tenuior sit, eo meliorem esse putent, fusius hic loci refutauit **BOERHAAVIUS**. Deprehenditur iste in hominibus tenellis viscerumque imbecillitate laborantibus, vel alio et potissimum subitaneo modo, sanguine bono

p.158. exhaustis. Inter alios morbos eo etiam pertinet chlorosis dicta, quae saepius eo difficilius tollitur, quo frequentius aliis causis solet a non nullis attribui, deficienti in primis fluxui menstruo. Summo enim beneficio naturae menses non fluunt istis virginibus; haeque enim, si maius sanguinis rubri paterentur dispendium, peius omnino se haberent; uti obseruare licet in illis, quae ideo, licet imprudenti consilio, venam sibi secandam, vel alio modo menstrui sanguinis profluuium excitandum, curant.

p.163. Neque tollitur morbus, nisi pars aquosa sanguinis imminuta, rubra vero aucta fuerit. Quae igitur curandi methodus aequae satis fuisse, ac egregie tradita, legitur. Summa eius eo redit, ut bonus chylus idemque sanguis elaboretur, viresque corporis omnimodo confirmentur. Quod si hae autem adeo iam deficient, ut ne tantillum quidem supersit, quod laticis illius boni adiuuet praeparationem, nulla quoque locum habet curatio. Victus itaque studiose electus atque *ευπεπτος*; ex potuum genere in primis cereuisia generosa, recens, quippe quae ipso vino melior est, nec vetusta nimis neque mordax; vina austera, rubra,

rubra, annosiora, parce tamen hausta; remedia sic dicta stomachica externe et interne data, in primis amara, eaque per se potissimum, absque praeparatione chemica data, tandemque prae aliis commendandum remedium, ferrum scilicet, curam absolvent. Qua occasione candide, prout virum de- p.171.
cet vere honestum, fatetur b. Auctor primae suae aetatis errores, et remediorum volatiliū vsum quam maxime fugiendum nunc suadet. Pessima quoque sunt purgantia resinosa, quae corporis humores soluunt; eccoprotica vero, bilis locum sup-
plentia, vti rheum, aloe, myrrha, fel animalium voracissimorum, v. c. lucii prae reliquis conueniunt. Ferrum, quod in vsum vocatur, sit verum et sim- p.179.
plex crudum, haud in chalybem mutatum ideoque sulphure suo non priuatum, quum ferri effectus ipsius sulphuri in his morbis debeatur. Optimum istud etiam, quod humores nostros facillime intret, ferrum reperitur in acidulis, v. c. Spadanis. Quod-
si vero tales non ad manus sint, ferrum detur recens limatum et in tenuem pollinem redactum, ita tamen, vt antea examinetur aeger, num de acrimonia alcalina aut putrida queratur? Tum enim semper nocet: an de pituita, ventriculo inhaerente? Tum vsui eius praemitti debet lene aliquod emeticum. Detur ferri dosis, quae summa quindecim p.183.
grana continet, bis vel ter de die, ventriculo maxime vacuo, donec color cutis roseus redeat. Neque nocet continuatus eius vsus, quamdiu excrementa nigro colore tinguntur. Tum enim ferrum adhuc soluitur inque vitrioli speciem mutatur. Idem quoque valet de acidularum vsu. Numquam vero aegris dari debet ferrum, in quibus alcali deprehenditur in primis viis; vel vbi fomes aliquis putridus in aliqua corporis parte haeret; vel iis qui sanguine abundant; vel qui tumoribus scirrhis aut vlcere aliquo

- aliquo laborant, vel tandem qui melancholici et atrabilarij sanguinem amurcosum habent. Aegros autem, dicta iam ratione sanitati restitutos, moneat medicus, ne diætam siccam motumque corporis negligant: alias enim facilis in priorem morbum recidiva
- p.270. metuatur. Inter morbos, qui nervo nudo factò accidunt, refertur quoque atrox iste saepiusque pertinacissimus morbus, dentium dolor, cuius varia genera hic loci propius solitoque rectius exponendi occasionem b. Auctor noluit negligere. Primus eius itaque gradus in dente carioso hincque ipsius nervis denudatis et a quacunque fere causa externa
- p.274. facile affligendis, consistit. Huic odontalgiae generi similes videntur alii morbi chronici, vertebrarum, ossis sacri coxaeque. Ossium enim lamellis, inter quas decurrunt nervi, separatis, erosio fieri poterit, ut in dente. Quem ad modum igitur in dente tolli nequit iste dolor, nisi vel per euulsionem abrupto, vel alia ratione destructo, nervo; ita quoque in his partibus, nisi inurantur, nullus curationi
- p.275. locus datur. Alterum porrò odontalgiae genus ab inflammatione gingivarum, siue vasorum ex his ad dentium interiora propagatis, oritur; tertium adolescentulis potissimum ante septimum annum et ante secundam dentitionem obuium et a plurimis aliis auctoribus omissum, quando gingivae. per inflammationem a dentibus solutae, tabidae factae, in liquamen mucilaginosum et foetidissimum abeunt. Malo serpente, denudatur maxilla cariota et ex ea lamellae decidunt aequae ac dentes. Spirituum usus perniciosissimus; sed condiendae sunt hae partes contra rodentem acrimoniam aerisque corruptionem, v. c. cum sale marino vel ammoniaco, addito, si calor vrgeat, nitro, in aqua diluto cum pauxillo vini succique citri. Succus etiam semperviui maioris cum illorum salium pauca copia mixtus, vel
- plan.

plantaginis latifoliae recentia folia, in aqua pluuiali humectata, vt epidermis eorum possit detrahi; egregiam praestant opem. Quartum odontalgiae p.278. genus a perforatis alueolis oritur in dentibus tantum caninis vel molaribus obuium. Illi enim fiunt ex duabus lamellis a se remotis, intermedio osseo concremento, diaphragma vocat b, Auctor, ex vna lamella ad alteram tran-eunte et vtramque connectente. Hi autem alueoli laedi possunt duplici modo; vno per rudiores morsus, quando maxillae tanta vi ad se adducuntur, vt alueoli partes osseae satis resistere nequeant, sed atterantur, densque cedat vel extrorsum, vel introrsum; altero autem, quando, dentis crusta vitrea ablata, ossea eius substantia vitium capit, quod per radicem ad alueolum vsque delata, inflammationem aequae ac in priore casu, excitare poterit, diris subsequenter symptomatis, quibus olim aegrum vitam suam periisse narratur. Quinta tandem et vltima, quae exponi p.284. tur, odontalgia, in dentibus caninis superioribus obuenire solet, quando nimirum fortissimo nisu adducuntur maxillae ita, vt dentium istorum radices inflamm antri Highmoriani lamellam attingant, laedant, et inflammationem in ipsius periosteo efficiant. Hinc, quum superior antri illius lamina ad oculi orbitam pertineat, oculus simul laedi solet; vnde factum esse videtur, vt canini dentes a non nullis appellati fuerint ophthalmici. Den p.285. tium dolorem a causa catarrhosa, quae saepius accusatur, prouenire posse, *Nosser* prorsus negat, sed causam diri istius doloris semper topicam esse, confirmat. Inter causas, quae sedem suam in ipso sen- p.426. forio communi non habent, illud tamen eodem modo saepius afficere possunt, ac si in ipso haerent, referuntur quoque herniae, si fuerint strangulatae, quae interdum accelerare possunt mortem

abs.

absque praegressa inflammatione vel gangraena, nervis tantum solis male affici visis; cuius generis casum ante breue tempus obseruandi nosmet ipsi habuimus occasionem. Postquam abstrusissimam materiem valde subtiliter disputauerat *Noster* de principio illo, quod *impetum faciens* appellauerat HIPPOCRATES, recentiores autem sensorio communi seu

p. 492. illi loco cerebri assignant, in quo ortus est cuiusque fibrillae medullofae et neruosa ex fabrica corticali, quod facit ideas, affectus, motus spontaneos et ad quem mutationes neruorum delatae efficiunt sensum; atque postquam is immensam argumenti huius profunditatem, quae hominis vel acutissimi superat intelligentiam, fusa, ac vti solet, admodum acute docuerat, asserit

p. 555. etiam effectum imaginationis in alienum corpus, mulieris in primis grauidae in foetum, hancque veritatem per plures ab ipsomet obseruatas experientias confirmat, licet hanc rem forte vix vnumquam detectum et demonstratum iri ipsemet desperare videatur, si

p. 556. nolimus autem admittere, inquit Auctor vere sapiens, quae non intelligimus, vel quae assumtis nostris principiis non conueniunt, facile errabimus. Ex ignoratione autem nexus inter affectiones matris foetusque mutationes non peti posse fundamentum effectus illius negandi, per alia similia in omni doctrina physica, praeter omnibus autem in explicando vniuerso generationis negotio singulisque eius partibus occurrentia mirabilia euincit, quorum quippe effectus sensibus pateant, causae vero semper nobis maneant obscurae, vel prorsus non extricandae, sed eheu fati! si enim cuncta a b. Auctore bene explicata commemorare vellemus, integrum librum, quem certe neminem perlegisse vnumquam poenitebit, descripturi essemus.

XII.

A Practical Treatise on Fevers. By Dr. STEVENS.
London, printed for R. Baldwin. MDCCLX.
8 mai. Alph. I. pl. 10.

i. e.

Practicus liber de febribus. Auctore STEVENS,
Doctore.

Insignes a medicis gratias sine dubio expectabit Cl.
Auctor, quod vix non vniuersalis, inter illos, ex
eius opinione, huc vsque regnantis ignorantiae mi-
fertus hunc, quem indicamus, librum conscripserit
eoque simul omnes docere voluerit, quo modo
scientiam medicam addiscere eamque ad summum
certitudinis fastigium euehere, tumque tandem ae-
gris veram medelam afferre et nomen doctorum vi-
rorum mereri possint. Ante igitur, quam aliquis
medicinam facere queat, suadet illi *Noster*, quo le-
ges materiei et motus sibi cognitae reddere, humani
corporis fabricam inuestigare, tandemque modum
leges illas corpori humano applicandi discat intelli-
gere, et singularum eius partium actionem simul-
que causas, illum forsitan turbantes, perspiciat.
Ut illas autem materiei atque motus leges rite co-
gnoscat, ante omnia ad earum effectus attendere,
ideoque doctrinam de motu in genere siue mecha-
nicam, hydraulicam porro atque hydrostaticam,
chemiam deinde atque pharmaciam inquirere, tan-
demque obseruare debet morborum, corpus huma-
num affligentium, effectus atque auxilia, quibus
natura sibi sola relicta ad istos profligandos vtitur.
Quarum itaque obseruationum copia collecta illis-
que materiei et motus legibus nunc applicatis, fe-
lix,

lix. tutus neque errans euadet medicus. Quum vero ex auctoribus, in primis qui de febribus egerunt, ne vnus quidem hanc ingressus viam, Cl. Auctori satis fecerit, is illud ipse nunc in se suscepit munus, vt doctrinam de hoc morborum genere indubitatis fundamentis superstructam, traderet. Postquam igitur in singulari, quae praefamen libri sequitur, introductione de crassis istis doctrinam medicam adhucdum obtegentibus tenebris iterum conquestus fuit, lucem illam, quam se allaturum esse promittit, *tredecim capitibus* exponit, quorum *primum* generales leges materiei atque motus continet, *secundum* secretionem animalem, *tertium* et *quartum* solidarum atque fluidarum partium rationem, quae febres efficiat, generatim consideratam, *quintum* simplicem continuam inflammatoriam febrem, hanc vero acutam *sextum*, *septimum* intermittentes febres, *octauum* putridas, vt plurimum malignas dictas, *nonum* lentam deprimentem, saepius nervosam appellatam febrim, *decimum* variolas, *undecimum* pleuritidem, *duodecimum* peripneumoniam, hanc vero putridam vltimum siue *decimum tertium* caput sistit. Ea vero *Noster* vtitur docendi methodo, vt res, quas in singulo capite explicat, breuibus sic dictis exhibeat *propositionibus*, quibus argumenta illas confirmantia interdumque scholia, quae inde fluant, subiungat. Si vero a nobis dicendum sit quod rem esse arbitremur, vix non omnem Cl. Auctoris doctrinam ex libris recentiorum physicorum et medicorum, in primis eorum qui omnia in corpore humano obuia phaenomena ex legibus tantum mechanicis demonstrare satagunt, petitam esse, grauissima illa materiei de nervis et vitali vi inde pendente, nimis neglecta, aliis vero rebus intermixtis, quae longe repetita, ideoque ratione finis superflua videntur, neque nullis etiam adhibitis argumentis, quae per se

se quidem vera sunt, animali autem corpori viuo applicata, inter hypotheses tantum referri possunt. Quodsi tamen Cl. Auctorem legeris, neminem medicorum ante ipsum fuisse existimares, qui mathesin atque physicam ad exponendam scientiam salutarem adhibuerit. Paucis id, quod de hoc libro asseruimus, exemplis iam comprobabimus. In *capite primo* summas easque notissimas illas leges tradit de motu, de vi corporum attractrice, tum grauitate, tum cohaesione illorum, solidorum aeque ac fluidorum, de indole porro eorum, qua ad infinitum vsque possunt diuidi, de mutua ignis et aëris inter se actione, atque de vniuersali, quae inde nascitur, fermentationis, dissolutionis atque fluiditatis causa. *Animalis secretionis theoria*, in secundo capite oblatam, sequentibus superstruit propositionibus. Omnium animalium sanguis, ex quo omnes secretiones corporis oriuntur, tale est fluidum, quod globulosis atque serosis particulis constat, quarum his specificè grauiores sunt illae, ideoque fortiore virtute attractrice vique elastica praeditae, maioremque caloris gradum et recipientes et retinentes. Sanguinis velocitas varia esse potest. Muscularis motus per vibrantem motum subtilissimi illius fluidi elastici fit, quod per nervos aduehitur, quo motu musculorum nerui infimulque eorum fibrillae carnae contrahuntur. Aer, in pulmones tractus, sanguinem vario modo afficit, ita nimirum, vt eum in minores particulas diuidat, igneisque eius particulis maiorem vim centrifugam conciliet, qua re attractrix earum vis cohaesionis imminuitur iustusque fluiditatis gradus obtinetur seruaturque. Quodsi tandem alicuius partis vasa sanguifera vel obstrueta, vel contracta, vel aperta, vel dilatata fuerint, velocitas sanguinis in reliquis vasis variat. Ipsam deinde secretionis rationem ex-

p. 71.

p. 78.

p. 84.

p. 105.

p. 121.

p. 128.

positurus *Noster*, per glandulas illam fieri perhibet, igiturque ad diuersam orificii ductus secretorii diametrum, ad diuersos illius angulos ad arteriae truncum obuios, ad diuersam sanguinis, ad secretorium ductum impulsu, velocitatem, et denique ad variam sanguinis, a quo aliis iam in locis aliqua facta fuerit secretio, mutatam indolem respicere iubet, vti v. c. obseruare licet in hepate. Obseruationi illi quod secretio lymphae per motum corporis atque vigiliarum imminuatur, somni autem et quietis tempore

p.158. augeatur, explicationem modi, quo opium agat in nostrum corpus, additam legimus satis amplam.

p.165. Sub finem huius capituli alimentorum digestio expo-

p.189. nitur. Solidorum status, qui in genere febres gignere dicitur, in nimia ipsorum rigiditate atque elasticitate, vel in nimia debilitate et relaxatione

p.207. consistit: ratione autem fluidorum indolis, vt morbi causae generalis, respici debet ad nimis velocem vel etiam tardum eorum motum. Inde vel inflammatoriae, vel intermittentes nascuntur febres.

p.289. Quo maior et solidorum relaxatio fluidorumque viscositas est, eo quoque crebriores sunt febrium intermittantium paroxysmi, ita vt vel singulis, vel alternis diebus, vel quoque serius redeant. Maligni-

P.317. tatis in morbis obviae nomen est tantum ignorantiae medicorum asylum. Malignae putridaeque febres sunt eadem, et nascuntur a dissolutione globulorum sanguinis, vnde obstructio in vasis capillaribus, globulos alias excludentibus, nunc autem admittentibus, motus porro dissoluti sanguinis intestinus, tandemque putredo. Ista vero dissolutio oritur vel a nimia aëris, in eo contenti, rarefactione vique inde centrifuga nimis aucta centripetamque superante, vel a serosa sanguinis parte, talis materiei particulis referta, quae maiorem vim attractricem habent, ac globulorum particulae inter se, vnde fa-

cilius

cilius attrahunt globulos, dissoluunt eos et cum ferrosa parte prorsus vniunt. Facile patet, istas particulas esse debere angulosas nimiamque habere superficiem ratione ipsarum soliditatis, cuius generis falia esse constat, in primis volatilia et alcalica. Ex ultimo tandem capite, reliquis praerogatiuam quamdam mereri nobis viso, praecipua addere liceat de *peripneumonia putrida*, cuius nomen forsitan multis videri possit nouum, et quem valde periculosum morbum a nemine adhuc descriptum esse, in Anglia vero ex triginta annorum tempore iam saeuisse *Nosler* dicit. Inuadit iste homines, qui mali sunt corporis habitus succisque scatent cacochymicis, in primis qui mare nauigantes, crudo salsoque victu putridoque potu vsi, scorbutum sibi contraxerunt, vel qui carceribus detenti aërem impurum inspirarunt. Rubra tunc sanguinis pars dissoluta minima corporis vasa ideoque vel ea pulmonum quoque intrat, stagnando ibi obstructionem tandemque inflammationem gignit. Obstructione pulmonum fieri coepta, aeger difficulter respirat, languido fit atque remisso animo et vel a minimo corporis motu defessus. Si nunc accedat inflammatio, istis nunc quoque symptomatis accedunt alia, caloris nimirum dolorumque, vti in rheumatismo, per omne corpus diuagantium sensus, febris cum anxietate ponderisque sensu in pectore, pulsus valde celer et paruus, tussis sicca, sudores inaequales, perpetua corporis iactatio; post duos tresue dies sputum tenue sanguinolentum, vel materie obscuri coloris valdeque foetidae; ad quintum sextumque diem saepius liuidae petechiae; vrina pauca bruni vel ignei coloris quasi sanguine remixti, absque sedimento; lingua nigra et squalida, sanguis denique ex vena missus apparet resolutus. Si vena fuerit secta, illico superueniunt anxietas magna, sudores frigidi, collabuntur vires,

et intermittit pulsus, licet quoque antea esset fortis, durus, cum violenta febre. Ad sextum septimumque diem vel per nares fluit sanguis, vel per aluum, tumque
 p. 504. cito sequitur mors, nisi prudenti arte afferatur auxilium. Venaesectio valde raro iuuat, nec nisi sub primum morbi initium, et ubi febris nimis valida est cum forti pulsu; iterata vero mortem accelerat. Bezoar minerale cum decocto corticis peruuiiani, olivano, nitro, succoque citri, commendatur, uti et decoctum pectorale cum oxymelle squillitico aliisque acidis. Emollientia vero adiuuandam data expuitionem, haud facile profunt, certe summa cum
 p. 507. cautione adhibeantur. Tussis, si nimium saeviat, versus noctem leniatur data elixirii paregorici dosi. Quidquid autem aeger bibat, semper bibat calidum. Aqua cum vino succoque citri vel aurantii egregium dat potum. Vesicatoria et purgantia nocent. Ut plurimum ad octauum diem sequitur crisis saepius imperfecta vel metastatica, quae vero, si fuerit perfecta, in largo foetidoque sudore et vrina crassa consistit, quare tunc omni modo vires corroborandae illaeque excretiones adiuuandae erunt. Februm reliquarum, in primis lentarum et hecticarum a Cl. Auctore nullam factam fuisse mentionem, miramur.

XIII.

PETRI ARDUINI, Veronensis, Horti Publici Patauini Custodis, Animaduersionum botanicarum Specimen. Patavii ex typ. Conzatti. 1759. 4 mai. pagg. 27. tab. aen. 12.

Plantas, dum adolescens esset Cel. Auctor, iam colligere et obseruare instituit, postea a Cl. SEGUIERIO, cui et in peregrinationibus botanicis comes fuit, botanicos

tanices fundamenta accepit, et PONTEDERAE commendatus, Patauiumque ascitus, plantarum huius horti commissam sibi custodiam, eoque mortuo, huius horti et plantarum ipsius indicem scribendi curam suscepit. A quo tempore plantas, in horto academico cultas, attente obseruauit et examinauit, nonnullasque ab aliis nec memoratas, nec descriptas delineatasque inuenit. Ex quibus aliquot, a se ipso delineatas ac in aes incisas, speciminis loco exhibuit; alias vero obseruationes, ad stirpes spectantes, in aliud tempus reseruare voluit Cel. Auctor. Duodecim sunt plantae, quae specimine hoc continentur; et quidem 1) *Salvia caule fruticoso foliis ovato sinuatis crenatis rugosis hirsutis.* 2) *Salvia foliis cordato ovatis serratis rugosis, bracteis sub verticillis florum senis, calycibus tridentatis.* Chiaee alterae nomine semina accepit PONTEDERA. an Salvia? mechanismus staminum in additis iconibus non expressus. 3) *Teucrium foliis ovato crenatis subhirsutis petiolatis, caulibus spica flauescente pilosa terminatis.* 4) *Teucrium foliis cordatis crenatis petiolatis spicis oblongis densissimis.* Eadem planta in Comment. Societ. Goetting. 1752 delineata et descripta fuit; cum vero Commentarii illi non vbique reperiantur, plantam rectiorem reddere hoc specimine voluit Cel. Auctor. 5) *Chelone foliis inferioribus ovato acuminatis petiolatis integerrimis, superioribus amplexicaulibus lanceolatis, dentatis corollis patentibus bilabiatis.* Quae forte, ut Auctor scribit conuenire, videtur cum chelone fol. amplexicaulibus panicula dichotoma LINN. Spec. II. p. 612, dubitat tamen an LINNAEUS eandem virentem vel siccam viderit. Quam autem MORISONUS III. p. 407 tab. 21. f. 2. nomine Dracoecephali latifolii *Lyfimachiae luteae* foliis proposuit, certe eadem cum Auctoris planta. Corollae galea bifida est, barba et latior et longior, lacinia intermedia minore;

rudimentum quinti staminis extremitate pectinatum. 6) *Clypeola perennis*, foliis inferioribus petiolatis cordato angulatis, superioribus amplexicaulibus lanceolatis, siliculis unilocularibus maximis pendulis minospermis. Est *Thlaspi pannonicum* LOBELII Ic. 120. *Thlaspi montanum* L. CLUSII Hist. II. p. 139. 7) *Alyssum caulis frutescentibus paniculatis, foliis lanceolatis incanis, margine leuiter sinuato undulatis, capsulis compresso orbiculatis tetraspermis.* LINNAEUS Spec. II p. 650 no. 4 eandem inter suffruticosas species commemorauit. 8) *Lepidium foliis inferioribus alternato pinnatis, pinnulis semicordatis, carnosiss, glaucis, superioribus sessilibus dentatis apice ouatis.* 9) *Sinapis hirsuta, caulis frutescentibus, foliis inferioribus lyrato pinnatis, petiolatis; superioribus sessilibus, aliis pinnato-alatis, aliis dentato sinuatis.* 10) *Sinapis siliquis glabris subarticulatis diuasicatis, foliis inferioribus lyrato pinnatis, auriculatis, superioribus lineari lanceolatis integerrimis.* 11) *Pso-
ræa glandulosa, caule erecto arborecente, foliis omnibus ternatis, pedunculis spicatis, bracteis minimis ciliatis.* Barham lous triphyllam vocauit, iconemque, aë rudem, dedit FEVILLÆUS. 12) *Bupththalmum caule erecto unifloro, foliis amplexicaulibus dentatis, inferioribus ouatis obtusis, superioribus lanceolatis acutis.*

XIV.

An Account of the Structure of the Eye, with occasional remarks on some disorders of that organ delivered in Lectures at the Theatre of Surgeons-Hall by THOMAS GATAKER Surgeon Extraordinary to her Royal Highness the Princess of Wales, and Surgeon to St. Georges Hospital. London, printed for R. and J. Dodesly 1761. 8. pl. 7.

Relatio de structura oculi, cum nonnullis adnotationibus de morbis quibusdam huius organi. Proposita in lectionibus in theatro chirurgorum habitis Auctore THOMAS GATAKER, Chirurgus.

Auide libellum huncce percurrimus, quod ob argumenti tractati dignitatem noua quaedam ibidem inuenturos nos esse suspicabamur. Naturalem etiam ordinem obseruatum fuisse videbamus; siquidem in quatuor partes diuisa fuerit tractatio, quarum prima descriptiones partium, superciliarum nempe et palpebrarum, altera, tunicarum, tertia humorum, quarta musculorum oculi continet explicationem. Sed spe nostra nos frustratos dolemus, anatomica enim concisa nimis et proletaria sunt, quae adducuntur, chirurgica vero pauca et incompleta, ita, vt Cl. Auctor non tam historiam earum partium tradere voluisse videatur, quam occasionem quaerere, qua animaduersiones quasdam a se factas exponat. Sufficiet itaque pauca tantum adferre, quae ex reliquis magis notari merentur.

In descriptione ductuum lacrymalium, de fistulae lacrymalis operatione loquens, recte monet, et orbicularis musculi palpebrarum tendinem et hos ductus vulnerandos non esse, cum in priori casu inuersio palpebrae, in altero consolidatio taediosa et impossibilis sequatur. Carunculae lacrymalis pilos, p. 24.
a MORGAGNIO aliisque claris anatomicis euidenter demonstratos, nulla addita ratione in dubium vocat. Oculi bulbum ex duabus inaequalibus partibus inaequalium sphaerarum componi adserit. Vbi de coniunctivae tunicae inflammatione agit de aquis p. 27.
ophthalmicis, linimentis et vnguentis, varia ra- p. 29.
p. 34.

P. 73.

tione compositis atque ex varie mixtis medicinis constantibus ita differit, ut iure quodam illa medicamenta non in uniuersum specifica dicenda esse contendat, sed singulum morbi statui accommodandum esse adfirmet. In morbis lentis crystallinae frequentius occurrit cataracta, quae olim depressa in humorem vitreum curabatur, nunc autem per dissectam corneam, ut notum est, extrahitur. Contra recentem hanc methodum autem multis declamat Noster argumentis, et eam periculi magis plenam esse iudicat ac antiquiorem. Quum nempe impediri non possit, quo minus iris laedatur, vel pupilla aliquando nimis distendatur, ciliares processus lacerentur, sanguinisque ex vasis eruptio producat, vel, quod praecipuum arbitratur, aer, per magnum corneae vulnus immixtus, humores aequae ac eos inuestientes membranas ruditer afficiat. Certissimumque esse ait, taediosas admodum atque dolentes inflammationes et suppurationes oriri, nec non cicatricem liberum radiorum visoriorum adcessum et hinc visionis libertatem auferre vel imminuere. De quibus tamen conditionibus aliter eos decernere scimus, qui bono hanc etiam curationis rationem cum successu susceperunt.

XV.

De spiritu in morbis tentamen Autore IACOBO FRIDERICO ISENFLAMM M. D. Viennae Austriae, typis Ioan. Iacob. Iahn. 1762. 8. pl. 5 $\frac{1}{2}$.

Omnibus corporibus, quae complectitur hic terrarum orbis, ne durioribus quidem vel lapidibus vel metallis exceptis, inesse subtilissimum quoddam et hali-

halituosum principium, a natura inditum, mortalium
 saepissime sensum effugiens, et interdum per effe-
 ctus tantummodo cognoscendum; eo singula cor-
 pora specifico quasi charactere inter se inuicem di-
 stingui; illud summa subtilitate, mobilitate, vola-
 tilitateque esse praeditum, et corporibus, etsi ab
 iis auolet, nec mole, nec pondere quicquam detra-
 here; in corporibus animalibus, vt ad ea nos cum
 Cl. Auctore restringamus, gigni e tota humorum
 massa et pro illorum varia mixtione, cum sana, tum
 deprauata, in statu naturali et morbofo, diuersum
 esse; a chemicis illud vocari spiritum rectorem;
 apud physiologos sub nomine effluuiorum et apud
 clinicos miasmatis occurrere, perspicuum est con-
 statque inter omnes: nemo vero, quantum scimus,
 ante Cl. Auctorem spiritus vocabulo vsus est de mor-
 bis; quod, cum rem non inepte indigitare nobis vi-
 deatur, facile admitti posse arbitramur. De hoc
 igitur corporum morbosorum vario miasmate aut
 spiritu in his paginis seorsim agere secum constituit;
 quam rem, vt indagatu difficillimam, sic in morbo-
 rum disquisitione et medela vtilissimam, quomodo
 extricauerit, lectoribus nostris ostendemus, prima-
 ria libelli argumenta repetituri.

Ab initio illius Cl. Auctor praesentiam et natu-
 ram halitus huiusce spirituosi, vbique per tria na-
 turae regna diffusi, breuiter describit, clarorum vi-
 rorum testimoniis et experientia probat, praemissa
 deinde haec ad corpus humanum, et in specie aegro-
 tans applicat, inde ideam spiritus morborum confir-
 mat, postea morbos recenset, in quibus per varia phae-
 nomena praesertim sese manifestat, et denique docet,
 hunc spiritum nosse, quid iuuat. Ex superius iam indi-
 catis halituosi huius spiritus principibus criteriis,
 quibus mox non nulla alia subiuncturi erimus, facile

colligi potest, intelligere Cl. Auctorem sub spiritu
 p. 21. morborum *subtilissimam illam massae humorum admix-*
tam materiam, huic soli propriam morbo, absentem, vel
aliam in reliquis omnibus; simulque patet, cum mor-
 bi sint, in quibus non humorum massa, sed solido-
 rum compages, vi interdum externa, a statu reces-
 serit naturali, spiritum hunc non omnibus posse at-
 tribui morbis. Quis v. c. in fractura et luxatione os-
 sium, in vermibus, canalem intestinorum inhabi-
 tantibus, singularem quaereret spiritum? Dantur
 praeterea morbi in quibus spiritus huius praesen-
 tiam suspicari quidem, ob disquisitionem vero
 utique difficillimam, clare ostendere non possumus.
 Huc pertinent variae species febrium, imprimis non
 nullarum intermittentium, malum hypochondria-
 cum et hystericum et non nulli alii morbi. Clarius
 vero apparet minorque certe de eo dubitandi super-
 est ratio in febribus continuis putridis, exanthema-
 ticiis, purpuratis malignis, variolosis, morbillosis, in
 febribus lentis nervosis, hecticis, dysenteria, co-
 rryza, arthritide et podagra, atque ex analogia in
 calculo, lue venerea, scabiei variis speciebus, can-
 cro, carie ossium, rabie canina et tineae. De singu-
 lis his morbis pauca momenta, quae huc pertinent,
 ex libello addamus, quo Cl. Auctoris sententia eo
 clarius appareat.

p. 49. In curatione febrium intermittentium et resol-
 ventia et euacuantia medicamenta interdum ne hilum
 quidem proficiunt, cum non nunquam, sine observata
 aliqua euacuatione, non nullae pustulae, in labiis oris
 efflorescentes, omnem mox auferunt febrim; vnica
 interdum corticis Peruviani dosis, eaque minima,
 vehementissimae et diuturnae feбри sufficit suppri-
 mendae; vnico foetente largo sudore extinguitur
 omnis fomes, qui crastina luce novum produxisset
 morbi impetum. Nonne hoc a volatili quodam
 spiri-

spiritu dependeat, quo per sudorem aut per pustulas e corpore eiecto, aut per corticem vineto, et morbus sufflaminatur? Grato odore quae sanis placent, displicent nervis hypochondriacorum hysteri-
corumque. Multum valent in his ferulacea foetida, syluestres forte morbi spiritus obtundentia ener-
vantiaque. Res interim de his, vt de calculo, de quo mox, est dubia, nec ipse Auctor aduersatur neganti, in reliquis vero morbis de spiritus prae-
sentia et imperio certior maximeque persuasus. p. 65.

Qui dubitauerit de illo in febris continua putrida, fore neminem, cum Cl. Auctore et nos arbitramur. p. 34.
Describi quamuis non potest, eum tamen prima morbi aggressio, progressus, symptomata, a leui causa tam graui, et finis satis superque testantur. Nolit Cl. Auctor, sibi obiici, se recoxisse doctrinam de malignitate et venenato halitu morborum, diu iam explosam a SYDENHAMO, qui eam excogitatam generi humano longe ipsa pulueris pyrii in-
ventione lethaliorem dicit, eoque se occasionem praebuisse calidiori methodo, vt scilicet hac via quam ocysime venenosus hic hostis e corpore fugaretur. Sed nemo iure id obiicere poterit ipsi, strenuo Sydenhamianae et Haenianae methodi asseclae et defensori. Si vllibi, sane in febribus exanthematicis spiritus huius indolem cognoscendi vberri-
ma suppeditatur opportunitas. Longe alius est indolis, perhibet Auctor, ille spiritus, qui purpuram, quam qui petechias, et alius iterum, qui variolas, quam qui morbillos excitat: Quid? quod Cl. Auctor affirmare sustinet, vnum eundemque spiritum etiam vnicam tantummodo posse prouocare morbi speciem, et dispositionem aegrotorum hic nihil valere, praeterquam quod aeger vel leuioribus vel grauioribus afficiatur symptomatibus, cum e contrario artis periti multum aegrotorum dispositioni tribue- p. 42.

- tribuerint ita vt ex eodem contagio in alio purpuram benignam, in alio malignam, et in alio petechias posse oriri crediderint. Licet concedendum sit: miasma purpurae nunquam variolas, i. e. exanthemata toto genere diuersa, esse producturum. Veremur interim, ne hac in re multi dissentiant a Cl. Auctore.
- p. 51. Febribus quoque lentis adscribitur talis spiritus, per venas actus, sanguinem in resolutorium aestum incendens, in hecticis a laesis visceribus putridus exhalans; cui fere similis est ille, in dysentericis obseruatus, quem probant solamen ex transpiratione aucta perceptum, odor foecum putridus et contagiosus et commercium cum his aegris haud innoxium. Ex magna
- p. 55. etiam, quae est dysenteriam inter et coryzam, analogia, quam ingeniose depingit Auctor, nec hanc ab halituoso hoc et volatili spiritu immunem asserit. Licet
- p. 57. in arthritide et podagra tophacea quaedam materia, vel ad articulos deposita, vel per corpus circumacta, plerumque, nec immerito, incusetur, nihilo tamen minus singularem et summe volatilem spirituosum indicat huius morbi genium indoles haereditaria, contagiosa, perniciosissimaque rapiditas, qua ex articulo in articulum atque per totum corpus oberret. Volatilis itaque hic spiritus exhibet causam, calcarea vero recrementa effectus morbi.
- p. 59. De calculo quid affirmet, ipse Auctor dubius est. Affinitas interim cum praecedenti morbo, ab auctoribus passim probata, haereditariaque dispositio halituosam causam non dissadere Auctori videntur et calculum id esse credit, quod calcarea materia in arthritide esse solet. Miasma contagiosum in lue venerea et scabie vbique notum, eorum antidoton vniuersale, contagiosi halitus corrector, summo est argumento, quod spiritum horum morborum
- p. 67. ignorari non permittit. Corpori, vlcere cancroso affecto, optimum ingestum nutrimentum et bonus
inde

inde praeparatus chylus expectare nos iuberet blandum affluentem liquorem et demulcentem, quem vero ichorosum acerrimumque deprehendimus. Adeste igitur coniicit Cl. Auctor in ipso vlcere materiam subtilem vividam, quae blandissimum humorem in acerrimum ichorem continuo conuertat; nec prius plenaria huius mali curatio poterit sperari, quam inuentum fuerit medicamen, quod naturam acris huius spiritus destruat; qua in re felicia iam cum cicuta capta fuisse experimenta, nemo nescit. Eiusdem generis materiam in carie ossium comprobant color, odor, effectus et medela huius mali. Parte morbosa resecta, omne malum crederemus ablatum, sed eheu! nouam in alia parte spiritus aperit scenam. Si quis tandem morbus a tenui quodam ac subtili, simulque efficaci halitu dependet et si cui morbo spiritus, certissime rabiei caninae, poterit adscribi, quae, a laeuissima causa orta, in tam horrendos increfcere solet effectus, vt illa saeuior truculentiorque morbus ne cogitatione quidem possit effingi.

p. 69.

p. 71.

Sed haec omnia non ingenii causa conscripsit Cl. Auctor, nec ignorantiae offerre voluit velamentum, quo patrata in medendo obtegi possint vitia, sed, vt medicos excitet, ad hanc rem, quam arti medicae summo vsui fore praeuidet, diligentius attendere, illamque nondum perspicuam, illustrare. Hortatur interim medicos, ne prius ab vniuersali et vsitata recedant methodo, quam videant, illam, quae alias nunquam auxilium negare solet, huic illiue morbo pertinaci subigendo non sufficere: tunc morbi subtilem spiritum specifico aggrediantur remedio, si cognitum est; si non, illud caute tentando quaerant. Sic inclaruit vsus corticis peruiani in variis morbis, vuae vrsinae in nephriticis, verbenae in cephalalgia saeuissima, folia aurantium in neruorum distentione, mercurii in lue venerea,

p. 77.

p. 88.

XVI.

Lettre de Monsieur le Docteur BUTINI a
Monsieur CHARLES BONNET sur la cause
de la Non-Pulsation des Veines. 21 Jan. 1760
(*sine loco**) Plag. 2.

h. e.

Epistola Cl. BUTINI Med. Doct. ad Cl. CA-
ROLUM BONNET de causâ, cur in venis
nullus pulsus.

Arterias a sanguine lacesitas ad eum propellen-
dum singulari quadam virtute consurgere, hanc
vero in venis, robore ad nitendum carentibus, fru-
stra quaeri, manifestum est. Attamen fuere, qui
eandem in venas transferre conarentur, qui nec
partium corporis humani fabricatione bene cognita,
nec rerum, quibus vniuersa natura constat, usu sa-
tis instructi, multos erroribus implicauerunt. Eam
ob causam huius disputationis, magna diligentia con-
scriptae, is potissimum esse videtur finis, vt illud
venis eripiat in sanguinem imperium. Quae cum
omnia vt planissime pateant, subtili et accurata
mathematicorum ratione proponat plane et nos co-
gi videmur, huius disputationis sensum, eodem de-
monstrandi genere aliis aperire.

p. 4. Vt igitur statim rem ipsam arripiamus, venis
denegatur se colligentibus sanguis propellendi vis,
quod sanguis, corde contracto vel extenso, aequabi-
liter ferit earum parietes atque extendit: quod eo
accidit, quia sanguis in venis cauis procurrens, in
hac cordis alterna contentione et remissione, eadem
semper impedimenta superare debet, quodque in vl-
timis arteriarum viis iter faciens, a neutra retardatur.

Alte-

*) Geneuae.

Alterum efficitur auxilio auriculae cordis anterioris, sine qua cordis contractio, sanguinem impeditura, dilatatio autem celerius receptura, ideoque illam venarum extensio, hanc earundem coarctatio secutura esset. p. 5.

Alterum vero hinc cernitur, quod, quae vires sanguinem vicissim inter se stimulant ad motum, siue cor constringatur, siue relaxetur, eae in angustiis arteriarum, in eundem effectum conspirant, siue quod idem est, quod in systole cordis atque arteriarum, sanguis in arteriarum viis difficillimis aequabiliter fertur. p. 6.

Vt hanc rem planissime assequamur, duae sunt causae, quae virium cordis contracti, in vltimis arteriarum latebris, et arteriarum, coniunctim sumtarum a contentione remittentium, aequilibrium feruent, altera est in elasticitate arteriarum, altera in resistantia, ab angustiis arteriarum sanguini nata. Constat enim iis sublatis, nec arterias nec parietes a sanguine attolli, sed illas, quamuis elasticitate quadam valentes, in constrictione perseveraturas esse.

Itaque est plane, vt existimemus, horum impedimentorum occursum, sanguinem in parietes arteriarum conuerti, easque irritatas se colligere vi tanta, quanta est cordis vndique collecta, atque his efficitur, vt sanguini in arteriis minimis idem motus, quem cor contractum impressit, inferatur, videlicet aequalis placidusque, siue cor, siue arteriae virtute tunicae carneaе, sanguinem proiciant. Vt huic rei fidem faciat Clariss. BUTINI, theorema DAN. BERNOULLII, ad definiendam pressionis lateralis mensuram, in medium affert. p. 7.

Vas aquae recipiendae aptum, prope ad basin, vbi in foramen exit, recipit tubum transuersum fistulum, qui terminatur emissario. Ex medio tubi surgit canalis verticalis, quaeque in illo adscendit aqua pressionem lateralem, quae vero in vase maiori summa p. 8.

mauna

- num petit, vim totalem exercet. Iam si accidit, vt emissarium angustius sit orificio, impulsus in parietes atque vis totalis inter se respondent, vt vtrunque plane idem altitudinis gradus attingatur. Quae orificio repente clauso aliter omnino deprehenduntur: nam quae est vis totalis intermittit, et columna aquae in parietes conuersa sola efficax est, quae
- p. 9. cum, sicuti apparet, habeat eundem altitudinis gradum, ad quem aqua in vase, in quo est vis totalis, peruenit, eandem virtutem in se recipit, et eadem celeritas fluidi in emissarium propagatur. Pro columna vero, quae in tubum sese inclinando partem virium amittit, si aliud pondus aequaleingas, pistillo in canali laterali inhaerens, animaduertes, orificio nunc clauso, nunc rursus aperto, pondere, quod pressionem lateralem referat, adscendente et descendente in canali laterali, prout orificium vel patet vel obstructum est, fluidum in tubo contentum comprimente, vi totalem fere aequante fluidum sine mora transire emissarium et quidem semper vi, celeritate et copia aequali, siue vi totali protrudatur, siue pressione laterali. Igitur si velis vas illud maius cum cordis facultate, orificium cum orificio aortae, canalem verticalem cum elatere arteriarum, et emissarium cum vero arteriarum, quo finiuntur, exitu conferre, quae ratio sit circuli sanguinis in arteriis apparet. Eo vero neglecto, quod ad aliquam aequalitatem virium, tum earum, quibus arteriae systole contrahuntur, tum cordis, quibus, diastole arteriarum persistente, distenduntur, probandam, valet, argumenta conquiruntur, quibus planum fiat, impedimenta sanguinis in angustis arteriarum esse ea, quae possint vim cordis eandemque vniuersam, et impulsus in parietes aequalem reddere. Hoc autem experimento ab H A L E S I O instituto firmatur. Si aqua
- im-

impetu quodam in mesaraicam arteriam exprimitur, huius arteriae extremi rami, eam ob causam transversim truncati, vigesimam tantum recipiunt illius partem, quae eodem tempore truncum petit ita sectum, ut rapido aqua flumine in illo possit procur-rere. Igitur, sicuti ponit DAN. BERNOULLI, di-scrimen momenti, quo pressio sanguinis differt late-ralis in trunco mesaraicae arteriae superioris a vi sanguinis totali, in quadringentesima vis totalis parte consistit: quod momentum, ex Nostri sententia, mi-nus etiam poneretur, ratione habita visciditatis san-guinis, tenaciores certe illa, quae aquae inest, vi-aeque patentioris ramusculorum mesaraicae arteriae quam ceterarum. Quae cum ita sint, pressio late-ralis in vniuersum quidem spectata, fere aequalis iudicari debet vi totali arteriarum, et sanguis arte-riarum nisu in difficiles minimarum vias impactus in eas plane adductus esse videtur vi tanta, quantam facile cordi tribuas. Ac ne hoc quidem robore de-stituuntur, sed periculo, quod secundae observa-
P. 12.
tionis haemastaticis Halesianae inest, planissime con-firmatur. Illo enim constat, tubo verticali, in equicruralem arteriam immisso, sanguinem qui sy-stole instante altitudinem centum et sedecim polli-cum in illo attingit, eadem cessante, pollicis modo vnius spatio se retrahere. Igitur vis, qua sanguis, a corde propulsus, vim sanguinis ab arteriis expressi superat, secundum idem experimentum, vix cen-tesimam decimam sextam partem videtur attingere. Omnium autem arteriarum a crurali vsque ad pe-
dem extremum coniunctim sumtarum coarctatione, impetum sanguinis arteriarum extremarum eo tem-pore, quo constringuntur, augente, facile patet, cor-de arteriisque contractis, discrimen momenti cir-culi sanguinis minui semper, quo difficiliore arte-riarum sunt viae et quo propius finem arteriae at-

- tingunt, supprimi. Venas igitur pulsu non attolli demonstrat, cum fabricatione auriculae cordis anterioris, tum elatere arteriarum, tum impedimentis sanguinis, quae in arteriarum angustis a visciditate et frequentia superficialium, quas sanguis propter copiosiore vasorum diuisionem, tanquam scopulos alluere debet, obici solent. Hisce expositis Cl.
- p. 13. BUTINI fatetur, difficile esse locum, ubi pulsus fessus fileat et sanguis, corde siue constricto siue relaxato, aequali flumine procurrat, attingere, quamuis appareat, impetum cordis auctum arterias minimas eo extendere, ut pressio, quam sustinent parietes, vim totalem cordis attingat. Atque in his consistit primae partis argumentum: nam, quae de pulsu arteriarum in secunda valetudine, atque de vera notione arteriarum extremarum breuiter disputantur, missa facimus.
- p. 14.

- Altera vero pars quaedam de HALLERI physiologia monet et de illo potissimum (T. II. p. 352) capite quod in explicando defectu causarum pulsus in venis, versatur, quas a Cl. DE SAUVAÏGE allatas Cl. HALLERUS probare accusatur. Primum enim ille ponit sanguinis celeritatem arteriis contractis, ubi iam diu cor reliquit, plurimum augeri, arteriis autem distentis, sensim et paulatim minui. Videtur itaque sanguis quo magis cor fugit, celeritatis discrimen minui, atque adeo in parte quadam euanescere, ubi celeritas et in contractione et in remissione arteriarum eadem est. Haec eius de pulsu arteriarum opinio, quoniam vitio laborare, neque inde venarum pulsus priuatio deriuari posse
- p. 15.
- p. 16. videtur, plane reiicitur, atque pugnatur, auriculam cordis anteriorem necessariam esse, qua neglecta, vel aequalis in arteriis sanguinis celeritas impar sit pulsui venarum impediendo. Quae igitur in vniuersum hanc rem, attinent omittimus, ne disputatio nostra

nostra crescat, sed quae argumentorum ponderibus indigent, coacti adducimus. Expediendum itaque p. 17.
 esse videtur, quomodo fiat, ut utraque sanguinis celeritas et in systole et in diastole, tantum in ultimis arteriarum finibus, ac non potius in truncis arteriarum aequalitatem assequatur. Quod enim ad opinionem iam allatam attinet, falsa quoque videri debet, cum celeritatis diminutio et augmentatio, ne inuicem respondeant et aequalitatem contingant, saepius impedian-
 tur. Deinde experimento constat, celeritatem sanguinis arteriis contractis, quamvis ab aorta usque ad ultimas arterias semper augescentem, vix tertiam partem celeritatis sanguinis in iisdem arteriis eo tempore, quo illae extenduntur, expleturam esse. Quibus cogitur, resistantiam in transitu angusto arteriarum, magni esse ad hanc rem confirmandam ponderis: videtur porro, quod negligere non debemus, opinio Cl. DE SAUVAIGE Auctori nostro, de celeritate sanguinis arteriosi, in systole arteriarum ab aorta ad extremos arteriarum fines usque semper aucta, a duobus *Φαινόμεναι* anatomes pendere. Primum, cum in quavis arteriae sectione amplitudinem eius in diastole ubique summe aequalem inuenit, deinde cum a summa diametri ramorum cuiusque arteriae superari putat summam truncorum, quae tamen diuersitas minor sit, quam pro distantia singulorum a corde, primum dari potest: alterum minime. Nam Cl. Scriptor laborans in p. 20.
 inuenienda certa mensura augmenti in sectionibus arteriarum, cum 1745 circulo sanguinis operam daret, inuenissetque spatium arteriarum inaequaliter augeri, varia illarum a corde distantia nihil huc conferente, huius rei inueniendae spe plane abiecta, sibi persuasit, celeritatem sanguinis in systole arteriarum augeri in truncis insignioribus, imminui vero in remotioribus a corde, plane eodem modo, ac in
 Y y 2 diasto-

- diaftole. Nec hoc quidem miratur, discriminibus certa lege inter ramos et truncos distributis : spatia enim, quibus varii ordines feperantur, quo sunt a corde remotiora, eo magis etiam contrahuntur, quod crebriores docent bifurcationes. Itaque apparet, in minori diftantia fectiones arteriarum, quam ea eft, qua a corde feiunctae sunt, non augeri.
- p. 21. Quod autem HALLERUS in animalibus, fanguine quae sunt frigidiori, in vltimis arteriarum ordinibus ramos deprehendit truncis minores, vt, comparatione facta, efflet aliqua magnitudinis vtrorumque proportio, id an etiam in corpus humanum cadat, non
- p. 22. patet. Videamus nunc, quid contra aliud HALLERI argumentum proferatur. Obiicit ille priuationem pulfus venarum in animalibus, in quibus magna arteriarum pars et contractione et dilatatione deftituitur. Primum aequilibrium circuli fanguinis non tollitur, fi exigua illa arteriarum prope cor fitarum pars eam fanguinis copiam continet, qua ceterae, cum cor extenditur, repleri poffunt. Deinde quia arteriarum pulfus oculis non percipitur, an ideo negandus eft? Quia etiam, quae Ill. HALLERUS expertus eft, Cl. BUTINI in fuam rem vtitur.
- p. 24. Impedimenta, quae fanguis in traiectione per arterias patitur, continere caufam extensionis arteriarum exiguae fane illius in animalibus, in quibus fanguinis circulus vaforumque numerus minimus eft, pugnat. Problema allatum periculo quoque illo, quo Cl. FLOYER pulfum imitari conatus eft, aquam in bouis inteftina alternis vicibus impetu quodam intrudens, firmatur. Nam preffio lateralis fortior excitabat pulfum prope piftillum, qui longius procedens propter eandem fractam viamque patentiore, per quam aqua alternis vicibus tantum immiffa, liberius in extrema inteftini deducebatur, ceffabat. Quis itaque non intelligit, vtriusque rei caufam in
- inte-

intestini pulsum nacti contractione et in vi atque fluiditate aquae latere?

Pergamus ad reliqua, quae Cl. BUTINI de p. 25.
HALLERI disputatione monet. Nam primum quod ille defectum pulsus in longinquitate quadam a corde inde proficisci putat, quia discrimen celeritatis vndae sanguinis sequentis celeritate vndae praegredientis euanescit, deinde quod docet iter sanguinis statim ab initio venarum commodum reddi, nec in transitu vasorum impediri (sicuti apparet in columna sanguinis a corde ad digitos vsque protensa, in decem alias minores diuisa, quarum cordi viciniore praecedentibus celeriores deprehenduntur, ita vt extremarum nullum plane discrimen sit). Haec omnia non pugnant contra scriptoris nostri sententiam, quippe non negantis vim cordis incitatum pulsum in arteriarum viis latebrosis propagare. Contendit igitur, quae de circulo sanguinis HALLE-
RUS retulit, maximam partem in cordis systolem conuenire, et quae de incitatori velodia vndae sanguinis insequentis statuit, absolui pressione laterali, quae corde contracto sensim sensimque ab eo sese remouens obtunderetur. Minime vero conceditur, p. 27.
pressionem lateralem, in illis latebris, quibus vires franguntur, infirmam quiescere, nam viuere illam adhuc quamuis eneruatam, et in venas repere quamvis plane iam deficientem, donec in venis cauis occumbat. Quae omnia clarius perspicui posse hinc pugnatur, quod motus sanguinis in truncis venarum solus sustineatur sanguine minimarum venarum ante se omnem sanguinis molem agente, quae resistendo attritus, quamquam leuiore, in parietes excerceat, et ideo pressionem lateralem sollicitet. Quid enim? p. 28.
non tribueris pressionem laterali impetum sanguinis ex apertura venae per incisionem facta, etiam neglecto fasciae adiumento, nihilominus alte profilien-

- tis? Quod multo etiam clarius perspicitur in homine acuta febre correpto, in quo vis cordis totalis ideoque pressio lateralis per morbi ferociam instigatur. Nullo igitur modo negatur hoc vno tantum pressionis lateralis imminutae fundamento niti cessationem pulsus vel sensibus iudicandam in extremis arteriarum finibus. Neque vt HALLERUS facere videtur, ex iis quae posita sunt de pulsu arteriarum in angustiis earundem sensus fugiente, redditur plena et perfecta causa defectus pulsus in venis: ad hunc enim probandum praeterea opus est pressione laterali non modo nullis limitibus circumscripta, vti videtur HALLERO, sed etiam tanta, quanta arteriarum vi collecta vim cordis totalem plane aequet. Quod problemate (p. 9.) proposito planum fieri possit. Quibus efficit Ill. HALLERUM etiam auriculae cordis anterioris auxilium agnoscere debuisse,
- p. 29.
- p. 30. quo neglecto, pulsus ex venis exterminari nequit.

XVII.

De Therapia per iucunda, Praeside D. ANTONIO GVILIELMO PLAZIO, Path. P.P. Ord. Facult. Med. Seniore, Acad. Decemuiro, Maior. Princip. Colleg. h. t. Praeposito, Acad. Imperial. Natur. Curios. Socio, pro gradu Doctoris disputabit *Christianus Fridericus Baumeister*. Lips. d. 20 Iun. 1760. 4. pl. 5.

Corporis humani tanta est fragilitas, vt variis eius morbis obuiam ire saepius necessarium sit, in qua re quidem non semper violentis, sed quandoque iucundioribus remediis vtendum est, vt sinistra eorum cadat opinio, qui medicos non nisi per dolores morbis mederi perperam autumant. Licet enim in arte
chirur-

chirurgica variae excerceantur operationes, quae crudelitatis aliquam speciem prae se ferre videantur, in genere tamen ars salutaris ab opprobrio hoc immunis esse debet, nec etiam nonnullorum errores et vitia ipsi arti medicae contumeliam parare possunt. Inter remediorum amoeniorum genera extra officinas pharmaceuticas reperiunda primo loco nominandum est vinum, cuius praestantiam et virtutes PLINIUS vberius exponit: *vino in-
quiens aluntur vires, sanguinis hominumque calor, vino-
que modico nervi iuvantur, stomachus recreatur, appeten-
tia ciborum inuitatur, tristitia et cura hebetatur, somnus
conciliatur, vomitiones sistuntur.* In nonnullis tamen morbis, v. c. plethora, haemorrhagia, arthritide, cet. a vini usu prorsus fere abstinendum est. In partes constitutivas viui deinceps inquit Cl. Au-
ctor, cuius commendatio vini tanto minus suspecta habenda est, quanto sincerius ipse fatetur, se ab omni plane etiam parciori vini usu a longo iam tem-
pore abhorrere. Ex musicis concentibus optimi effectus ad corpus mentemque redundant, quapro-
pter non sine ratione quam plurimae gentes in ex-
colenda arte musica operam dederunt. Spirituum motus inordinatos musices auxilio in ordinem re-
digi permultae testantur observationes, imprimis autem, si cantum insuper addideris, ut geminato quasi impetu animi conturbationes debellantur. Non solum autem menti reficiendae conducit diuina haec ars, verum etiam corpus ad saltationem placide inuitat, cuius emolumenta in exercendo corpore neu-
tquam sunt negligenda. Quemadmodum autem non omnia omnibus arrident, nec et conducunt, sic vnicum hoc exercitium non est praestantissimum, sed aliae non minus iucundae dantur corporis mo-
tiones, deambulatio intra hortos et ridentia prata, equitatio, vectio in rheda, conorum lusus, cet.

Motum sequi debet quies et virium refectio per alimenta. Conuiuiorum itaque iucunditas et amicorum assidentium colloquia mentem a curis auocant, et vires ad seria posthaec peragenda alacriores reddunt. Nec spernenda sunt spectacula, comoediae nimirum atque tragoediae, quas praesentia sua illustrare summi viri dedecori sibi non ducunt. Amor coniugalis tandem maximas menti et corpori parat dulcedines vtrique sexui salutare. Hoc omni iucundiorum remediorum apparatu ad sanitatem conseruandam morbosque debellandos prudenter quilibet frui poterit.

XVIII.

De Therapia per iniucunda, Diff. inauguralis, Praeside D. ANTON. GVILIELMO PLAZIO, Respondente *Samuel Gottlieb Silchmüller*, Lips. d. 23 Iul. 1762. 4. pl. 3¹.

Diuersa medici facies est pro morbi et aegrorum diuersitate mutanda. Tanta enim nonnullorum morborum est atrocitas, ut lenioris curandi methodi ope non solum nihil profici queat, quin potius, nimium cunctando aut blandiendo, cuncta in deterius ruant. Iniucundis itaque haud raro vtendum est remediis ex diaetetico, pharmaceutico et chirurgico fonte petendis. Lautioris mensae deliciae, quibus nimium nutritum fuit corpus, subducendae sunt et repletioni nonnisi depletio opponenda, non tamen sine omni cautione, ne talis per inediam et abstinentiam instituta curatio vires nimium deiciat. Motus frequentior et fortior saepius eo magis est suadendus, quo maiori cum voluptate homines obesi et vitae sedentariae dediti ignauum corrumpunt
cor-

corpus, cui, post peractam motionem et mobili-
bus redditis humoribus, euacuantia laxantia propi-
pinari debent. Horum quidem paucissima leniora
et palato grata deprehenduntur, reliqua autem et sa-
pore ingrato, imo nauseoso et violento operandi
modo horrorem quendam aegris incutiunt. Ad
euacuantium classem iure referri merentur anthel-
mintica, quorum praecipua vis in amaritie consistit,
vt gentianae radix, summitates centaurii minoris
atque absinthii. Sunt quidem, qui dulcibus ver-
mes eiicere volunt, sed perperam. A primis viis
ad secundas transeundum et sanguinis puritati inui-
gilandum est, in qua vel conseruanda, vel restituen-
da, diaphoreticorum vsus conuenit, quibus transpi-
rationis negotium adiuuatur. Quemadmodum au-
tem molestum satis est extra morbum largius sudare,
ita vel maxime arte proliciendus sudor grauioris sen-
sationis iniucunditatem producit. Maiores adhuc
sunt saluationis molestiae iis subeundae, qui vene-
rea labe inquinati sunt. Inter iniucunda remedia
referri quoque merentur odorifera foetida, quae in
affectibus hystericeis nonnunquam in auxilium vo-
canda sunt. Animi tranquillitas inter maximas vi-
tae felicitates numeranda saepius tamen turbatur,
qua propter et ab affectuum prudente moderamine
magna sanitatis pars pendet: tristem ergo quando-
que esse conducet iracundum; fletui nonnunquam
indulgendum, vt lacrymosa materia, quae facile sta-
gnare solet, intra glandulas suas, liberiore flumine
excernatur. Nimiam humorum velocitatem terrore
cohiberi posse, singultus atque hamorrhagiarum
exemplo constat, dum solidarum partium fibrae, hac
ratione constrictae, fluidorum egressum cohibent.
Quemadmodum itaque non semper ex voto viuimus,
nec constantissima gaudemus valetudine, ita et reme-
dia, quibus sanitas laesa restituitur, non semper esse
possunt amoena.

IOHANN VLRICH BILGVERS, *der Arznei und Wundarznei Doktors und General-Chirurgi, bey den Armeen Sr. Kön. Majestät von Preußen, Abhandlung von dem sehr seltenen Gebrauch, oder der beynahe gänzlichen Vermeidung des Ablöfens der menschlichen Glieder, aus dem Lateinischen übersetzt und mit noch einigen Wahrnehmungen vermehrt. Berlin, bey Arnold Wever, 1761. in Octav. 19 Bogen.*)*

- V**tilissima est, quae hoc libello explicatur quaestio, an membra grauius vulnerata conseruari possint. Itaque faciendum nobis est, vt, quid Scriptor Clariss.
- P. 14. doceat, diligenter aperiāmus. Reprehendit autem eos, qui membra secando tollant, vel crudelitatem faeuientem in genus humanum, vel curationes parum caute susceptas, vel negligentiam remediorum efficacioris medicinae: cum aliae tutiores et securiores pateant viae curandi, et aduersus gangraenam, cuius pernicies vitae periculum allatura, necessariam facere videatur membrorum amputationem, incre-
- P. 38. dibile sit, quantum praestet cortex peruianus. Huius virtutem et a se ipso et ab aliis medicae artis laude clarissimis viris abunde spectatam nunquam fallere, si nihil eorum, quae obseruanda sint, negligatur. Primum omnium, corruptas partes esse incidendas, vt manifestum fiat, et, quatenus partes gangraena vexentur, et, quod ex incremento foetoris

*) Eundem istum libellum Noster paullo ante, cum Halae Magd. Doctor fieret, latine scriptum foras dederat hoc titulo: *dissertatio inauguralis, de membrorum amputatione rarissime administranda aut quasi abroganda.*

toris, faniei, insensibilitatis et mali coloris indicari queat, vtrum spes aliqua medendi superfit, nec ne? Deinde opus esse, vt partes corruptae cultro separantur, vt, quae ossium habitudo, et quam longe progressa illorum corruptio sit, appareat. Partes corruptas fouendas esse myrrhae, mastichis puluere, oleo caryophyllorum, hiatu linteis carptis repleto, balsamo bonae notae instillato, circumvoluto simplici panno.

Valere autem aduersus gangraenam etiam epithemata, quorum pro aetatis aegrorum diuersitate, proque necessitate, cum aliarum rerum tum vel adstrictionis vel relaxationis, varia forma esse possit. Eorum enim beneficio existere optimum pus, et dari occasionem corrupti tollendi. Sed moto pure, statim esse, ne- p. 52.

glectis omnibus externis medicamentis, corticem peruianum largiore dosi exhibendum, eiusdem vi decocto florum chamomillae, succo citri, spiritu salis communis excitata. Quod si pus expectationi respondeat, vtiliter imponi digestiua emollientia: os cariosum, sectione facta, tollendum, puris abstersionem assiduam noxiam esse. p. 64.

Afferuntur iam argumenta non pauca, quibus euincatur amputationis vsum plane repudiari debere. Praecipua sunt haec: recisione membri facta, nihilominus gangraenae prorruptioni semper esse praecauendum: ergo consultius esse, membro saluo eam vel impedire, vel aliis modis tollere: praefertim, cum amputationem fere sequi solita esset humorum deflexio, noua et celerior gangraenae inuasio, febris vehementia, et ingens virium corporis debilitas. p. 72.

Etiam partium contusarum et ossium fractorum p. 102.
curationem fieri sine vlla recisione, longum hic sermonem insituit de febris vulneraria partibus valde contusis infesta. Docet autem et haemorrhagiae con-

- contusorum membrorum, quippe coercendae aliis medicamentis, et gangraenae metum saepenumero esse inanem. Porro interdum fieri, vt,
- p.114. fragmentis remotis, maiores ossium partes seiunctae copulentur, contusionesque ossis humeri, femorisque, ad capita eorundem progressae, cum amputatio minime videatur locum habere, sanentur.
- p.151. Quam rem confirmari testimonio Cl. BOUCHER, qui ex 165 hominibus grauiore contusione quassatis ne vnum quidem periisse affirmat.
- p.175. Hinc traduntur varii modi, quibus membra contusa restitui queant. Cum gangraenae suspicio est, iubet partes incidi, obstructas solui, pus moueri, myrrhae, salis armoniaci, nitri, camphorae puluerem inspergi, digeren tia epithemata adhiberi. Atque, vt hanc rationem commendet et amputationem etiam in contusionibus vasa maiora soluentibus improbandam esse arguat, exemplis vtitur militum sauciorum, sine amputationis auxilio hoc modo sanatorum.
- p.189. E medicamentis laesorum ossium damnantur ea, quae acidae ac causticae naturae sunt, laudantur myrrha, mastix, balsamum peruuiianum, oleum caryophyllorum. Appendicis loco accedit silua observationum, quibus indubitatum relinquatur, ossium fracturas periculossimas, et molliorum partium vulnera grauissima, citra vllius amputationis auxilium, felicissime persanari posse.

XX.

Noua physico-medica.

Regia scientiarum Societas Gottingensis in conuentu, nuper die decimo tertio nouembris anni superioris 1762 habito, declarauit, secretarii sui munus contulisse in Cl. MURRAY; porro Cl. LOUIS,

LOUIS, Chirurgiae Professore Parisiensem in extraneorum numerum retulisse; insuper Cl. IOANNEM VLRICUM BILGUER, M. D. cuius modo meminimus, et qui ex tribus illis huc usque fuit, qui copiarum Borussiae summam habent curam chirurgicam, et Cl. WAGLER, Profectorem haectenus theatri anatomici Gotingensis, nunc vero Brunsvigam, ut anatomen ibi doceat, euocatum, inter eos, quibuscum litterarum habet commercium, *Correspondentes* dictos, se recepisse.

Propter belli tunc temporis adhuc perdurantis calamitates, quaestio ad obtinendum premium primi ordinis pro eodem anno 1762 non oblata fuerat ab Illustri illa societate. Nunc autem illud argumentum *de insectis lucentibus*, suo tempore a nobis commemoratum *), praesenti, quem agimus, anno 1763 ex ipsius voluntate manere debet praefixum.

Nouam insuper, mathematici potissimum argumenti quaestionem anno 1764 dirimendam Ill. haec societas doctorum virorum exhibet inuestigationi: ut nimirum determinetur, quidnam excelsorum montium vis attractrix conferat ad mutandam grauitatis directionem, insimulque modus per tentamina hanc rem inuestigandi ipsaque, si fieri possit, tentamina declarentur. Ante primum diem septembris anni cuiuslibet Ill. Societati tradi debent commentarii, de quibus suum illa publice feret iudicium proximo tunc subsecuturo die decimo nouembris. Praemium, uti constat, in numo aureo quinque et viginti ducatorum pretii consistet.

Neque in iam dicto conuentu quaestionibus oeconomicis praemia adiudicare hac vice potuit Ill. socie-

*) vid. Comment. nostr. Vol. X. P. II. p. 369.

societas. Vnam igitur omnino grauem *de agrorum communione* *) ad diem decimum nouembris huius anni 1763 denuo offert duplicato praemio, viginti quatuor scilicet ducatorum; alteram vero *de ouium cultura in prouinciis Hanoueranis emendanda* sub initium iulii eiusdem anni publice diiudicandam, nuper iam proposuit **). Huius thematis dissertationes ante primum diem iunii, illius autem ante primum octobris, societati vel ipsius secretario debent esse traditae.

Neque *Berolinensis* scientiarum et Elegantiorum Litterarum academia superiore anno 1762 gauisa fuit oportunitate adiudicandi praemium solutae quaestioni *de auditus theoria, habito respectu ad modum, quo perceptio soni efficiatur ex ratione interioris structurae auris* ***). Interim certo alicui anno iterum praefigere hanc thesin noluit Ill. Academia, sed illud potius cepit consilium, vt, quocunque demum tempore ipsi super hac materie offeratur commentarius expectationi ipsius satisfaciens, huic quoque promissum attribuat praemium.

Lugduni Gallorum quae condita est scientiarum, Elegantiorum Litterarum Artiumque Academia praemio aurei numi trecentorum pondo gallicorum ad annum 1764 proposuit hanc quaestionem: *Qualis nimirum est nociua ista vis, quam aer contrahit in nosocomijs carceribusque? Et quodnam remediorum istam corrigentium datur optimum?* Quum varia iam quidem machinarum genera, quibus aerem ventilando emendarent, viri docti excogitauerint, illa vero omnia ex
Ill.

*) Comment. nostr. Vol. X. P. II. p. 370.

**) ib. p. 371.

***) ibid. Vol. X. P. I. p. 179.

Ill. Academiae sententia non communis vsus esse soleant, ea nunc hanc materiem exhibet hoc fine, velint eruditi nouo studio omnique industria in noxiam istam aeris qualitatem non solum inquirere, sed auxilia quoque ad illius correctionem iam inuenta vel perfectiora reddere vsuique communi magis accommodata, vel aliud nouum detegere, quod vsu facilius, simplicius minusque carum sit, locorumque amplitudini, in quibus aer renouari debeat, facile aptari queat. Commentarii ideo, vel gallice, vel latine conscribendi, ad Ill. Academiae secretarium, Cl. BOLLIOUD - MERMET, vel Ill. Praesidem DE FLEURIOU, vel AIME DE LA ROCHE, Academiae bibliopolam, mitti debent, solutis antea impensis cursus publici, ante primum diem aprilis anni iam subsecuturi 1764, paulo post die S. LUDOVICI nomini festo publice diiudicandi.

Regia Scientiarum, Inscriptionum et Elegantiorum Litterarum Academia *Tolosana* quaestioni de aggeribus, quo irruenti flumini resistent, optime extruendis praemium assignauerat quadruplicatum. Reportarunt illud superiore anno 1762 viri coniunctis viribus hanc materiem pertractantes, Reuer. nimirum abbas BOSSUT, Maceriis constitutus Mathematicum Professor Regius et Academiae scient. Regiae correspondens, et Cl. VIALLET, qui pontium et viarum publicarum in Campania curam habet secundo loco. (*Sous - Ingénieur des ponts et chaussées*).

Praemium, cuius nuper meminimus *), ab Academia *Louaniensi* illi adiudicandum, qui dissertationem de arthritide optime exaratam ipsi tradiderit, ex ipsius iudicio meruisse legimus Virum Cl.

IOAN-

*) v. Comment. nostr. Vol. X. P. III. p. 554.

IOANNEM PHILIPP, Med. D. Medicum Spadanum
in Episcopatu Leodiensi et Reg. scientiarum Aca-
demiae Monspeliensis Socium correspondentem
dictum.

In concione illa publica, quam superiore anno
1762 habuit Imperialis Scientiarum Academia *Pe-
tropolitana*, de praemiis non nullis, olim propositis,
decreuit. Quod illam attinebat quaestionem *de re-
fractione radiorum lucis*, ad annum 1760 iam relatam,
ne hac quidem vice expectationi suae factum fuisse
satis Ill. Academia intellexit. Voti itaque sui ite-
rum non compos facta, spem fere omnem abiecit,
ideoque hanc materiem ulterius proponere noluit.

Secunda quaestio *de cometarum perturbationibus*
a duobus viris illustribus ita soluta fuerat, vt dubia
esset academia, vtri palmam attribueret. Praemii
itaque partitionem inter vtrumque auctorem esse ne-
cessariam iudicavit. Illud reportarunt ALEXIUS
CLAIRAUT, Geometra in Academia Parisiensi Re-
gia celeberrimus, et IOANNES ALBERTUS EU-
LER, Regiae Berolinensis Academiae Socius, vter-
que vir magnam sui nominis famam laudesque ex
merito adeptus.

Simili fere ratione idem accidit circa quaestio-
nem *de perficiendis tubis opticis*, cui quidem argu-
mento a IOANNE DOLLANDO, Anglo, per ipsam
praxin satisfactum fuisse videtur, cuius vero theo-
retica valde eximia explicatio a Viro Cl. SAMUEL
KLINGENSTIERNA, Vpsaliensi Professore Princi-
pumque Regionum Sueciae Praeceptore, Ill. Aca-
demiae exhibita, huius ipsius applausum ita meruit,
vt ea ipsi praemium adiudicaret. Facile tamen fieri
potuisset, vt et huius praemii partitionem illa de-
cre-

creuisset. Mathematicus enim ille Berolinensis clarissimus, quem modo nominasse satis erit, LEONHARDUS EULER, egregiam de eodem argumento dissertationem, qua lentium constructionem *Dollandianae* similem docuit, cum Ill. Academia communicauerat, quam Ill. vero Auctor ad certamen admitti debere negauit, sed Commentariis Academicis inferendam voluit. Quum inuenti tamen gloria illum ex merito aequae participem esse, ac Cl. DOLLAND, Ill. Academia iudicauerit, vtramque ideo dissertationem, et *Klingenstiernianam* et *Eulerianam* simul edere constituit.

Quaestio insuper praemio ad annum 1763 promissa *de metallorum fusione* *) nuper iam a nobis commemorata, ex Ill. Academiae voluntate eidem esse debet praefixa. Nouam denique ab eadem in annum 1764. propositam quaestionem legimus, quae ita se habet: *Per obseruationes nimirum et experimenta explicare, quomodo propagatio plantarum, quae a botanicis classi cryptogamicae annumerari solent, filicum, muscorum, fungorum proceat? Virum a reliquarum plantarum propagatione differat; et utrum inter plantas eodem modo, ac inter quaedam animalia, dentur species, quae prorsus diuersa a reliquis ratione propagentur?* Praemium pro cuiuslibet quaestionis solutione optima consuetum, aureorum scilicet, quos vulgo ducatos vocant, centum, sub conditionibus satis notis exhibebitur merenti suo tempore, circa quod potissimum illud obseruari debet, ne dissertationes post primum diem iunii cuiusque anni perueniant Petropolin et Ill. Academiae tradantur.

Petro-

*) De hac et reliquis supra commemoratis quaestionibus Petropolitanis vid. Comment. nostr. Vol. X. P. I. p. 181.

Petropoli porro relatum habemus, quod post obitum Imperatoris PETRI tertii, medicus ipse et archiater, Ill. MOUNSAY, ab hoc quidem munere, tamen honeste eaque cum gratia dimissus fuerit, ut annuo mille numorum vncialium stipendio fruatur. In Scotiam, quae ipsi erat patria, eum reuersum esse legimus.

Potentissimae insuper Imperatricis, CATHARINAE secundae, ad quam Russici Imperii summa nunc delata est, medicos iam constitutos esse percipimus Viros Illustres, GUYON, KRUSE et SCHILLING, Actualium, qui dici solent, Consiliariorum Status titulis ac honoribus condecoratos, quorum omnium saepius iam in commentariis nostris meminimus.

Quae *Halae Magdeburgicae* floret, Academia Cl. ANTONIUM LOUIS, Regium Physiologiae in scholis Chirurgiae Professore Parisiensem, librorum Censorem et exercitui pot. Galliae Regis in Germania a salubribus consiliis, paulo supra iam commemoratum, inter doctores medicos sui ordinis ideo retulit, ut publicum daret documentum, quanti praeclara ipsius de arte medendi merita aestimet.

Ill. NICOLAUM (NILS) ROSEN, Med. Doct. et Professore Upsaliensem, Sereniss. Suecorum Regis Imperiique Suecici Archiatrium *), anno iam huius seculi quinquagesimo sexto a Ser. Rege suo in equitum imperii ordinem receptum fuisse, olim quidem iam perceperamus. Quum is ipse tamen iam vera meritorum laude conspicuus, nec elogio vel titulo, neque insignibus nobilitatis hactenus uteretur,

*) v. Comment. nostr. Vol. V. P. IV. p. 725.

retur, nouum illud decus a se deprecatum illum fuisse, nos iudicantes, ideo tum temporis in commentariis nostris illius rei mentionem facere volebamus. Honos autem ille ipsi nuper denuo confirmatus est, adeo vt Ser. Regi ipsi ornamentum et nominis et insignium eligere placuerit. Appellatur is itaque nunc NICOLAUS ROSE'N A ROSENSTEIN; insignia vero, quibus vtitur, haec sunt: Lapis ad monumenti similitudinem formatus, coronam regiam ferens, rosa spinosa in quouis latere comitatus. Occasionem praebuit lapis iussu Ser. Sueciae Reginae, LOUISAE VLTRICAE, ad fontem soterium *Locka* positus, quo posteros doceat, eum fonti huic contigisse honorem, vt Regem, qui diu vehementi laborauerat cephalalgia, aquae et sedimenti vsu sanaret.

In locum secretarii sui, vita defuncti, Cl. HAWKSEY, nuperrime die februarii quarto huius anni 1763 Reg. scientiarum societatem *Londinensem* surrogasse legimus Virum inter doctos nomen consecutum, DA COSTA, natione Iudaeum, eiusdem societatis huc vsque iam socium.

Tubingae anno superiore 1762 die septembris decimo quinto Professoris medicinae extra ordinem docendae munus auspicatus fuit Cl. DAVID MAU-CHART, M. D. BURCHARDI DAVIDIS, celebris illius Medici ac Professoris Tubingensis anno 1751 iam mortui, filius, simulque dissertationem publice defendit *de therapia purpurae, receptiori, tutiore et solidiore*, quam in euitandis remediis diaphoreticis fortioribus, potius vero in vsu diureticorum, nitri potissimum squillaeque, cum diluentibus, positam esse perhibet.

Argentorati anno superiore die duodeuicesimo iunii viuere desiit Vir Cl. IOANNES IACOBUS SACHS, Phil. et Med. D. Praxeos Clinicae Prof. Publ. Ord. Capituli Thomani Canonicus, Consiliarius et Archiater Hassio - Darmstadiensis, aetatis annum agens septuagesimum sextum.

In *Erfurtensi* porro perantiqua vniuersitate hoc anno 1763 die ianuarii vicesimo tertio diem obiit supremum Vir Cl. IOANNES HIERONYMUS KNIPHOF, Vniuersitatis p. t. Rector Magnificus, M. D. Facultatis Medicae Senior et Assessor Primarius et p. t. Decanus, Collegii Sanitatis Assessor, Pathologiae et Praxeos Prof. Publ. Ord. S. R. I. Academiae Nat. Curios. Adiunctus et Bibliothecarius.

De quo, Anatomiae et Chirurgiae Professoris munus inter nos ex merito nuper nato IOANNE GODOFREDO IANCKE, sibi gratulabatur Vniuersitas nostra *Lipsiensis*, de eiusdem praematura nimis morte nunc queritur eamque deplorat. Quanti ipsius, de re anatomica in primis, fuerint merita et quam singulare in excolenda anatome studium, non nullis et antea et tum temporis, cum susciperet nouum munus, editis dissertationibus satis comprobauit. Nuper enim, die octobris primo superioris anni 1762, vt locum ipsi nunc in ordine medicorum competente obtineret, dissertationem *de foraminibus caluariae eorumque usu* publice defendit, altero autem die post, illam ipsam anatomes et chirurgiae publice docendae prouinciam adiit, habita oratione *de anatomiae praeslantia eiusdemque profitendae et docendae potestate*, editoque eum in finem programme *de ratione venas corporis humani angustiores in primis cutaneas ostendendi*, quae dissertatio vtraque certum omnino dat testimonium, non solum haud facile

facile aliquid reperiri posse, quod ipsi in anatomes cultura fuerit incognitum, sed illum ipsum ad amplificandos huius artis limites quasi fuisse natum. Sed largiores studii sui et industriae fructus nobis suppeditare ipsi, proh dolor, non licuit. Sub exitum enim anni acuta febre correptus, primo huius anni mense eiusque die vicesimo occubuit sui que nobis desiderium reliquit, triginta tantum septem annorum aetatem consecutus. Paulo vberioremem vitae eius cum laude actae memoriam proxime cum lectoribus nostris communicabimus.

Post ipsius obitum a Ser. nostro Rege Viro Cl. IOANNI CHRISTOPHORO POHL, Phil. et Med. D. et Physiologiae haëtenus Professore Publ. Ord. nunc Anatomiae et Chirurgiae Professoris Ordinarii munus, illud autem physiologiae Viro Cl. ERNESTO GOTTLÖB BOSE, Phil. et Med. D. et Botan. Professore Publ. nuperrime demandatum est.

Prouincia tandem Professoris Anatomiae et Chirurgiae Extraordinarii per b. IANCKIUM, is cum Anatomiae Professor Ordinarius constitueretur, nuper vacua facta, tum temporis tradita fuit Viro Cl. CAROLO CHRISTIANO KRAUSE, Phil. et Med. D. Facultatis Medicae Assessori, Collegii minoris Principum Collegiato, qui illam quoque iam adiit superiore anno 1762 die decembris vicesimo nono, publice habita oratione *de medicis diuinae sapientiae ac prouidentiae testibus*, eumque in finem edito programme, quo A. C. CELSI *de re medica libros quatuor posteriores emendauit*.

Haud incelebrem illum chirurgum Londinensem, IOANNEM DOUGLAS, cuius librum *) de hydrocele

Zz 3

olim

* v. Comment. nostr. Vol. VI. P. IV. p. 692.

olim recensuimus, et qui ipsum in multas cum ciuibus suis deduxit controuersias, anno iam 1759 obiisse *Londini*, nuper legimus.

Qui nominis non solum, sed meritorum quoque veritatis, iam dudum consecutus fuerat laudem ac immortalitatem, HERM. BOERHAAVE. Medicus ille Leydenfis nec elogio, neque marmoreis indigebat monumentis: tale ipsi tamen recte posuerunt ciues Lugdunenses Bataui, ut esset indicium grati piique animi, merita et intelligentis et iustis praemiis cohonestantis. Positum illud fuit *Lugduni Batauorum* in templo d. *Petri* nomini sacrum anno superiore 1762. Simplex esse legimus atque laetamur ideoque magni illius viri genio conuenientissimum. Vnam basi ex nigro marmore excusae insistentem repraesentat, variis figuris, emblematicis ex albo marmore fictis, circumdatum. Ipsius simul BOERHAAVII senis imago conspicitur cum ipsius symbolo: *Simplex sigillum veri*. Inferiori autem margini eiusdem lateris inscripta leguntur haec verba: *Salutifero BOERHAAVII Genio Sacrum*; alii vero margini: *Natus die 31 Decembr. 1668. Denatus die 23 Septembr. 1738.*

De itinere illo, in incrementum historiae naturalis museique regii *Taurinensis* Viri Cl. BARTOLI, Regii *Antiquarii* titulo cohonestati, curae traditi a Viro Cl. VITALIANO DONATI, in prouincias orientales ante aliquot annos suscepto, iam suo tempore ad lectores nostros retulimus *). Dubii huc usque de fati docti illius viri, nunc laetamur, quod in publicis certe relationibus *Taurino* allatis legimus iter suum adhuc continuare illum virum, vltimasque litte-

*) v. Comment. nostr. Vol. VII. P. II. p. 366.

litteras ab ipso Taurinum missas, *Bassora ex Arabia, deserta* dicta geographis, scriptas esse mense nouembri 1761. Ad littora Malabariae iam iam ipsum proficisci existimant Taurinenses.

Memoria CAROLI FRIDERICI HVNDERT-MARKII, Philosophiae et Medicinae Doctoris, Anatomiae et Chirurgiae P. P. O. in Academia Lipsiensi, Ordinis Medici Adsefforis, Acad. Nat. Cur. et Regiae Scientiarum Holm. et Instituti Bononiensis Socius.

In vniuersa ingeniorum humanorum censura quaeri potest, vtrum maiori laude digni sint, quibuscum vulgo dicitur nata esse facultas quaedam excellens, coniuncta cum singulari animi propensione, an hi potiores videantur, qui, si non tardi ad discendum sunt, certe non celeres habent ingenii motus, nec quidquam nisi multa industria efficiunt. Vtrumque genus sua bona habet. Namque liberalitate naturae recte uti, atque ad aliorum vtilitatem transferre, quod tibi velut praecipuo amore concessum sit, id magnam sane et probitatis et honestatis laudem meretur: dono autem si quis aliquid acceperit, non est, cur se magnopere iactet, atque alios adeo contemnat. Sed quis non videt, haud paulo maiorem esse eorum admirationem, quibus doctrina aut scientia multo labore constitit, cum flectere ingenium durum, aut cogere etiam inuitum, maius sit omni illa scientia, quae facile inhaesit, aut sua velut sponte venit. Igitur illa naturalis facultas habeat fortasse celeritatis laudem maiorem, in vniuersum studio vel similis est effectus, vel minor modo discendi subtilitate, tempore et patientia. Ac mirum est,

Z z 4

quam

quam fallax sit naturalis illius boni iudicium, cum saepe numero naturae facultati tribuatur, quod vel parentum cohortatio effecit, vel exemplum doctoris, vel coeca auersatio alius disciplinae, cuius bonaparum cognita erant: in quo quidem bonus ille labor solus summis gratiis dignus est, adiutus fortasse opinione, vndecumque orta. HUNDERTMARKIUS, cuius vitam recensere hoc loco constituimus, siue impetu naturali ad medicinam delatus est, siue excitatus paterno exemplo adiit, siue cogitato venit, tamen veram assiduitatis laudem consecutus est, quem scimus nihil omisisse, quo aut comparari posset aut augeri accurata et laudabilis doctrina.

Patria ei contigit *Ciza*, non ignobilis vrbs, vbi a. 1715. d. 11 aprilis editus est, et pater, HENRICUS ELIAS HUNDERTMARKIUS, qui eum ex MARIA MAGDALENA GEBLERIA genuit, medicus Cizensis ciuitatis, vltra quinquaginta annos medicina facienda clarum nomen consecutus. In quo quidem agnoscimus natalium felicitatem, quod parente videndo audiendoque amorem medicinae concepit et aluit, certe, quod maximi semper fecit, intuitus est exemplar non contemnendum, ad quod ipse animum effingeret. Sed quomodo hoc effecerit, quibus tamquam gradibus deinceps ad medicinam adscenderit, et quantam ceperit accuratae doctrinae laudem, per partes breuiter exponemus. Parens igitur, qui mature sciret puerilem aetatem litteris imbuendam esse, praestantiam earum ac laudem filio velut e longinquo ostendit, iussitque viam inire, quae ad eas ferret. Duxerunt eum primum domestici praeceptores, WAGNERUS et TELLIUS, mox Cizensis gymnasii Rector, BERNHARDUS, cui duodecennis traditus est. Post sex annos Lipsiam se contulit, cognitisque philosophiae et matheseos doctrinis in schola STUBNERI, MULLERI,

RICH-

RICHTERI et HAUSENII, adiunctaque studiorum humanitatis disciplina praeceptore MENZIO, et historiae cognitione, quam IOECHERUS tum profitebatur, non inutilem operam nauauit exteris quoque linguis, quibus sciret ad excellentissimorum librorum lectionem aditum patefieri. Ita ergo parato animo et maturus fuit ad medicinam transitus, et certa spes consequendae doctrinae, quae sine tali ordine utilis esse nequit. Assidue secutus est omnes, qui tum cum laude medicinam tradiderunt, SCHACHERUM, WALTHERUM, PLATNERUM, HEBENSTREITIUM, QUELMALZIUM, quorum memoria nobis est sanctissima, PLAZIUM, nunc quoque celebrem apud nos medicum, CRELLIUM denique, qui postea Helmstadium discessit. Quibus omnibus vt eodem nomine deuinctus fuit, ita praecipuum amorem debuit SCHACHERO et WALTHERO, quorum singulari humanitate consiliisque multum confirmatus est et adiutus: patuit enim HUNDERTMARKIO domus eorum, schola, bibliotheca et pectus. Tum vero in CRELLII amicitiam singularem se insinuauit, cui cum doctrina HUNDERTMARKII et animus multis documentis probatus esset, hunc potissimum sibi voluit socium aegrorum curandorum adiungere. His omnibus bene actis muniit sibi anno 36 aditum ad medicinae honores summos, petendo Baccalaureatu: sequenti anno Magister philosophiae creatus est. Ad patrem non ita multo post rediit, apud quem intellexerat paratam esse praeclaram medicinae faciendae occasionem, estque eo duce aliquamdiu assidue exercitatus. Lipsiam redux inauguratus est medicinae Doctor anno 40 defensa ante disputatione *de singulari usu frictionis et unctionis in curatione morborum*. Ab hoc tempore multum profuit academiae docendo, ciuitati arte facienda, nec immerito ciuium laude

exterorumque approbatione dignus iudicatus est. Cooptavit eum Academia Nat. Cur. Reg. Scient. Soc. Holm. et Institutum Bonon. Socium. Nec defuere domestica praemia et ornamenta, primum amor et fiducia aegrorum, deinde praecipua laus ex chemiae assiduo studio, tandem, quae his maiora sunt, publica munera. Anno enim 48 medicinae Professor extraordinarius electus est, deinde in ordinem medicorum Assessor adscitus: anno autem 54 physiologiae, mox anatomiae et chirurgiae ordinaria Professio ei demandata est. Quae singulis occasionibus scripta eius prodierunt, ea catalogo infra posito inseruimus. Rector Academiae semel fuit. Quibus omnibus muneribus, ut diximus, utiliter et cum laude functus est ad finem usque vitae. Sed anno 60 attentatus est morbo, qui viscera eius affecta esse perspicuo signo indicabat, quem tamen aliquanto post superavit, ut videretur pristinae valetudini restitui posse, certe ad negotia consueta rediit. Nihilominus subinde infestus corpori humor in visceribus collectus tantopere auctus est, ut vehementiae morbi anno 62 succumbere cogeretur. Nobis quidem eius memoria, etsi cum desiderio coniuncta, semper erit iucundissima.

Scripta a b. HUNDERT MARKIO edita.

Exercitatio de principibus Diis artis medicae tutelaribus apud veteres Graecos atque Romanos ad Virum Clariss. IOSEPHUM DU PONT. Lips. 1735. 4.

Theses ex omni philosophia decerptae. Resp. *Henric. a Stein.* ibid. 1736. 4.

Disp. de incrementis artis medicae per expositionem aegrotorum apud veteres in vias publicas et templa. Resp. *I. B. Carpzouio*, ibid. 1739. 4. c. tab. aen. eadem dissertatio deinde recusa prodit in-
scriptione libri singularis, ibid. 1749. 4. c. tab. aen.
Disp.

Disp. inaug. pro gradu Doctoris: de singulari usu frictionis et vnctionis in curatione morborum, ibid. 1740. 4.

Exercitatio academica de sacchari Saturni usu interno salutari, in qua simul varia chemiae capita illustrantur, ibid. 1741. 4.

Progr. de sulphuris anodynæ specie ex vini vitriolique oleis commixtis oriunda. ibid. 1748. 4.

Disp. de mercurii viui et cum salibus varie mixti summa in corpus humanum vi atque efficacitate eiusque cum sulphure laxius vel arctius coniuncti virtute in idem nulla, Resp. *Frid. Conr. Bergmann.* ibid. 1754. 4. *Huic dissertationi in eodem anno nouus praemissus fuit titulus, quo vocatur Liber singularis,* ibid.

Disp. de enemate vterino, Resp. *Io. Godofr. Neu-hoff.* ibid. 1755. 4.

Disp. de osteo-steatomatis casu rariore, Resp. et Auct. *Frider. Iac. Tittmann.* ibid. 1757. 4. c. f.

Progr. de ozaena venerea, ibid. 1758. 4.

Disp. de scabie artificiali, Resp. *Christ. Gottl. Zieger.* ibid. 1758. 4.

Disp. de vrina cretacea, Resp. *Samuel Pilling.* ibid. 1761. 4.

XXI.

Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1760 prodierunt.

HENR. FRID. DELIUS, Diss. inaug. exhibens animaduersiones nonnullas ad partum faciliorem spectantes, Resp. *Ioan Frider. Brackenhoefferus.* Erlang. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de malis ex medico nimis cunctatore oriundis, Resp. *Christ. Philip. Herwig.* ibid. 4.

GEORG.

GEORG. CHRISTOPH. DETHARDING, Diff. inaug. de chorea S. Viti. Resp. *Gerh. Henning. Stieler*, Rostoch. 4.

Essai sur la generation de la Chaleur dans les animaux traduits de l'Anglois de ROBERT DOUGLAS. 2 Paris. 12.

Manuel Physique, ou Maniere courte et facile d'expliquer les Phenomenes de la Nature par DU FIEU, à Lyon. 8.

Recherches sur les différens Mouvemens de la Matière Electrique par M. DUTOUR. a Paris, 12. c. tab. aen.

BALTH. EHRHARTS *oekonomische Pflanzenhistorie, nebst den Kern der Landwirthschaft, Garten- und Arzneykunst*, 8ter und 9ter Band, Ulm und Memmingen. 8. Voll. 2.

R. ABR. ELEASARIS *uraltet chymisches Werk, mit gehörigen Figuren, Gefäßen, Oefen, Vorrede, Schlüssel fremder Wörter und einige Regeln von dem Steine der Weisen durch I. G. SCHWARZENBURGICUM*, Leipz. 8.

Traité de l'Education corporelle des Enfans en bas-âge, ou Reflexions pratiques sur les moyens de procurer une melleure constitution aux Citoyens; par M. DES ESSARTS, a Paris, 12.

PHILIP. CONR. FABRICII *zwote Sammlung einiger medicinischer Responsorum und Sectionsberichte*, Helmstädt. 8.

Eiusd. Diff. inaug. de nephritide, Resp. *Ioan. Frid. Salfeld*. ibid. 4.

Eiusd. Progr. quo obseruata quaedam in corpore puellae variolis defunctae communicat, ibid. 4.

IO. FRID FASELIUS, Diff. inaug. de absorptione, Resp. *Franc. Petr. Emcken*. Ien. 4.

Eiusd. Progr. I. II. III. IV. V. VI. VII. de vracho. ibid. 4.

IOAN. BAPT. DOMINIC. FINCK, Diff. inaug. de officio medici circa torturam. Erforf. 4.

IOAN. BERN. FISCHER, de senio eiusque gradibus et morbis. Editio secunda, aucta ibid. 8.

A Discourse on the nature, causes and cure of Corpulency; Illustrated by a remarkable Case, read before the Royal Society November 1757 and now first published by MALCOLM FLERAYNG. London. 8.

Memoires sur les Os, pour servir de Réponse aux Objections proposées contre le sentiment de M. DU HAMEL DU MONCEAU, rapporté dans les Volumes de l'Academie Royale des Sciences; avec les Memoires de M. M. HALLER et BORDENAVE, qui ont donné lieu à ce travail par M. FOUGEROUX a Paris. 8.

GEORG. ALBERT. FRIED, Diff. inaug. de foetu intestinis plane nudis extra abdomen propendentibus. Argentor. 4.

IOAN. HENR. FRIED, Diff. de iure obstetricum secundum statuta Argentoratensia. Portio II. ibid. 4.

Risposta in difesa del Dottore CARLO GANDINI alle nuove accuse contro di esse publicate in tre Libri, che senza il loco nome hanno dato alla luce li Signori GIAN-ANTONIO VANUCCI e GIUSEPPE ANTONIO ISOLA. In Lucca, 8.

Introduction a la Connoissance des Plantes, ou Catalogue des Plantes usuelles de la France; avec les caracteres distinctifs, suivant le Systême de M. TOURNEFORT; les propriétés d'après la pratique des plus sçavans Médecins, et les usages qu'en fait la Pharmacopée de Paris, pour les compositions officinales. On y a ajouté une notice abrégée des Drogues étrangères; par M. GAUTIER, a Avignon. 12.

STEPHAN FRANZ GEOFFROY. *Abhandlung von der Materia medica oder von der Kenntniß, der Kraft, der Wahl und dem Gebrauch einfacher Arzneimittel. Erster Theil von den Fossilien: aus dem Lateinischen übersetzt. Nebst einer Vorrede D. CHRISTIAN GOTTLIEB LUDWIGS, Leipz. 8.*

CAROLUS ABRAH. GERHARD, *Diss. inaug. sistens disquisitionem physico chemicam granatorum Silesiae et Bohemiae, Francof. ad Viad. 4.*

IOAN. GESNER, *Diss. Phytographiae sacrae generalis Pars Practica prior, Tiguri. 4.*

IOAN AUGUSTIN. PHIL. GESNER, *Diss. inaug. sistens sciagraphiam de acrium in corpus humanum agendi modo. Erlangae, 4.*

PHIL. FRIDER. GMELIN, *Diss. inaug. de transpiratione cutanea hominis sanitatis praesidio, morborum causa et victrice. Resp. Jac. Andr. Weber, Tübingae. 4.*

Eiusd. *Otia botanica, quibus in usum praelectionum academicarum definitionibus et observationibus illustratum reddidit prodromum Florae Leidensis ADRIANI VAN ROYEN, qui plantas terra marique crescentes methodo naturali digessit, ibid. 4.*

Formulae medicinales cum indice virium, quo ad inuentas indicationes inveniuntur medicamina in usum medicorum praxin inchoantium editae a IOAN. DE GORTER. Francof. et Lipsiae. 4.

Traité sur les effets des préparations de Plomb et principalement de l' extrait de Saturne, employé sous différentes formes et pour différentes maladies chirurgicales. Tome Premier, par M. GOU-LARD: a Pezenas et a Montpellier, 12.

Remarques et Observations pratiques sur les Maladies Veneriennes, avec une seconde édition des Maladies de l' uretre, et la composition des Bougies spécifiques pour guerir les embarras de ce
con;

conduit et autres Formules nouvelles et très-utiles pour le traitement des Maladies Veneriennes par M. GOULARD. Tome Second. *ibid.* 12.

GODOFR. CHRISTOPH. GREINER. meditationes physico chemicae sistentes terrae motum per spiritum mineralem demonstrabilem, Lips. 4.

Bibliotheca regni animalis atque lapidei, seu recensio auctorum et librorum, qui de regno animali et lapideo methodice, physice, medice, chymice, philologice vel theologice tractant, in usum naturalis historiae studiosorum conscripta et edita a LAURENTIO THEODORO GRONOVIO, Lugd. Bat. 4.

Die Eisgebürge des Schweizerlandes, beschrieben von GOTTL. SIEGM. GRÜNER I. 2. 3 Band, Bern, 8. Voll. 3.

IOAN. GUTSLEFF, Diss. inaug. de catharro suffocatio in morbis acutis malignis, Halae 4.

ANTONII DE HAEN theses, sistentes febrium diuisiones, natamque ea de causa de miliaribus ac petechiis, ceterisque febrilibus exanthematibus dissertationem, Vindobonae, 8.

Eiusd, Pars tertia et quarta Rationis medendi in nosocomio practico, quod in gratiam et emolumentum medicinae studiosorum condidit MARIA THERESIA. Editio altera, *ibid.* 8. Voll. 2.

Die Naturgeschichte der Thiere in systematischer Ordnung. Die Vogelgeschichte: entworfen durch IOH. SAMUEL HALLEN. Mit Kupfern, zweyter Band, Berlin, 8.

Collection de Theses Medico-Chirurgicales sur les points les plus importants de la Chirurgie Theorique et Pratique, recueillies et publiées par M. le Baron de HALLER et redigées en Francois par M. * * * Tom. IV et V a Paris, 12. c. f. Voll. 2.

Dispu-

Disputationes ad morborum historiam et curationem facientes. Quas collegit, edidit et recensuit ALBERTUS HALLER. Tomi Septimi Pars I. Auxilia. Pars II priorum voluminum supplementum. Lausannae, 4 mai. c. f.

Eiusd. Elementa Physiologiae corporis humani. Tomus II. Sanguis, eius motus, humorum separatio. ibid. 4.

Eiusd. Orchidum classis constituta, (*Basileae*) 4.

Eiusd. Ad enumerationem stirpium Helueticarum emendationes et auctuaria. (*Bernae*) 4.

Eiusd. Enumeratio stirpium, quae in Heluetia rariores proueniunt (f. l.) 8 mai.

Memoires sur les Parties sensibles et irritables du corps animale. Tome. II. III. contenant les Experiences de plusieurs Anatomistes d'Allemagne, de France, d'Angleterre et d'Italie. ouvrage, qui sert de Suite aux memoires de M. DE HALLER. Tome IV. contenant les Reponses faites a différentes obiections par M. DE HALLER. a Lausanne. 12. Voll. 3.

Traité des Semis et Plantations des Arbres et de leur Culture; ou Methodes pour multiplier et élever les Arbres; les planter en massifs et en avenues; pour former des Bois et des Forets, les entretenir, retablir ceux, qui sont dégradés faisant partie du Traité complet des Bois et des Forets: par M. DU HAMEL DU MONCEAU. a Paris. 4. c. f.

CAR. FRIDER. HARSLEBEN, Diss. inaug. de cortice Winterano, Francof. cis Viadr. 4.

IOAN. HASENOEHL historia medica morbi epidemici siue febris petechialis, quae ab anno 1757 fere finiente, vsque ad annum 1759 Viennae grassata est, cui adiecta notabilium obseruationum anatomicarum decas. Vindob. 8.

IOH. ERNST HEBENSTREITS *Erklärung griechischer Wörter von Krankheiten des menschlichen Körpers. Neue Auflage, Leipz. 4.*

Oeuvres de M. HENCKEL, traduites de l' Allemand. Vol. I. II. a Paris, 4.

IOACHIM FRIEDR. HENCKELS *Siebende Sammlung seiner medicinischen und chirurgischen Anmerkungen, Berlin, 4.*

The Origin and Production of proliferous Flowers with the Culture at large for raising double from single, and proliferous from the double by I. M. HILL. The Second Edition. London. 8.

GEORG. CAR. HILLEFELD, Diss. inaug. experimenta quaedam circa venena, Gott. 4.

A Treatise of Husbandry on the Improvement of Dry and Barren Lands by THOMAS HITT. London, 8.

STEPH. D'HUAULME, Diss. non ergo motus vitales a nervis cerebelli. Resp. Cosm. Aug. Lezurier, Parisiis, 4.

IO. IAC. HUBER, Progr. sistens observationes aliquot anatomicas aliaque dictu necessaria, Cassel. 4.

NICOL. IOSEPH. IACQUIN enumeratio systematica plantarum, quas in insulis Caribaeis vicinisque Americis continente detexit novas, aut iam cognitatas emendavit, Lugd. Bat. 8.

Sciagraphia medica, d. i. Grundriß der Arzneykunst in 3 Theilen herausgegeben von L. CHRISTIAN IAHN, Dresden, 8.

A Treatise on Canine Madneß. By R. JAMES, M. D. London. 8.

GULIELM. IERVEY, Diss. inaug. de febrium symptomatibus et medela. Lugd. Bat. 4.

PHIL. IAC. IMLIN, Diss. inaug. de soda et inde obtinendo peculiari sale, Argentor. 4.

Traité des Dépôts dans le Sinus Maxillaire, des Fractures et des Caries de l'une et de l'autre Mâ-
Tom. X. Pars IV. Aa a choi-

choires; suivis de Réflexions et d' Observations sur toutes les operations de l' Art du Dentiste; par M. IOURDAIN, a Paris. 12.

— ISNARDS *heilsamer Unterricht, wie man Ertrunkenen auf die leichteste und sicherste Art wieder zum Leben helfen könne. Strasburg, 8.*

FRID. CHRIST. IUNCKER, Diss. inaug. de phthisi per operationem chirurgicam curanda, Resp. *Henr. Sam. Grotjan. Halae, 4.*

Compendium materiae medicae, quo simplicium medicamentorum descriptiones, historia, partes constitutivae, vires, usus, separata et praeparata explicantur, ad therapiam generalem b. IOAN. IUNCKERI accommodatum, editum a FRID. CHR. IUNCKER. Halae 4.

IOH. HEINK. GOTTL. VON IUSTI *fortgesetzte Bemühungen zum Vortheil der Naturkunde und des gesellschaftlichen Lebens der Menschen, 3tes Stück, Berlin und Stettin, 8.*

Eiusd. *Gesammlete chymische Schriften, worinnen das Wesen der Metalle und die wichtigsten chymischen Arbeiten von den Nahrungsland und das Bergwesen ausführlich abgehandelt werden. Erster Band, Berlin und Leipz. 8 mai.*

Eiusd. *Oeconomische Schriften über die wichtigsten Gegenstände der Stadt- und Landwirthschaft. Erster Band, ibid. 8 mai.*

CAROL. FRID. KALTSCHMIED, Progr. de necessitate partus caesarei instituendi in omnibus grauidis mortuis. Ienae, 4.

Eiusd. Diss. inaug. de cacochymia pituitosa. Resp. *Georg. Andr. Runge, ibid. 4.*

Eiusd. Diss. inaug. de saluatione mercuriali, ceu in dubio praeservationis et curationis remedio adversus rabiem caninam. Resp. *Inman. Aug. Frid. Bertram, ibid. 4.*

Eiusd.

Eiusd. Diff. inaug. sistens tympanitae pathologiam.
Resp. Ioan. Godofr. Bollmann. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de regimine grauidarum. Resp.
Ioan. Christ. Doering. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de putredine eiusque effectibus
in corpore humano. Resp. Ioan. Frid. Poppo
Büchner. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de intestinorum inflammatione
seu enteritide. Resp. Ioan. Conrad. Saelzerus, ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de haemorrhoidibus coecis. Resp.
Gottl. Henr. Christ. Baumann. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de cholera. Resp. Frid. Gotthold.
Durr. ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de genuina febres continuas cu-
randi ratione in vniuersum. Resp. Ioan. Conr.
Dencker. ibid. 4.

IOAN. CHRISTOPHILUS KEMME, Diff. inaug.
sistens genesin scirrhorum simplicium. Halae, 4.

FRID. LUDOV. KESSLER, Diff. inaug. de nonnul-
lis ad variolarum insitionem pertinentibus, ib. 4.

IAC. THEOD. KLEIN, *Verbesserte und vollständige
Historie der Vögel.* Danzig, 4.

Eiusd. *Vorbereitung zu einer vollständigen Vögel Hi-
storie, nebst einer Vorrede von der Ordnung der
Thiere überhaupt und einem Zusatz der Historie des
Murmelthieres, wie auch eines alten Wörterbuchs der
Thiere. Aus dem Lateinischen übersetzt durch D.
H. B. Leipzig und Lübeck, 8. c. f.*

Eiusd. *Natürliche Ordnung und vermehrte Historie der
vierfüßigen Thiere, herausgegeben von GOTTL.
REYGER.* Danzig, 4.

Eiusd. *Classification und kurze Geschichte der vierfüßi-
gen Thiere, aus dem Lateinischen übersetzt und mit
Zusätzen vermehret, nebst einer Vorrede von FRIEDR.
DANIEL BEHN.* Lübeck, 8. mit K.

Selectus rationalis medicaminum, quorum vera vis
est ad felicem praxin clinicam, praetermissis iner-

- tibus titularibus superstitionis, in titulis digestus studio LUD. GODOFR. KLEINII. Erf. et Lips. 8.
- IOAN. HIERON. KNIPHOFII Botanica in Originali s. Herbarium vivum, in quo plantarum tam indigenarum, quam exoticarum peculiari quadam operosaque enchiresi, atramento impressorio obductarum nominibusque suis ad methodum LINNAEI et LUDWIGII insignitarum elegantissima ectypa exhibentur opera et studio IOAN. GODOFR. TRAMPE. Centur. VII. Halae. fol.
- Pomologia, d. i. *Beschreibungen und Abbildungen der besten Sorten der Aepfel und Birnen, welche in Holland, Deutschland, Frankreich, Engeland und anderwärts in Achtung stehen, und deswegen gebauet werden: Beschrieben, nach dem Leben abgebildet und mit ihren natürlichen Farben erleuchtet, von IOH. HERMANN KNOOP; aus dem Holländischen in das Deutsche übersetzt, von D. GEORG. LEONH. HUTH, Nürnberg, fol.*
- IOAN. GUILIELM. KRETSCHMANN, Diss. inaug. de frigido in morbis sudore. Halae. 4.
- IOH. GOTTL. KRÜGERS *Gedanken von Erziehung der Kinder*, ibid. 8.
- IOAN. WOLFFG. KÜNSTEL, Diss. de salibus metallorum, praesertim auri et mercurii. Editio tertia recusa. Lips. 4.
- IOAN. MICH. KÜRSCHNER, Diss. inaug. de fonte medico Castinacensi, *von Kestenholzer Bad*, Arg. 4.
- BAPTIST LABATS *Reisen nach Spanien und Welschland; aus dem Französischen übersetzt von CARL FRIEDR. TROELTSCH, 5 u. 6. Band, Nürnberg. 8.*
- I. H. LAMBERTI Photometria siue de mensura et gradibus luminis, colorum, et umbrae, August. Vindelic. 8. c. f.
- MARTIN FROBEN. LEDERMÜLLERS *Microscopischer Gemüths- und Augenergötzung. Erstes Fünzig: mit Farben nach der Natur erleuchtet und in Kupfer*

Kupfer gebracht, von GEORG. PAUL NUSBIEGELN. (*Nürnberg*) 4. c. f.

An Introduction to Botany: containing an Explanation of the Theory of that Science, and an Interpretation of its Technical Terms, extracted from the Works of Dr. LINNAEUS, and calculated to assist such as may be desirous of studying that Authors Method and Improvements, with twelve Copper-Plates, and two Explanatory Tables; to which is added an Appendix; containing upwards of two thousand English Names of Plants, referred to their proper Titles in the Linnaean System; by JAMES LEE, London, 8 mai.

IOH. GOTTL. LEHMANN'S *Entwurf einer Mineralogie. Zweyte und vermehrte Auflage, Berlin.* 8.

IO. AUG. LIEBMANN, *Diss. inaug. de furore uterino.* Halae, 4.

WILH. VAN LIL, *Diss. inaug. de angina scirrhusa,* Lugd. Bat. 4.

FRANCISC. LINDENER, *Diss. inaug. de fame canina.* Hal. 4.

CAR. LINNAEI *amoenitates academicae seu dissertationes variae physicae, medicae, botanicae, antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tab. aen. Vol. V. Holmiae,* 8.

Eiusd. *Systema naturae per tria regna naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tom. I et II. Praefatus est IOAN. IOACH. LANGIUS. Ad editionem decimam reformatam Holmensem, Halae,* 8. Vol. 2.

Eiusd. *Disquisitio de quaestione ab Academia Imper. Scient. Petropol. in annum 1759 pro praemio proposita: Sexum plantarum argumentis et experimentis novis, praeter adhuc iam cognita, vel corroborare vel impugnare, praemissa expositione historica et physica omnium plantae partium, quae*

- aliquid ad foecundationem et perfectionem seminis et fructus conferre creduntur, ab eadem Academia die 6 Sept. 1760 praemio ornata. Petrop. 4.
Eiusd. Diff. Macellum olitorium. Resp. *Petr. Ierlin.* Holmiae, 4.
- Eiusd. Diff. Flora Belgica. Resp. *Christ. Fr. Rosenthal.* Vpsaliae, 4.
- Eiusd. Diff. Plantae rariores Africanæ. Resp. *Iac. Printz.* Holmiae, 4.
- IOAN. FRID. LOBSTEIN. Diff. inaug. de neruo spinali ad par vagum accessorio. Argent. 4. c. f.
- Meditationes de solido et fluido praelectae in Acad. Scient. Petropolit. conuentu publico die 6 Sept. 1760. Auctore MICHAELE LOMONOSOW. Petropol. 4.
- HIERON. LUDOLF, Diff. inaug. de vehiculis medicamentorum caute et conuenienter adhibendis Resp. *Ioan. Henr. Hoffmann.* Erford. 4.
- D. CHRIST. GOTTLIEB LUDWIG, definitiones generum plantarum olim in vsum auditorum collectas nunc auctas et emendatas edidit D. GEORG. RUD. BOEHMER. Lips. 4.
- Eiusd. Progr. de medendi methodo in praeternaturali viscerum abdominalium situ. ibid. 4.
- Eiusd. Diff. inaug. de celeri corporum incremento causa debilitatis in morbis. Resp. *Salom. Christoph. Iac. Locke,* ibid. 4.
- Eiusd. Progr. de celeri obesitate causa debilitatis in morbis. ibid. 4.
- Eiusd. Progr. de membrana epicrania et musculis in eam insertis. ibid. 4.
- EDUARDI LUIDII lythophylacii Britannici ichnographia: siue lapidum aliorumque fossilium Britannicorum singulari figura insignium, quotquot haftenus vel ipse inuenit, vel ab amicis accepit, distributio classica: scrinii sui lapidarii repertorium

rium cum locis singulorum natalibus exhibens. Additis rariorum aliquot figuris aere incisis; cum epistolis ad clarissimos viros de quibusdam circa marina fossilia et stirpes minerales praesertim notandis. Editio altera: novis quorundam speciminum iconibus aucta. Subiicitur Autoris praelectio de stellis marinis etc. (*oceanii Britannici, nec non de asferiarum, entrochorum et encrinorum origine*). Oxonii. 8.

Traité Anatomique de la Chenille, qui ronge le bois de Saule; par M. PIERRE LYONNET, à la Haye, 4 c.f.

GUILLIEL. MAC-NEVEN O KELLY AB AGHRIM. Diff. de raro ventriculi casu cum vera morbi diagnosi, Resp. *Francisc. Mitterbacher*. Pragae, 8.

The History of Health, and the Art of preserving it: or an Account of all that haas been recommended by Physicians and Philosophers, towards the Preservation of Health, from the most remote Antiquity to this Time. To which is subjoined a succinct Review of the principal Rules relating to this subiect, together with the Reasons on which these Rules are founded: by JAMES MACKENZIE. The third Edition. To which is added a short and clear Account of the Commencement, Progress, Utility and proper Management of Inoculating the Smal-pox, as a valuable Branch of the Prophylaxis. Edinburgh, 8.

STEPH. MADIER, Diff. de strumis. Monspellii, 8.

Descriptio de vera florum existentia, vegetatione et forma in plantis dorsiferis, siue epiphyllispermis, vulgo capillaribus a D. IO. FRANCISC. MARATTI Abb. *Vallumbrusano*. Romae, 8. c. tab. aen.

LUDOV. RENAT. MARTEAU, Quaest. med. ergo in herniis intestinalibus etiam cognita prolapsi intestini laesione operatio celebranda. Parisiis, 4.

De osseis tumoribus observationes. Auctore ANTONIO MATANI, Pistorii, 8.

PAUL. ALB. FRID. MATTHAEI, Diff. inaug. de hydrop. ascite. Gott. 4.

IOAN. FRID. MAUTT. Diff. inaug. de cortice peruuiano. Lugd. Bat. 4.

A short Introduction to the Knowledge of the Science of Botany: explaining the Terms of Art made use of in the Linnaean System. Illustrated with five Copperplates exhibiting the Characters of the Genera; by PHILIP MILLER. London. 8 mai.

The Gardeners Kalendar: directing what Works are necessary to be performed every Month in the Kitchen, Fruit and Pleasure-Gardens, as also in the Conservatory and Nursery; by PHIL. MILLER. The twelfth Edition. London. 8. c. f.

Essai sur l'Hydropisie et ses différentes espèces; par M. MONRO, le fils. Traduit de l'Anglois sur la seconde Édition et augmenté de notes et d'observations par M. SAVARY. a Paris, 12.

GERARD. ANDR. MÜLLER, Diff. inaug. exhibens syllogen observationum quarundam anatomiarum, imprimis de cisterna lumbari ductuque chyli-fero. Resp. *Ge. Boesefleisch. Giessae*, 4.

Parere del Dottore PIER-ANTONIO NENCI intorno le acque stagnanti delle Colmate per rapporto all'Insalubrità della Valdinevole, in Firenze, fol.

The Chimicale Works of GASPARD NEUMANN, by WILLIAM LEWIS. London. 4.

ERN. ANTON. NICOLAI, Diff. inaug. de irritatione. Resp. *Henr. Christ. Helwig. Ienae*, 4.

Eiusd. Progr. quo demonstratur, quod calor corporis humani non oriatur ex attritu fluidorum. ib. 4.

Eiusd. Progr. III. IV. V. de genuina arthritidis notione. Ienae, 4.

Eiusd. Diff. inaug. sistens genuinam cachexiae indolem et naturam. Resp. *Io. Henr. Christophor. Schencke*, ibid. 4.

Eiusd. Progr. I. II. III. exponens rationem structuræ quarundam auris partium, ibid. 4. Eiusd.

Eiusd. Diss. inaug. de obstructione mesenterii, vt causa multorum, variorum morborum. Resp. Io. Laur. Fr. Aug. Krumm. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de caloris febrilis effectibus, Resp. Ernest. Godofr. Baldinger. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de acrimoniae in corpore humano existentis actione, causis et effectibus. Resp. Theophol. Christophor. Forst. ibid. 4.

ADAM NIETZKI, Diss. de tincturae alcalinae martialis praeparatione, usu medico et praerogatiua prae aliis tincturis alcalinae indolis. Resp. Κωνσταντίνος Θεοδώρ. Ζουπάρ. Halae, 4.

Eiusd. Diss. de martiali terra foliata nitri, eiusque liquore. Resp. Ioan. Gutsleff. ibid. 4.

L' Existence de Dieu, démontrée par les Merveilles de la Nature, en trois Parties, ou l' on traite de la Structure du Corps de l' Homme, des Elemens, des Astres et de leurs divers effets, par BERNARD NIEUWENTYT. Nouvelle Edition, a Amst. 4.c.f.

Lettres sur l' Electricité dans le quelles on soutient le Principe des effluences et affluences simultanées contre la doctrine de M. FRANKLIN, et contre les nouvelles pretentions de ses Partisans, avec figures en taille douce par M. l' Abbe NOLLET. Premier et Seconde Partie, a Paris, 12. *Prima pars iam 1754 prodiit, et noua huius editio nihil vel mutati, vel adiecti continet; altera vero pars noua nec antea unquam impressa.*

I. AUG. OEHME *expediter Feldchirurgus, welcher lehret, wie man bey feindlichen Occasionen die mancherley Arten der Blessuren hurtig verbinden, auch die gewöhnlichsten Krankheiten gewissenhaft curiren kann; in 2 Theilen vermehrt herausgegeben. Dresd. u. Leipz. 8.*

FERD. CHRISTOPH. OETINGER, Diss. cinnabaris exul, redux in pharmacopolium, se publico examini sistens. Tubingae, 4.

Oeuvers Metallurgiques de M. JEAN CHRISTIAN

ORSCHALL, contenant 1) l'Art de Fonderie, 2) un Traité de la Ligation; 3) un Traité de la Maceration des Mines. 4) Le Traité de trois Merveilles; traduit de l'Allemand. a Paris, 12.

IOH. PALFIN *chirurgische Anatomie oder genaue Beschreibung der Theile des menschlichen Körpers, mit nützlichen und denen Wundärzten in Ausübung ihrer Kunst dienlichen Anmerkungen, herausgegeben von A. PETIT. Neue ganz veränderte und mit einer neuen Abhandlung von den Knochen vermehrte Ausgabe. Mit vielen Kupf. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von D. GEORG. LEONH. HUTH, Frankf. und Leipz. 4.*

PETR. SIM. PALLAS, Diss. inaug. de infestis viventibus intra viuentia. Lugd. Bat. 4.

IOH. ALBERT. PALM, Diss. inaug. de resorptione intestinali. ibid. 4.

Dictionnaire de Physique portatif, dans le quel on expose les decouvertes le plus interessantes de NEWTON et les notions geometriques necessaires a ceux, qui veulent se former vne idée de la Physique moderne. Seconde Edition par le Pere AIME HENRI PAULIAN, a Avignon. 8.

IOAN. HENR. PFUTSCH, Diss. inaug. sistens fontes praedictionum in morbis. Lips. 4.

IANI PLANCI Ariminensis, de conchis minus notis liber: cui accessit specimen aestus reciproci maris superi, ad littus portumque Arimini. Editio altera, duplici appendice aucta Rom. 4. c. tab. aen. 24.

ANT. GUIL. PLAZ. Diss. inaug. sistens therapiam per iucunda. Resp. *Christ. Frid. Baumeister*. Lips. 4.

Plantarum Americanarum fasciculus decimus, continens plantas, quas olim CAROL. PLUMIERIUS detexit eruitque atque in insulis Antillis ipse depinxit. Has primum in lucem edidit, concinnis descriptionibus et observationibus aeneisque tabulis illustravit IOAN. BURMANNUS. Amstelod. et Lugd. Bat. fol.

IOAN. IAC. POITEVIN, Or. de colica Pictonum.
Parisiis, 12.

Essai sur les Affections vaporeuses de deux Sexes, contenant une nouvelle methode de traiter ces maladies fondée sur des observations par M. LE POMME, le fils, a Paris, 12.

I. H. POTT *Sendschreiben an den Herrn Bergrath von IUSTI, in welchem die Einwürfe, die er in seinen wieder aufgelegten chymischen Schriften dem Herrn POTT gemacht hat, erörtert und abgefertiget werden.* Berl. 4.

Observations on the Nature and Consequences of Wounds and Contusions of the Head, Fractures of the Skull, Concussions of the Brain, etc. By PERCIVALL POTT. London. 8.

Mélanges de Chirurgie, par M. CLAUDE POUTEAU. à Lyon. 8. c. f.

Kurze theoretische und practische Abhandlungen von venerischen Krankheiten, worinnen gezeiget wird, wie man alle dergleichen Krankheiten mit und ohne Salivation sicher und geschwind aus dem Grunde heilen könne; mit einigen höchstnöthigen Cautelen und Erinnerungen zum Nutzen derer Chirurgorum und Anfänger aufgesetzt von F. T. R. Dresden, 8.

The Method of treating Gun-shot Wounds. Second Edition: by IOHN RANBY. London, 8.

Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe: zur Erkenntniß des Zusammenhanges der Welt, des Schöpfers und unser selbst vorgestellt von HERRMANN SAMUEL REIMARUS. (Hamburg) 8.

IOAN. GEORG. ROEDERER, Progr. sistens observationes de ossium vitiis. Gotting. 4.

Eiusd. Progr. de taenia, ibid. 4.

Eiusd. Progr. de morfu canis rabidi sanato, ibid. 4.

Eiusd. Progr. I et II. de arcubus tendineis musculorum originibus, ibid. 4.

IOSEPH.

JOSEPH. LUD. ROGER, Specimen physiologicum de perpetua fibrarum muscularium palpitatione, nouum phaenomenon in corpore humano experimentis detectum et demonstratum, Gött. 4.

A Dissertation on the Use of Sea Water in the Diseases of the Glands, particularly the Scurvy, Jaundice, Kings Evil, Leprosy, and the Glandular Consumption. Translated from the Latin of RICHARD RUSSEL. To which is added a Translation of Dr. SPEED'S Commentary on Sea-Water. As also an Account of the Nature Properties, and Uses of all the remarkable Mineral-Waters in Great-Britain: by an Eminent Physician. The fourth Edition revised and corrected. London, 8. c. f.

FRANCISC. ROISSIER DE SAUVAGES, Diss. de suffusione Resp. Petr. Lud. Guillemard. Auenione. 4.

Eiusd. Diss. opposita argumentis Cel. EBERHARDI de animae imperio in corpus humanum, Resp. Ioan' Iac. du Pont. Auenione, 4.

Eiusd. Diss. de amblyopia. Resp. Franc. Bourdon. Monspeli. 4.

SAM. SCHAARSCHMIDS *Abhandlung vom Receptschreiben oder Anweisung zur ordentlichen Verschreibung derer Arzneymittel.* Halle, 8.

Der Gichtschwam mit grünschleimigen Hute, beschrieben und mit 5 Kupfertafeln ausgemahlten Abbildungen erläutert von IAC. CHRIST. SCHAEFFER. *Regensb.* 4.

Eiusd. Epistola ad Societatem litterariam Duisburgensem de studii ichthyologici faciliiori ac tutiori methodo; adiectis non nullis speciminibus, vna cum tabula aeri incisa figuras coloribus suis distinctas exhibente. *ibid.* 8 mai.

Eiusd. Botanica expeditior, genera plantarum in tabulis sexualibus et vniuersalibus aeri incisis exhibens, *ibid.* 8 mai.

IOH. GOTTL. SCHAEFFERS *Haus- u. Reiseapotheke.* *ib.* 8.

IOAN. GEORG. SCHENCKBECHER, Diss. inaug. de febre stomachica intestinali. Argent. 4.

IOAN.

IOAN. SCHEUCHZER. Diff. inaug. de alimentis
farinaceis, Lugd. Bat. 4. c. f.

Tractatus chemici duo: 1) de sale vrinae humanae
natiuo. 2) de calcis viuae actione in salem volati-
lem alcalinum Auctore IOAN. ALB. SCHLOS-
SER, nunc denuo typis mandati. Harlingae, 8.

CASIM. CHRISTOPH. SCHMIDEL, Diff. inaug.
de lungermanniae charactere. Resp. *Christophor.*
Andr. Pauer. Erlang. 4. c. f.

GOTTL. NATHAN. SCHRADER. Diff. inaug. de
anagallide, Halae, 4.

Observationum rariorum ad rem medicam et obste-
triciam spectantium fasciculus Imus collectus ab
HERM. HENR. CHR. SCHRADER. Guelpherb. 8.

Betrachtungen der versteinerten Seesterne und ihrer Theile
abgefaßt von CHRIST. FRIEDR. SCHULZEN.
Nebst einigen Kupferblättern, Warschau u. Dresd. 4.

IAC. LUDOV. SCHURER, Diff. inaug. num in cura-
tione suffusionis lentis crystallinae extractio depo-
sitioni sit praeferenda? Argentor. 4.

IOAN. ANT. SCOPOLI Flora Carniolica exhibens
plantas Carniolae indigenas, vt distributas in classes
naturales, cum differentiis specificis, synonymis, lo-
cis natalibus, nominibus incolarum, observationi-
bus selectis, viribus medicis. Viennae, 8 mai.

IOAN. ANTON. IOSEPH. SCRINCI tractatus de
fontibus soteriis Toeplensibus in regno Boemiae
atque eorum praestantissimo sale, nec non usu in
diuersissimis affectibus morbosis. Aug. Vindelic. 8.

Idem libellus praecedenti vero paullo contractior,
germanice quoque prodiit eodem et loco, et anno. 8.

LUDOLF. GOTTFR. SCHWARZ. Diff. inaug. sistens febris
malignae ideam generalem, Argentor. 4.

IOAN. AUG. CAR. SIEVERS. Diff. inaug. de mor-
bis, qui a diuersis aeris constitutionibus originem
petunt in genere. Helmst. 4.

Quaestiones medicae Parisinae. Ex bibliotheca GEO.

FRID. SIGWART. Fasciculus II. Tubingae 4.
(*Dissertationes hic fasciculus complectitur, quae 1743
Parisiis impugnatae fuerunt*).

CORNEL. SLINGERLAND. Diss. de noxis ex abusu
cibi et potus frigidi. Lugd. Bat. 4.

GEORG. WILH. STEIN, Diss. inaug. de signorum
graviditatis aestimatione. Gotting. 4.

A practical Treatise on Fevers by Dr. STEVENS.
London. 8.

MICH. GREGOR. STEVENS, Diss. inaug. de quin-
que partibus medicinae. Lugd. Bat. 4.

IOAN. GEORG STOCKAR *de Neuforn*, Diss. inaug.
de succino in genere et speciatim de succino fos-
sili Wisholzensi. Lugd. Bat. 4 mai.

ANT. STOERK libellus, quo demonstratur: cicutam
non solum usu interno tutissime exhiberi, sed et esse
simul remedium valde utile in multis morbis, qui
huc usque curatu impossibiles dicebant. Vindob. 8.

Idem liber, in germanicam aequae ac gallicam linguam
versus, prodiit, prior Frf. et L. 8. posterior Paris. 12.

Description abrégée des Maladies, qui regnent le plus
communément dans les Armées avec la methode
de les traiter par M. L. B. VAN SWIETEN. a Paris 12.

Idem liber germanice redditus prodiit eodem anno
Tiguri. 8.

Traité de la Peripneumonie traduit du Latin des
Aphorismes de BOERHAAVE, commentes par M. le
Baron VAN SWIETEN, avec un Discours Prélimi-
naire par M. PAUL. a Paris 12.

J. F. THYM, *die Practic des Seidenbaues bestehend in 3
Theilen: 1) die Wartung der Maulbeerbäume; 2) die
Wartung der Seidenwürmer; 3) die Zubereitung
der Seide, Berlin, 8.*

THEOD. GERH. TIMMERMANN. Diss. inaug. de
inflammatione vteri cum subiuncta obseruatione,
de vteri sarcomate. Resp. *Christoph. Henr. Böttger.*
Rintellii, 4.

Essai sur l'Histoire Oeconomique des Mers Occidentales de France, par M. TIPHAIGNE, a Paris, 8.
(*Varia continet physici argumenti*).

S. A. D. TISSOT *Versuch von den Krankheiten, welche aus der Selbstbefleckung entstehen. Aus dem Lateinischen übersetzt, Frankf. und Leipzig, 8.*

L'Onanisme ou Essai physique sur les Maladies produites par la Masturbation, traduit du Latin de M. le Dr. TISSOT, augmenté d'Additions fournies par l'Auteur, avec un Discours moral sur le même sujet par M. D*** Partie I. II. a Lausanne, 12.

Nob. Illustr. I. G. ZIMMERMANN, de morbo nigro, scirris viscerum, cephalea, inoculatione, irritabilitate, cum cadauerum sectionibus, S. A. D. TISSOT. ibid. 12.

IOAN. DAN. TITIUS Progr. de diuisione animalium generali. Witembergae, 4.

Eiusd. Diss. inaug. vestigia fluxus et refluxus in mari Baltico praesertim ad Viistulae ostium.. Resp. Adolph. Iul. Bose, ibid. 4.

IOAN. VLRIC. TOGGENBURGER Diss. sistens casum stuporis scabiei inoculatione curati. Argent. 4.

Histoire et Phenomenes du Vésuve, exposes par le Pere DOM IEAN MARIE DELLA TORRE. Traduction de l'Italien par M. l'Abbe PETON. a Paris, 12.

Parere del Dottor GIOVANNI TOZZETTI sopra l'utilita della Colmate di Bellavista per rapporto alla salubrita della Valdinievole, in Firenze, fol.

Vsus Opii salubris et noxius in morborum medela, solidis et certis principiis superstructus a BALTH. LUD. TRALLES. Sectio III. Vratislauiae. 4.

IOAN. EBERH. TRAMPPEL, Diss. inaug. sistens ingressum theoriae medicae in praxin, praemisso carmine de variis medicinae sectis. Gotting. 4.

DAN. WILH. TRILLER Progr. de vino modico hypochondriacis salutari ad sacrum locum I Timothy. V, 23. non nihil illustrandum Witteberg. 4.

Ana-

Analisi d'alcune Acque medicinali de Modonese di
DOMINICO VANDELLI. in Padoua, 8.

Journal de Medecine, Chirurgie, Pharmacie par M.
VAN DER MONDE. Janvier - - December 1760
Tome XII. XIII. a Paris, 8. Voll. 2.

FRANCISC. VIGAROUS, Quaestiones medicae duodecim
pro Regia Cathedra vacante defensae, Monspeli, 4.

EGBERT. PHILIP. VAN VISVLIET, Diss. inaug.
de frigore febrili. Lugd. Bat. 4.

RUDOLPH. AUG. VOGEL historia materiae medi-
cae ad nouissima tempora producta, Erf. et Lips. 8.
(*Editio quidem auctior et emendatior, sed false, dicitur*).

Ei. Diss. inaug. sistens animaduersiones super mor-
bis incurabilibus. Resp. Ioh. Guill. Ganssen. Goett. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de humeri amputatione ex arti-
culo. Resp. Petr. Henr. Dahl. ibid. 4.

Eiusd. Diss. inaug. de nitro cubico. Resp. Io. Gehrt.
ibid. 4.

Eiusd. *Neue medicinische Bibliothek. Des vierten Ban-
des viertes Stück.* ibid. 8.

GEORGII VON WELLING Opus mago-caballisticum
et theosophicum, darinne der Ursprung Natur,
*Eigenschaft und Gebrauch des Salzes, Schwefels und
Mercurii in 3 Theilen beschrieben und nebst sehr vielen
sonderbaren mathematischen theosophischen, magischen,
und mystischen Materien, auch die Erzeugung der Me-
tallen und Mineralien aus dem Grunde der Natur erwie-
sen wird, sammt den Hauptschlüssel des ganzen Werks
und vielen curieusem Mago-caballistischen Figuren.
Deme noch beygefüget ein besonderer Anhang etlicher
sehr rarer und kostbaren chymischen Piecen. Andere
Auflage, Erf. und Leipz. 4.*

IOAN. GUILIELM. WERNER. Diss. quae causam, cur
homines semel tantum variolis veris et morbillis
corripiantur, adumbrat. Resp. Andr. Ioan. Orlo-
vius, Regiomonti, 4.

Me-

Memoria IO. GOTTLÖB. KRÜGERI, Med. et Phil.
D. et Pr. Publ. Ord. Brunswigae die 6 Octobr. 1759
defuncti a IO. CHRIST. WERNSDORFIO, Helmst. 4.

A'Kisded Gyermeknek nevelésekről való rövid Ok-
talas, mellyben elől adatik miképen kellesték azok-
kal banni Születésektől fogva három Efztendős,
korokig. Hozza-adattak a' végén az Egésségnek Fen-
tartására, 'Es a' Hoszszu Eletnek megnyerésére tar-
tozó Szükséges Regulak. WESZPREMI, ISTVAN. Med.
Dr. által. Kolo' fvaratt. 8. (i. e. *Brevis institutio
educationis infantum: in qua proponitur, qua ratione
infantes ab ipso partu ad tertium usque annum edu-
cari debent, cui sub finem adiunctae sunt necessariae re-
gulae ad sanitatem tuendam et senectutem acquirendam
per STEPHANUM WESZPREMI. Claudiopol. 8*);

IO. HENR. WINKLER. Progr. qua ratione frige-
scant corpora in coelo frigido, Lipsiae, 4.

*Abhandlung vom Opio oder Mohnsafte, auf praktische
Bemerkungen gegründet durch GEORG. YOUNG.
Aus dem Englischen übersetzt. Bayreuth, 8.*

Libellus singularis de podagra et dolore colico, scor-
butico simili, Pictonico aemulo, per sex annos
durante, subito in podagram mutato, victo et cu-
rato; Auctore THEOD. VAN ZELST. Lausan-
nae, 8. (*nova Editio*).

IOH. VERARD. ZEVIANI *neu entdeckte Quellen von
den Prognostiken oder Vorhersagungen des Erfolgs in
Krankheiten. Aus dem Italienischen übersetzt, Leipz. 8.*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΟΥΠΙΑΝ, Diss. inaug.
de pulsuum differentiis simplicibus, Halae, 4.

IOAN. FRID. ZÜCKERT, Diss. inaug. de morbis ex
alieno situ partium thoracis. Francof. ad Viadr. 4.

IO. RUD. ZWINGER. Diss. de irritabilitate iridis hinc-
que pendente motu pupillae. Resp. Io. Rud. Müll-
ler, Basileae, 4.

Contenta in hac parte.

1. Noua Acta physico-medica Academiae Naturae curiosorum. Tom. II.	P. 579
2. POMME, Essai sur les Affections vaporeuses de deux Sexes	611
3. WALLERII Animaduersiones chemicae ad ictum fulminis cet.	619
4. HILLARY, Obs. on the Changes of the Air cet. in the Island of Barbados	622
5. TILLET, Diff. sur la cause qui corrompt et noircit les grains de bled dans les epis	632
6. ALBINI academiarum annotationum Lib. V.	645
7. Florae Danicae iconum fasciculus primus	647
8. SCHAEFFERS, <i>der Eulen-Zwitter</i>	649
9. Noui Commentarii Acad. Scient. Petropolitanae, Tom. V. et VI.	651
10. WILSON, Observations on a series of Electrical Experiments	660
11. BOERHAAVE, Prael. acad. de morbis neruorum	666
12. STEVENS, Practical treatise on Fevers	687
13. ARDUINI Animaduersionum botanicarum specimen	692
14. GATAKER, Account of the Structure of the Eye cet.	694
15. ISENFLAMM, de spiritu in morbis	696
16. BUTINI, lettre sur la cause de la non - pulsation de veines	702
17. PLAZ Diff. de therapia per iucunda	710
18. EIUSDEM Diff. de therapia per iniucunda	712
19. BILGUERS <i>Abhandlung von dem sehr seltenen Gebrauch des Ablöfens der menschlichen Glieder</i>	714
20. Noua physico-medica	716
21. Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1760 prodierunt	732



I N D E X.

A.

- A**ceti vsus 583
 Acidorum in angina
 inflammatoria noxa 259
 Ackermann, Io. Frid. in acad.
 Kiloniens. Prof. Med. ex-
 traord. 182
 Adolph, Io. Traugott, Progr.
 quo capsam Petitianam,
 pluribus cruris complicate
 fracti casibus aptandam,
 proponit cet. 123
 Aeris qualitates 94 seqq. co-
 lor 606 effectus in plantis
 476 grauitas et temperies
 478 seq. densi in corpus
 humanum effectus 95 seq.
 243 seq. inclusi elasticitas
 245 adhaesio et vibratio
 247 particularum hetero-
 genearum effectus 248
 impuri in corpus huma-
 num actio 250
 Aetherem vitriolicum pa-
 randi methodus 394
 Aetitis lapidis descr. 602
 Agouti descr. 316
 Albini B. S. academicarum
 annotationum liber quin-
 tus 643
 Alcalium fixorum species
 195 seq.
 Alkekengi calyce profunde
 diuiso, fructu sicco, de-
 scriptio 651
 Amputatio membrorum re-
 pudianda 714 seqq.
 Anableps piscis species 58
 eius descriptio 59 seqq.
 Anatomico - pathologicae
 demonstrationes 503
 Anginae distinctio et causae
 258 inflammatoriae cura-
 tio 259
 Anguigena serpentis genus
 55 sq.
 Anguillae in aceto et glutine
 farinaceo repertae 418
 Anhelitus quid? 105
 Animalium diuisio genera-
 lis 74 sq. generatio 222 sq.
 vegetatio 224 quadrupe-
 dum et reptilium euiscera-
 ratio et a corruptione
 praeseruatio 320 sq. cru-
 staceorum conseruatio
 323. Animal extra vterum
 editum cur respiret? 107
 Antherarum pulueris fabri-
 ca 470 applicatio ad sti-
 gma 472
 Antimonii distinctio 354
 Aphronitrum 350
 Apoplexia sanguinea defun-
 cti sectio 163 seq.
 Aquae dulcis ex aqua marina
 destillatio 142. Aqua me-
 tallica vulneraria u. marina
 per vitrum non percola-
 tur 387 sq. aquarum mine-
 raliu impregnatio di-
 uersa 493
 Arborum incrementum 482
 in terra cultura 284 sq. in
 pomariis cultura 289 plan-
 tatio 290 sqq. conifera-
 rum seminum maturitas
 288
 Arduini, Petr. animaduer-
 sionum botanicarum speci-
 men 692
 Argenti porositas 233 spe-
 cies 343. 351 docimasia et
 minerae 455
 Arsenici characteres 447 sq.
 Arteriarum actio 507. 702
 Bb b 2 599

- sqq. arteriae asperae fa-
 brica 92
 Arthritidis differentia et
 symptomata 176. 680 sq.
 curatio 177 sq.
 Ascites vomitu sanata 203
 Astroitarum ab asteriis di-
 stinctio 64
 Atmosphaerae calor in Ge-
 orgia 150
 Atramentum sympatheti-
 cum, experimenta super
 illo 407
 Augurelli Io. Aurel. vitae
 descriptio 530 sqq.
 Auium euisceratio et con-
 seruatio 319
 Auri docimasia 453 sq. po-
 rositas 232 sq. ponderis et
 ductilitatis causa 233 in
 mineram mutatio negata
 343 affirmata 351
 Auris abscessus curatio
 391 seq.
 Auriuillii Diff. de naribus
 internis 532
 Azygos vena duplex 405
 B.
 Balani species 155 sqq.
 Ball, Io. the modern Practi-
 ce of Physic 251
 Barberet Diff. sur le rapport
 qui se trouve entre les phe-
 nomenes du tonnerre et
 ceux de l'electricité cet 171
 Belluae marinae maximae
 descriptio 584
 Benvenuti, Ioseph, riflessione
 sopra gli effetti del' moto
 a cavallo 35 morborum
 historias editurus est 374
 van Berkhey, Io. le Francq.
 expositio characteristica
 florum qui dicuntur com-
 positi, 70
 Bernensis societ. theses et
 praemia ad an. 1762. 366
 Berolinensis reg. scientiar.
 acad. theses et praemia
 179. 718
 Bezoar mineralis generatio
 604
 Bilguers, Io. Ulr. *Abhandlung
 von dem sehr seltenen Ge-
 brauch oder der beynabe
 gänzlichen Vermeidung des
 Ablöfens der menschlichen
 Glieder* 714 Idem societ.
 reg. Gottingenf. correspon-
 dens 717
 Bismuthi distinctio 354 do-
 cimasia 461
 Bituminum distinctio 40
 Blasiae algae generis chara-
 cter 119 sq.
 Boerhaave, Herm. praele-
 ctiones, academicae de
 morbis neruorum Tom.
 I et II. 666 seqq. Eidem
 a ciuitate Lugdunensi mo-
 numentum positum 726
 Bose, Ernest. Gottlob. Phy-
 siologiae Prof. P. O. Lipf.
 725
 Bossi, Georg. Matth. me-
 moria 376
 Bossut ab acad. reg. scient.
 Tolosan. praem. accep. 719
 Botanica in originali 227
 botanicarum animaduert-
 tionum specimen 692 bo-
 tanicae obseruationes 657
 Boum luis causa 594 inocu-
 latione praecauenda 135
 Braun, I. A. Diff. de admi-
 rando frigore artificiali,
 quo mercurius est conge-
 latus 212
 Butini lettre à Charles Bon-
 net sur la causa de la Non-
 Pulsation des veines 702
 Buzo-

Buzouienſis academia con-	membranae 669 ſq. fun- gum
dita 182	curatio 589
C.	Chalybis fragilitatis cauſa
Calculi, biliarii 136	234
veſicae	Chemica experimenta 591
vrinariae laterali opera-	Chloroſeos cauſa et curatio
tione extracti 139 ex vre-	672
thra exciſi 495 ſq. calcu-	Chyli viae 393
lus veſicae fundo adhae-	Cineres clauellatos calci-
rens 522	nandi methodus 206
Caloris in corpus humanum	Cinnamomi et Caſſiae cha-
effectus 249 extraordina-	raſter et differentia 158
rii effectus 134	ſeq. corticis collectio, ib.
Caluet Spirit. Claud. Fran-	Clairaut Alex ab acad. ſcient.
ciſc. Diſſ. de arthritide 176	Pettop. praemium acc. 720
Camperi Petr. demonſtra-	Coati deſcript. 314 ſq.
tionum anatomico patho-	Cobalti examen 462 genera
logicarum liber I. 503	344 354
Cantus a loquela differentia	Cocchii, Anton. morbus,
117	mors et ſectio anatomica
Capitis morbus ſingularis	165 ſqq.
280 ſq.	Cocci ſuecicae deſcriptio
Capreae campeſtris gutturo-	197
ſae cornubus nec ramiſis	Colicae pictonum ſympto-
nec deciduis deſcriptio	mata et curatio 627 ſq.
655	Conchae anatiferae ſpecies
Capſa Petitiana cruris fractu-	155 margaritiferae natu-
ris aptanda 124 ſq.	ra 204 ſq.
Carbonum foſſilium origo	Conchyliorum a corruptio-
526. 529	ne praerſeruatio 325
Carduelis plumis deſtituta	Conuulſionum et tetani cu-
597	ratio 275 cauſae vniuer-
Caries frumentorum quomo-	ſales 403 effectus ſingula-
do coercenda? 642 ſq.	res 148 Conuulſio ſaluta-
Caſſiae et Cinnamomi cha-	ris 595 conuulſiui motus
raſter et differentia 158	a vermibus 133. 153 ſq.
Caſtoris deſcriptio 311 ſq.	Corallia ex fundo maris ex-
Le Cat, Claud. Nicol. a Re-	trahendi modus 326
ge Gall. eques factus 373	Cordis morbi 280
Cataractae cauſa 388 ſq. eam	Coronae ſolis marinae ame-
extrahendi methodi 197.	ricanae, inſecti generis, de-
518 ſq.	ſcriptio 155
Cauiae deſcriptio 316	Da Coſta, ſociet. reg. ſcient.
Cephaleæ ſymptomata et cu-	Londinenſ. ſecreterarius
ratio 268	723
Cerae uſus 589	Co-
Cerebri motus 400. 402	Bb b 3

- Costarum corporis humani
diuersitas 79 muscoli le-
uatores 84 depressores 85
- Crocodili sceleti fossilis de-
scriptio 145. 153
- Culicum coitus 407
- Cuniculi Indi descriptio 295
pumilionis salientis cauda
longissima descr. 655 sq.
- Cupri distinctio 352 sq. po-
rositas 233 docimasia 458
lutei vis magnetica 152
- D.
- Danicæ Floræ iconum fa-
sciculus I. 647
- Dendritarum ortus 343
- Diaphragmatis actio 87. 99
nerui et vasa, ib sq.
- Diarrhoea defunctæ sectio
279 sq.
- Docimastica ars 432 eius
operationes et producta
442
- Douglas, Io. obitus 726
- Duræ matris morbi 669 sq.
- Dysenteriae verae sympto-
mata 408 sqq. causæ et
curatio 411 sqq. 629
- E.
- Echini descriptio 296
- Electricitatis actio et céleri-
tas 174 sq. vsus in para-
lysi II. 130. 146. 486 po-
sitiuæ et negatiuæ distin-
ctio 17. 21 sqq. 396. ex-
perimenta circa eam 484.
498. 585. 660 sqq.
- Elephantiasis symptomata
632 sqq.
- Empyematis operatio 487 sq.
- Encephali morbi 676 sq.
- Encrini descriptio 66
- Entrochorum descriptio 16.
23
- Epilepsiae curatio 580
- Equitationis effectus 35 sq.
- Erfordienſis ſcientiar. vtil.
acad. theſ. et præm. ad
an. 1762. 368
- Erinacei descriptio 296 sq.
- Erucae pernicioſæ descri-
ptio 649 sq.
- Essay on the autumnal dysen-
tery 408
- Euler, Io. Alb. ab acad.
ſcient. Petropol. præ-
mium acc. 720
- Exſpiratio actio voluntaria
eſt 101 sq. quibusnam vi-
ribus perficiatur? ib. eius
effectus 103 species 104
- F.
- Fabricii, Phil. Conr. zweyte
Sammlung einiger medici-
niſchen Reſponſorum und
Sektionsberichte* 160
- Falconet Camill. obitus 374
- Febrium diſtinctiones 688
intermittentium curatio
275 sq. malignarum cauſ-
ſæ 690 febris continuæ
arthriticæ et rheumaticæ
ſymptomata et curatio
274 putridæ bilioſæ
ſymptomata et curatio
624 sq. lentæ neruoſæ
cauſſæ et ſymptomata
253 sq. prognos et cura-
tio 255 sq.
- Femoris animalis os foſſile
134
- Fermentationis animalium
et vegetabilium analogia
364
- Ferrariæ ſpecies et chara-
cter 587 sq.
- Ferri ſpecies 353 docimasia
459 sq. poroſitas 233 vsus
in chloroſi 683
- Fletus cauſa 106
- Floris origo 221 compoſiti
deſi-

- definitio 70 calycis et corollae differentia 71 partes sexuales 72
 Foliorum ortus 219
 Fomentorum in variolis vsus 513
 Fossilium characteres generales et classes 338 sq. 346
 nouum genus Zeolites dictum 349
 Frigoris causa materialis 238
 effectus in corpus humanum 249 frigus insolitum Torneae obseruatum 211
 artificiale, quo mercurius est congelatus 212 sqq.
 Frumenti morborum causae 636 sqq. caries quomodo coercenda 642 sq.
 Fulminis actio et celeritas 174 sq. materies 621 sq. effectus 494. 619 odoris sulphurei causa 175 sq.
 Funiculi umbilicalis deligatio neglecta 162
 G.
 Ganglii curatio 586
 Gangraena in variolis 517 sq. eius in vulneribus curatio 714 sq.
 Gataker, Thom. account of the structure of the Eye with occasional remarks on some disorders of that organ 694
 Gemellarum descriptio 593
 Gemmae plantarum ortus 220
 Generationis definitio 217 principia 225
 Glaciei a grandine differentia 239
 Glafer, Io. Frid. a societ. scientiar. Gottingens. praemium accepit 181
 Gliris descriptio 304 sq.
 Gmelin, Phil. Frid. otia botanica 37
 Gottingensis reg. scientiar. societ. thes. et praem. ad an. 1763 et 1764. 369 sq. 717 sq.
 Grandinis duritiei causa 237 a glacie differentia 239 formatio, ib. seqq. magnitudinis, figurae et coloris diuersitas 241 sq.
 Grauelii, Io. Phil. obitus 373 memoria 563
 Guyon Imperatoris Russ. medicus et consiliarius status 372. 722
 H.
 Halensis Flora 356
 v. Haller, Albert. Elementa physiologiae corp. hum. Tom. III. 78
 Du Hamel du Monceau de semis et plantations des arbres et de leur culture 282
 Heluetii, Io. Claud. Hadr. alogium 6 sq.
 Hepatis induratio 267
 Hillary, William. obseruationes on the changes of the air and the concomitant epidemical diseases, in the Island of Barbados 622
 Histoire et memoires de l'academie royale des sciences de Paris année 1755. 3. naturelle generale et particuliere avec la description du cabinet du Roi, Tom. VIII. 295
 Hoadly and Wilsons obseruationes on a series of electrical experiments 660
 Bb b 4 Hol-

- Holmiesium aquarum examen 203
Hundertmark, Carol. Frid. Diss. de vrina cretacea 359
Eius obitus 557 memoria et scripta 727 sqq.
Hybridarum plantarum existentia 473
Hydrargyrum vid. Mercurius.
Hydropis curatio 276 hydropoe defuncti sectio 579 sq.
Hypochondriaci mali curatio 613
Hysterici mali causa et curatio 611. sq.
I.
Jancke, Io. Gottfr. anat. et chirurg. Prof. P. O. Lips. 558 eius obitus 725
Jasmini species 596 sq.
Jibicis imberbis descriptio 654 sq.
Ichthyologici studii methodus faciliior et tutior 543
Infanticidiorum inuestigatio 161 sq.
Inflammabilium mineralium genera 341. 351
Insectorum a corruptione praeferuatio 324 insecta frumentorum morbos producentia 639 sqq. insecti volitantis per os et alium infantis excretio 582
Inspirationis causae 98 sqq. species 104
Intermittentium febrium curatio 275 sq.
Intestinatorum coalitio 137
Ipecacuanhae vsus in dysenteria 412
Irritabilitatis causa 270
Istidis animalis descriptio 656
Isenflamm, Iac. Frid. de spiritu in morbis 696
Iungermanniae, algae generis, character 122
de Iusti, Io. Henr. Gottl. ab acad. scientiar. Monachiens. praemium acc. 182 K.
Klingenshierna, Sam. ab acad. scient. Petrop. praemium acc. 720
Kniphosii Io. Hieron. Botanica in originali Centur. I-VIII. 227 eius obitus 724
Koelreuter, Ioseph Gottlieb, vorläufige Nachricht von einigen das Geschlecht der Pflanzen betreffenden Versuchen und Beobachtungen. 469
Kongl. Vetenskaps akademiens Handlingar för år 1759 Vol. XX. 195
Krause, Carol. Christ. anat. et chirurg. Prof. extraord. Lipsiens. 725
Kruse Imperatricis Russ. medicus 722
L.
Labyrinthi subterranei descriptio 527 sq.
Laelii fontis disquisitio 526 sq.
Lamanda serpentum rex 56
Langrish Brown plain directions in regard to the Small Pox 514
Lapidicina prope Costozam inuenta 527 sq.
Lapidum genera 341 in igne indurescentium ordines 342 figuratorum distinctio ib. calcareorum disquisitio 449 vitrescentium examen 450 globosorum gene-

- generatio 599 sq. troch-
leatorum descriptio 65
num hi species trochita-
rum sint? 67 sq.
- Laryngis fabrica 112
- Lauri vulgaris character 609
- Ledermüllers, Mart. Froben.
*mikroskopische Gemüths-
und Augenergötzung* 415
- Lehmanns, Io. Gottlob, *Ent-
wurf einer Mineralogie,
zweyte. Auflage* 337 *Pro-
bierkunst* 432
- Leyser, Frid. Wilh. *Flora
Halensis* 356
- Lichenis plantarum generis
historica consideratio 143
seq. plicati vsus 144 ran-
giferini vsus ib.
- Limacis cochleati purpuram
ferentis descriptio 139
- de Limbourg, Robert, quae-
stio: quelle est, l'influan-
ce de l'air sur les vege-
taux 475
- Linguae fabrica musculosa
114 formationis malae in
loquela effectus 118
- Linnaei, Carol. disquisitio
quaestionis de sexu plan-
tarum 464
- Lithogenesiae ratio 599
- Lithospermo affinis planta
596
- Loquela organa 114 sq. a
cantu differentia et ele-
menta 117 in virgine ca-
nente defectus 581
- Louis, Anton. societ. reg.
scient. Gottingens. mem-
brum extran. 717 ab acad.
Halens. Doctoris Medici-
nae gradum accepit 722
- Ludwig, Christian Gottlieb,
Ectypa vegetabilium vfi-
bus medicis praecipue de-
stinatorum 230
- Lugdunens. Gall. scient. ele-
gant. literar. et artium
academ. thes. et praem.
ad ann. 1764. 718
- Lumen ex aqua maris pro-
veniens 392. 399
- M.
- Machinae ad cruris fracturam
curandam inuentae 123 sq.
- Magnesiae distinctio 350
- Magneticae acus variatio
501 magneticus vortex
395
- Malachitis lapidis descriptio
580 sq.
- Mali fatiuae. fructu striato,
punctis rubentibus con-
sperso descriptio 658 sq.
- Mancanillae pomorum effe-
ctus venenati 151
- Manetti, Xaver. lettera so-
pra la malattia, morte et
dissezione anatomica del
cadavere di Antonio
Cocchi 164
- Manna ex fraxinis et salicibus
405
- Maris baltici fluxus et re-
fluxus vestigia 76 sq.
- Martialia medicamenta 11
- Martis sal vasa lactea non
intrat 140 sq.
- Matthiae, Georg, conspe-
ctus historiae medicorum
chronologicus 538
- Maty societ. reg. scient. Lon-
din. secretarius 373
- Mauchart, Dav. Prof. Med.
extraord. Tubing. 723
- Medicae observationes de
remediis singularibus 605
- Medicorum historiae con-
spectus chronologicus 538
- Bb. b 5 Me-

- Medullae oblongatae vis in
sensu et motu producendo 403
- Membranarum corporis
hum. distinctio 680
- Memoire instructif sur la
maniere de ressembler, de
preparer, de conserver, et
d'envoyer les diverses
curiosités d'histoire natu-
relle, 318 de mathemati-
que et de physique pre-
sentés à l'academie roy.
des sciences T. III. 387
- Menstruorum fluxus a vo-
mitu suppressus 279
- Mercurii distinctio 353 do-
cimasia 463 congelatio
212 sqq. vsus in morbis
variis 424. 431 praepara-
tiones cum acidis 426 sq.
solutio cum alcali 428
sublimati corrosivi in lue
venerea vsus 277. 430
- Meteora ignea 491. 495
- Metallorum genera 343 sq.
351 ductilitas 232 sqq.
ponderis causa 235 illa
soluendi novus modus 9
cur frictione electrica red-
di nequeant? 19
- Microscopicae oblectatio-
nes 415
- Mineralia corpora disqui-
rendi methodus 443. 449
eorum classes 338. 346
fluores 349
- Mineralogiae definitio 338
- Moegling, Christ. Lud. ob-
itus 374
- Monestier Blaise Diff. sur la
nature et la formation de
la grele 237
- Monspeliensis societ. reg.
scientiar. membra 545
- Monstruosi foetus sectio 521
- Monstrum caninum 588
- Morbi nigri Hippocratis cu-
ratio 266 epidemici in
Normandia 404 morbo-
rum spiritus 698 sqq.
- Mounsey Imperatoris Russ.
archiater 372
- Muci membranae pituitariae
vsus 536 sq.
- Müller, Gerard. Andr. ob-
itus 555
- Muris aranei descriptio 298
aquatici descr. 299 auel-
lanarum maioris et mino-
ris descr. 305 sq. sylvestris
descr. 306 alpini descr.
307 sq.
- Murray societ. reg. scient.
Gottingens. secretarius
716
- Musaei Baruthini editio pro-
missa 559
- Musculorum ossea durities
485 intercostalium actio
82 sq.
- Mustelae Zibellinae descr.
653
- Mutinensis aquae subama-
rae analysi et vsus 260
seq. martialis descr. et
vsus 262 thermalis analysi
et vsus 263
- N.
- Narium internarum descri-
ptio 532 sqq. vsus 537
- Nectarum florum examen 474
- Nervorum origines et in iis
collisio 505 morbi 667 sq.
- Niccolum novum semime-
tallorum genus 355
- Nicotiana curculiones necat
4
- Nixus inspirationis species
105
- Nova acta physico-medica
aca-

- academiae caesar. Leopold. Carolin. Nat. Cur. T. II. 579 Noui commentarii academ. scient. imperial. Petrop. T. V. ad ann. 1754 et 1755 T. VI. ad ann. 1756 et 1757. 651
- Nubis, in qua formatur tonitru, qualitas electrica 172 sq.
- Nuova raccolta d'opuscoli scientifici e filologici T. V. VI. VII. 520
- Nutritio quid? 217 plantarum quomodo perficiatur 218
- O.
- Obesitate mortui sectio 581
- Oculi structura et morbi 694 laesio singularis eiusque curatio 149 sq. mechanis-
mus variis rerum distan-
tiis accommodatus 30 sq.
- Odontalgiae causa et cura-
tio 674. 684 sq. catarrha-
lis curatio 586
- Oenanthès aquaticae succo
viroso crocante effectus
venenati 157 sq.
- Oettinger, Ferdin. Christoph.
Med. Prof. ord. Tubing. 555
- Oleorum virtus anthelmin-
tica 154 olei succini na-
tura 46
- Olfactus organi descriptio 535 sq.
- Opii effectus 523 in febre
neruosa vsus 256
- Opusculorum scientias et
philologiam illustrantium
noua collectio 520
- Orthoceratitis species ra-
rior. 146
- Oscitatio quid? 104
- Osteocollae generatio 604
- Otia botanica 37
- Ouis laticaudae descriptio 654
- P.
- Palmae marinae descript. 16
- Palumbi migratorii descri-
ptio 210
- Pancreatis extensio singula-
ris 279 induratio 268
- Paralysis electricitate cura-
ta 486
- Parisiensis acad. reg. scient.
hist. ad an. 1755. 3. reg.
chir. acad. thes. et praem.
ad an. 1763. 367. 555
- Paronychia species et sym-
ptomata 675
- Pauo marinus 399
- Pecuris fabae Brasiliensis de-
scriptio et vsus in dysen-
teria 198. 200
- Peripneumoniae curatio 272
putridae symptomata et
curatio 691 mixtae vesica-
toria conueniunt 138
- Peruiani corticis vsus in
delirio febrili 141 in febre
neruosa 257 in dysenteria
413 in variolis 512 in
compescenda vulnerum
haemorrhagia 33 sq.
- Petrefactionis causa 524 pe-
trefactorum ortus et di-
stinctio 342. 355
- Petropolitanae imperial.
scient. acad. noui com-
mentarii T. V. ad an. 1754
et 1755 T. VI. ad an.
1756 et 1757. 651 thes.
et praem. ad an. 1763.
181 ad ann. 1764. 721
- Pfann, Matth. Georg. obitus 556
- Phalaena hermaphroditica cum

eum descriptione eru- cae ex qua illa prouenit 649 sq.	ctions vaporeuses de deux sexes 611
Philipp. Io. ab acad. Loua- nienf. praemium acc. 720	Praemium dissertationi su- per arthritide destinatum 554
Philosophical transactions Vol. L. Part. II. for the Year 1758. 130 Vol. LI. Part. I. for the Year 1759. 481	Procellariae borealis descri- ptio 201
Phthisi aerea defunctae se- ctio 278 sq.	Prunarum noxa 598
Physiologiae corp. hum. ele- menta T. III. 78	Pulmonum fabrica 91. 93 sq. respiratio 98 sqq. utilitas 110 sq.
Piae matris fabrica et morbi 671	Pyrophori Hombergiani pa- ratio 393 sq.
Pira prolifera et frondosa 658	Q.
Pisauriensium fossilium hi- storia 523	Quartanae febris curatio 275
Piscium ordines 58 aetas 207 sq. euisceratio et con- seruatio 321 sq.	Quinta essentia mineralis 10
Plantarum somnus et vigi- liae 132 sexus disquisitio 464. 469 hybridarum exi- stentia 473 compositarum ordines 73	R.
Plantatio arborum 290 sqq.	Ranby, Io. method of trea- ting gunshot wounds 32
Plaz, Ant. Wilh. Diff. de therapia per iucunda 710	Respirationis functio 81. 98 sqq. necessitas 107
Diff. de therapia per in- iucunda 712	tempus quo vna absolui- tur 104
Plethorae distinctio. 681	Responsorum medicorum collectio 160
Pleurae vsus 89 eam inter et pulmones aer non con- tinetur 90	Ricini foliorum effectus 151 sq.
Pleuritidis curatio 272	Ridiger, Anton. chem. Prof. Ord. Lipsiens 558
Plumbi distinctio. 352 docu- mentum 461	Rosae flos prolifer et fron- dosus 659
Pohl, Io. Christophor. anat. et chirurg. Prof. P. O. Lipsiens. 725	Rosén, Nicol. a Rege Suec. eques factus 723
Pomariorum cultura et vti- litas 289	Rothomagensis reg. scient. acad. thes. et praem. ad an. 1762. 367
Pomme essay sur les affe-	Risus caussae et effectus 106
	Rubigo frumenti morbus 637
	Ruhlanarum acidularum exa- men et vsus 593
	S.
	Sabatier, Raph. Beneuent. theses de variis cataractam extrahendi modis 518
	Sach-

- Sachſii, Io. Iac. obitus 724
 Salium examen chemicum
 444 ſq. genera 340. 350
 ammoniaci cum mercurio
 mixtio 29 ſedatiui pro-
 prietas ſingularis 24 ſuc-
 cini natura 42 ſq.
 Sanguinis ab aere refrigera-
 tio 109 ſq. in arteriis mo-
 tus 702 ſq. ſeri fermenta-
 tio 363 ſq.
 Saffaſtras arboris deſcriptio
 595 ſeq. 608 ſq.
 de Sauvage Boiſſ. Diſſ. ou
 l'on recherche comment
 l'air, ſuivant ſes differen-
 tes qualitez agit ſur le
 corps humain 243
 Saxorum diſtinctio 355
 Schaarſchmidt, Aug. Prof.
 Med. ord. Buzov. 183
 Schaeffer, Iac. Chriſt. epiſt.
 de ſtudii ichthyologici faci-
 liori ac tutiori methodo
 543 *der wunderbare und
 vielleicht in der Natur noch
 nie erſchienene Eulenzwit-
 ter nebst der Baumraupe,
 aus welcher derſelbe ent-
 ſtanden* 649
 Schilling Imperatricis Ruſſ.
 medicus 722
 Schmidel, Caſim. Chriſtoph.
 Diſſ. inaug. botanica de
 Blaſia 119 Diſſ. de Iun-
 germanniae caractere
 121
 Schultz, Chriſt. Frid. *Betrach-
 tung der verſteinerten See-
 ſterne und ihrer Theile* 63
 Scirthi poſt febrem tertia-
 nam orti 276 ſq.
 Sciuri minoris virgati deſcri-
 ptio 654
 Scolopendrae marinae de-
 ſcriptio 483 teretis pedi-
 bus vtrinque centum de-
 ſcript. 389
 Scrinci, Ant. Ioseph. tracta-
 tus de fontibus ſoteriis
 Toeplensibus in regno Bo-
 hemiae 328
 Scriptorum phyſico-medico-
 rum, quae anno 1758 pro-
 dierunt, indicis ſupple-
 mentum alterum 187 an-
 ni 1759 indicis ſupple-
 ment. 190 anni 1760 in-
 dex 567 huius continuatio
 731
 Seba, Albert. locupletiffimi
 rerum naturalium theſau-
 rus T. I. II. III. 48
 Secalis cornuti cauſae 639
 Secretionis animalis ratio
 689 ſq.
 Seileri, Chriſt. Iac. obitus 557
 Semimetalloꝝ genera 344
 353 ſqq.
 Seminum in plantis origo
 221 perfectorum ſigna
 287 mundatio 288 diſtin-
 ctio et conſeruandorum
 ratio ibid. ſq. ſationis di-
 verſitas 289
 Sensorii communis deſinitio
 677 ſq.
 Seri ſanguinis fermentatio
 363 ſq.
 Serpentis deſinitio 53 gene-
 ratio 54 a viperis diſtin-
 ctio et cum lacertis con-
 venientia ib. icones et ana-
 tome 55 ſq.
 Silicis genera 341
 Simaroubae corticis uſus 580
 Singultus cauſa 106
 Soporis cauſa proxima 402
 Soricis deſcriptio 305
 Spiel-

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Spielmann, Iac. Reinbold. | Sylvas formandi methodus |
| Diff. de hydrargyri prae- | 292 sq. |
| paratorum internorum in | T. |
| sanguinem effectibus 424 | Talpae descriptio 299 sq. |
| Spirituum animalium, vege- | Tartari solubilis species et |
| tabilium et mineralium | praeparatio 13 sq. |
| effectus 673 sq. acidorum | Terrarum disquisitio 444 |
| ad frigus efficiendum vsus | genera 339 calcarearum |
| 215 sq. | characteres 347 silicearum |
| Spongiae formatio a vermi- | descriptio 348 argillacea- |
| bis 140 | rum genera ib. asbestina- |
| Spumae lupi descriptio 433 | rum species 349 terrae ad |
| Stanni distinctio 352 docu- | culturam arborum ido- |
| mentia 461 | neae 284 sq. terrae motus |
| Staphisagriae seminis vsus | in insula Sumatra observati |
| 586 | 131 in insula Guadaloupe |
| Stellarum marinarum tabula | 143 |
| synoptica 68 conservatio | Tetani causae 629 sympto- |
| 322 fossilium classes 69 | mata et curatio 630 sq. |
| Stenonis, Nicol. vitae de- | Therapia per iucunda 710 |
| scriptio 540 | per iniucunda 712 |
| Sternutationis causa et effe- | Thlaspi filiculis ellipticis fo- |
| ctus 105 sq. | liis lanceolato-linearibus |
| Stevens practical treatise on | integerrimis descr. 652 sq. |
| fevers 687 | Thoracis motus in respira- |
| Stockar de Neuform tracta- | tione 81 |
| tus chemico-medicus de | Thymi glandulae fabrica et |
| succino in genere 40 | vsus 88 sq. |
| Stoerk, Ant. annus medicus | Thyroidae glandulae fabri- |
| secundus 271 | ca 113 |
| Succini natura et differentia | Tillet Diff. sur la ductilité |
| 40 generatio et locus na- | des metaux et les moyens |
| talis 47 vsus 48 disquisitio | de l'augmenter 232 Diff. |
| chemica 41 partes consti- | sur la cause, qui corrompt |
| tutivae 42 solutiones 590 | et noircit les grains de |
| salis natura ih. sqq. olei | bled dans les epis, et sur |
| natura 46 | les moyens de prevenir |
| Succicae acad. reg. scient. | ces accidens et suite des |
| acta ann. 1759. Vol. XX. | experiences et reflexions |
| 195 | relatives a la dissertation |
| Sulphuris in aquis minerali- | sur la cause qui corrompt |
| bis praesentia 493 | et noircit les grains de |
| Surdi quomodo loqui di- | bled dans les epis 634 |
| scant? 119 | Tincturae mercurialis prae- |
| Suspirium quid? 104 | paratio 9 proprietas 27 |
| | Tissot |

- Tissot de morbo nigro, scir-
rhis viscerum, cephelea,
inoculatione, irritabilita-
te, cum cadauerum sectio-
nibus 265
- Titii, Io. D n. Pr. de d uisione
animalium gener. 74 Diff.
sistens vestigia fluxus et re-
fluxus in mari baltico 75
- Toeplensium aquarum me-
dicatarum examen 328
- Tonitru ortus 20 cum ele-
ctricitate similitudo 172
seqq.
- Tourmalin lapidis electri-
tas 496 sqq.
- Tralles, Balth. Lud. de me-
thodo medendi variolis
haectenus cognita saepe in-
sufficiente magno pro in-
oculatione argumento 508
- Transactiões philosophicae
Vol. L. P. II. 130 Vol. LI.
P. I. 482
- Trifolii acetosi vsus 586
- Tripolitanae terrae ortus
486 differentia 15
- Tritonis Linnaei descriptio
et species 156 sq.
- Trochitarum descriptio 64
- Tuhcuri animalculi descri-
ptio 211
- Tussis causa et effectus 105
- Tympanitidis symptomata et
curatio 276
- V.
- Vaccae grunnientis villosae,
cauda equina descriptio
654
- Vandelli Domenic. analifi
d'alcune acque medicinali
del Modonese 260
- Vaporosarum affectionum
causae 611 curatio 612 sqq.
- Variolarum inoculatio 269.
513 prophylaxis 510 sq.
stadia 515 sqq. maligna-
rum curatio 275 variolae
verae cur nunquam reuer-
tantur? 363
- Vasorum nouorum in ani-
mali adulto formatio 223
- Vegetatio quid? 217
- Venaesectio in dysente-
ria 411 in variolis 512. 515
- Venarum pulsatio nulla
702 sqq.
- Venti in corp. hum. impul-
sio 246
- Ventriculi dolore defuncti
sectio 267 sq.
- Vermium excretio conuul-
siuorum motuum causa
133. 153 sq. vomitu re-
iectio 155. spongiam for-
mantium descr. 140
- Vesicatorii effectus in cele-
ritate pulsus refraenanda
137 sq. vsus in variolis
512
- Vespa, Ioseph. in nosocomio
reg. Florent. chirurg. Prof.
183
- Vespertilionis descriptio et
species 301 sqq.
- Viallet ab acad. reg. scient.
Tolosan. praemium acc.
719
- Visus simplex in duplici ocu-
lo 406
- Viperæ generatio et a fer-
pente distinctio 54
- Vitri electricitas 497 sq.
- Vierrae fuscae descript. 211
- Vocalium literarum genesis
et differentia 117 sq.
- Vocis organa 112 mutatio a
lingua et labiis 116
- Vomitùs chronici causa 209
vrinosus 491
- Ver-

Vredinis progressus et causa	390	Werner, Io. Willh. Diss. cau-	363
Vrinae suppressio	490 cre-	sam, cur homines semel	
taceae causae	360 sq.	tantum variolis veris et	
Vrogalli minores quomodo		morbillis corripiantur ad-	
per mansuetos propa-		vmbrans	363
gandi?	205	Wolff, Casp. Frid. Diss. theo-	
Vrsi descriptio	309 seq.	ria generatiois	217
Vulnera sclopetorum tra-			
ctandi modus	32	Z.	
Vulpis americanae descri-		Zeolites nouum fossilium	
ptio	314	genus	349
W.		Zoophytorum genera	57 a
Wallerii, Io. Gottschalk, ani-		corruptione conseruatio	322
maduersiones chemicae ad		Zinci distinctio et nota	354
ictum fulminis in arce re-		docimasia	462
gia Vpsaliensi	619	Ziuiii montis aquae falsae	
Weismanni, Io. Frid. me-			264
moria	184		

Emendanda.

Pag. lin. 30. *angustum*, lege, *angustum*. ead. lin. 32 *collocatus*, lege *colle-*
catur. p. 6 l. 28. *nuebāt*, lege. *volebāt*. p. 9 l. 14 *MACQUERO*, *ut*; lege, *ut*
MACQUERVS. p. 10 l. 22 pro *cauea*, lege, *cella*. p. 11 l. 19 *geodactilis*,
lege, *geodactis*. p. 17 l. 19 *attrahantur*, lege, *attrahuntur*. p. 29 l. 10
lege, *demonstraturum se esse*. ib. l. 29 *ulterius*, lege, *alterius*. p. 41 l. 19
rectificatissimo, lege. *rectificatissimo*. p. 136 l. 12 *biliariis*, lege, *biliariis*.
p. 188 l. 13 *ASCLPIADE*, lege, *ASCLEPIADE*. p. 190 l. penultima, *Inue-*
nur, lege, *Inventeur*. p. 191 l. 15 *ibid.* lege, *London*. p. 192 l. 4 *RVNBY*,
lege, *RANBY*. p. 253 l. 31 *hoc*, lege, *hac*. p. 256 l. 23 *blandum*, lege,
blandam. p. 262 l. 19 *neutri*, lege, *neutrius*. p. 301 l. 22 *pertinet*, lege,
pertinent. p. 355 l. 16 *nominatus*, lege, *nominatas*. p. 387 l. 11 lege,
tertio hoc in tomo. p. 394 l. 9 *his*, lege, *hic*. ib. l. 24 *illo*, lege, *illi*. p. 395
l. 22 *ibi quac*, lege, *ibique*. p. 397 l. 14 *attingit*, lege, *attingat*. ib. l. 29
applicationem, lege, *explicationem*. p. 398 l. 10 *eripuerint*, lege, *eripue-*
rit. p. 399 l. 21 *mutatur*, lege, *mutetur*. p. 405 l. 8 a fine, *azygos*, lege,
azygo. p. 406 l. 23 *quarum*, lege, *quacum*. p. 446 l. 32 *se terra*, lege, *se*
cum terra. ib. l. 33 *praecipitatur*, lege, *miscetur*. p. 449 l. 20 *congitur*,
lege, *coniungitur*. p. 479 l. 14 *obstrunt*, lege, *obstrunt*. p. 488 l. 11 a
fine *inter et*, lege, *inter* *et*. p. 493 l. 4 a fine, *salutaris*, lege, *saluta-*
ris. p. 494 l. 12 *eum*, lege, *eam*. p. 496 l. 17 *sit*, lege, *sit*. ib. l. 26 *hoc*,
lege, *hac*. ib. l. 3 a fine, *propriae*, lege, *proprie*. p. 499 l. 16 *capit*, lege,
cepit. p. 504 l. 21 *persequitur*, lege, *persequitur*. p. 509 l. penult. *ed*,
lege, *is*. p. 521 l. 4 a fine, *opinionem*, lege, *opinionem*. p. 528 l. 3 *obtege-*
tur, lege, *obtegitur*. p. 546 l. ultim. *Medicine*, lege, *Medecine*. p. 573
l. 19 *post. II.* adde, *III. IV. V. VI.* gallice et latine Voll. 6 p. 577 l. 19 pro
492 lege, 503 p. 623 l. 13 *senectatem*, lege, *senectutem*. p. 627 l. 13
hunc, lege *hanc*. p. 647 l. 10 *Tora*, lege, *Flora*. p. 701 l. penultim. *fu-*
lia, lege, *foliorum*.

